

ตะเคียนหิน

Hopea ferrea F.Heim

DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมือง : เคียนทราย, ตะเคียนหนู, เหลาเตา

ไม้ต้นเล็กถึงกลาง สูงถึง 30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดไม่เป็นระเบียบ กิ่งเล็กเรียวห้อยลง ลำต้นแข็งแรง มักจะบิดที่โคน ไม่มีพุ่มพองและรากค้ำยัน เปลือก สีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้ม แตกเป็นเกล็ดบาง เปลือกในสีส้มอ่อน มีเส้นใย ใบ รูปไข่ กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร ปลายยาวแหลม โคนหูลู่หรือรูปลิ้น ค่อนข้างเบี้ยว ใบอ่อนสีแดงสด เกือบทั้งใบแก่คล้ายหนังบาง สีเขียว เป็นมัน เกือบทั้งสองด้าน มักมีตุ่มเกลี้ยงตามซอกใบเส้นใบ เส้นกลางใบค่อนข้างนูนด้านบน เส้นใบ 7-9 คู่ เล็ก เรียวและโค้ง ไม่มีเส้นใบสั้นแซมระหว่างเส้นใบ ด้านบนแบนนูนชัดด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได เล็กเรียว งามทั้งสองด้าน ก้านใบ 1-1.2 เซนติเมตร เล็กเรียว หูใบเล็กมาก กิ่งสีน้ำตาลเข้ม เล็กเรียวเกลี้ยง มักคดไปมา ดอก เล็ก สีครีมถึงสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม ออกเป็นช่อ เรียวยาวถึง 8 เซนติเมตร ที่ซอกใบบนๆ มีขนละเอียดสีอ่อน อดดอก รูปไข่หรือกลม ยาวถึง 3 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง เชื่อมกันปลายแยกเป็นพู่รูปไข่กว้างขนาดไม่เท่ากันด้านนอก มีขนสั้นสีอ่อน เกสรเพศผู้มี 15 อัน อับเรณูกลม ก้านชูอับเรณูแบนคล้ายเข็มขัด มีรยางค์เล็กเรียวสั้นกว่าอับเรณู ฝังรูปลูกแพร่ ก้านเกสรเพศเมียสั้น มีขนสั้นหรือเกลี้ยง ผล ปีกยาว 2 ปีก กว้างถึง 1.3 เซนติเมตร ยาวถึง 3.5 เซนติเมตร รูปค่อนข้างกว้าง ปลายหูลู่ โคนแคบ สีเขียวอ่อนเมื่อแก่ สีส้มออกชมพู ส่วนอีก 3 ปีกสั้นรูปใบหอกแกมขอบขนาน แคบ ตัวผลรูปกรวยหรือรูป ลูกช้าง ปลายแหลมสั้น กว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ปีกหุ้มขึ้นมาเพียงหนึ่งส่วนสาม สีเขียวสดเป็นมัน เกือบทั้งผิวน้ำยาง พบทั่วไปในป่าดิบ ป่าผลัดใบที่ต่ำ ส่วนมากตามยอดเขาหินปูนหรือที่เป็นหิน ดันกล้ามมีใบแบบก้นปัด



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์, พินคา, สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ปานภาคได้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558, 768 หน้า
ภาพประกอบ : http://www.plantsofasia.com/index/hopea_ferrea/0-887



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



Lagerstroemia floribunda Jack Var. *cuspidata* C. B. Clarke

ตะแบกไข่

LYTHRACEAE



ไม้ต้น

ผลัดใบบางส่วน หรือไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 18 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มแน่น ลำต้นคด เป็นร่องที่โคน เปลือก สีครีมถึงน้ำตาลเรียบและเป็นเงา แตกเป็นแผ่นบางทิ้งรอยแผลจางเอาไว้ ใบ กว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 10-22 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่ ปลายทู่หรือค่อนข้างแหลม โคนทู่หรือกลม ใบอ่อนสีน้ำตาลอมชมพู มีขนรูปดาวสีน้ำตาลแน่น ใบแก่เนื้อคล้ายกระดาษหนึ่ง สีเขียวเข้มด้านบน แล้วเริ่มเกลี้ยงทั้งสองด้าน หรือมีขน รูปดาวสีออกน้ำตาลติดทนบนเส้นใบ ใบแก่เหี่ยวย่นสีน้ำตาลอมเหลือง เส้นใบ 7-11 เส้น บางแต่เห็นชัดเจน ล่าง เส้นใบย่อยค่อนข้างจางห่างกัน ก้านใบยาว 3-7 มิลลิเมตร ดอก ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร สีชมพูอ่อนหรือม่วง แล้วค่อยๆจางเป็นขาว ออกเป็นช่อแคบ ยาว 20-40 เซนติเมตร แตกกิ่งข้างยาว ไม่เป็นระเบียบ ตั้งขึ้นที่ปลายกิ่ง แทะขึ้นมาจากเรือนยอด มีขนรูปดาวสีสนิมแน่น ก้านดอกยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร าดอกยาว ประมาณ 10 มิลลิเมตร คล้ายลูกข่าง มี 12 สัน โคนแคบขึ้น ขนแน่นกลีบเลี้ยงรูปประด้าง มี 12 สัน ปลายเป็นพู รูปสามเหลี่ยม 6 พู ไม่มีปุ่มหรือรยางค์ระหว่างพูกลีบ มีขนเป็นขุยสีน้ำตาลแน่นด้านบนนอกและครึ่งบนด้านใน กลีบดอก 6 กลีบ ยาว 12-16 เซนติเมตร รูปไข่ถึงกลม หรือรูปไข่กลับกว้าง ปลายทู่ โคนแหลมเรียว ไปยังก้านสั้น ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ย่นและขอบเป็นคลื่น แต่ไม่เป็นระบาย เกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านชูอับเรณู สีชมพู อับเรณูสีเข้ม มีอันที่เล็กกว่า หลายอันมีก้านชูอับเรณูสีขาว อับเรณูสีเหลือง รังไข่ค่อนข้างกลม มีขนสีสนิมแน่น ผล ยาว 1.2-1.6 เซนติเมตร รูปขอบขนาน สีน้ำตาลเข้ม มีขนกระจาย (แน่นที่ปลายยอด) มีถ้วยกลีบเลี้ยง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 เซนติเมตร ปกคลุมประมาณหนึ่งส่วนสามของผล พูกลีบเลี้ยงกางออกหรือ โค้งกลับ มี 12 สัน แคบขึ้นที่โคน มีขนแน่น พบตามที่โล่งสองฝั่งแม่น้ำ หรือบนเขาหินปูนที่ต่ำ

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่บ้านาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปก. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ตะแบกนา



Lagerstroemia floribunda Jack var. *floribunda*

LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กระแบก ตะแบกไข่ ตะแบก เปื่อยดอง เปื่อยนา เปื่อยหางค่าง

ไม้พุ่ม

หรือไม้ต้น สูงได้ถึง 25 เมตร เปลือกบาง ใบ เรียงตรงข้าม ส่วนมากรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 6-20 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างเกลี้ยง ก้านใบยาว 2-7 มิลลิเมตร ช่อดอกยาว 20-50 เซนติเมตร มีขน กระจุกสั้นนุ่มหนาแน่น ก้านดอกเทียมยาว 2-4 มิลลิเมตร หลอดกลีบเลี้ยงยาว 5-6 มิลลิเมตร มี 10-12 เส้น หรือไม่มีชัดเจน มีขนกระจุกสั้นน้ำตาล หนาแน่น ปลายแยกเป็น 6 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 3-4 มิลลิเมตร มีหรือไม่มีติ่งระหว่างกลีบ ดอกสีชมพูหรือม่วง สีขาวขีดในดอกแก่ มี 6 กลีบ รูปขอบขนาน ยาว 0.8-1.5 เซนติเมตร ก้านกลีบยาว 2-3 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้วงนอก 6-7 อัน รังไข่มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ผลรูปรี ยาว 1.2-1.8 เซนติเมตร มีขนประปราย หนาแน่นช่วง ปลายผล พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบแทบทุกภาคยกเว้นภาคตะวันออก เชียงเหนือตอนบน ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และชายป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 850 เมตร นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามสวนสาธารณะ และสองข้างถนน



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%81&typeword=group>

ภาพประกอบ : http://www.qpbs.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2337



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 เมตร เรือนยอดกว้าง แตกกิ่งสูงชัน เจริญด้านข้างเมื่อยังไม่แก่และจะน้อยลงตามอายุ เปลือก สีเทาอ่อนหรือสีออกน้ำตาล ผิวเรียบ แล้วหลุดรุ่มรัง หรือเกล็ดหลุดเป็นหย่อม เปลือกในสีครีมหรือสีส้มอ่อน อาจมีจุดสีส้มเข้ม เป็นชั้นหนาและเป็นเม็ด (มีในกิ่งด้วย) ใบ กว้าง 8-22 เซนติเมตร ยาว 12-25 เซนติเมตร (ยาว 1.2-1.4 เท่าของความกว้าง) ออกสลับเป็นกระจุกใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กว้างหรือรูปไข่ปลายทู่หรือแหลมเล็กน้อย โคนกลม หรือกึ่งรูปหัวใจ ไม่เป็นแบบก้นเปิดก้นปิด ขอบเรียบ แต่มีต่อมเล็กๆ ตามขอบ ยอดอ่อนมีขนกำมะหยี่แน่น ใบแก่ค่อนข้างแข็ง มักห้อยลง สีเขียวช่นด้านบน ด้านล่างสีเขียวอมเทา มีขนละเอียด อย่างน้อยด้านล่างมักมีต่อมขนาดคล้ายปุ่ม 1-2 ต่อมนี่โคน และมีต่อมเล็กกว่าตามง่ามเส้นใบ เส้นใบ 3-5(7) เส้น จากโคนใบคู่ที่สองยาวไปถึงครึ่งใบ เส้นใบข้าง 4-5 คู่ เริ่มมีตั้งแต่ครึ่งบน เป็นวงใกล้ขอบ เส้นใบย่อยคล้ายชั้นบันไดจางๆ ก้านใบยาว 5-20 เซนติเมตร เล็กเรียวยาว ป่องที่โคน มีขนละเอียด หูใบเล็กกว้างเร็ว กิ่งใหญ่ลำมีแผลใบชัดเจนเมื่อยังอ่อน ดอก แยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้น ออกเป็นช่อเชิงลด เรียว ยาวได้ถึง 20 เซนติเมตร ตามซอกใบ ไม่แตกแขนง หรือแตกกิ่งสั้นมากๆ ทางด้านข้าง กลีบเลี้ยงกลายเป็นซี่ฟัน 3-5 ซี่ไม่เท่ากัน ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้สีขาวหรือสีออกเหลือง มีกลิ่นสบู่ออกเป็นกลุ่ม 1-3 ดอกที่ซอกใบประดับ เกือบไม่มีก้านช่อดอก เกสรเพศผู้มี 9-11 อัน เรียงสลับกัน บนแกนกลางดอกยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ไม่มีรังไข่เป็นหมัน ดอกเพศเมียก้านดอกยาว 1.5- 5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงมีขนสั้นด้านนอก 2-3 ช่อง ไม่มีก้านเกสรเพศเมีย ยอดเกสรเพศเมียเชื่อมกับจานฐานดอกที่จะเป็นพู ผล ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สีเขียวอมเทา แก่สีส้มอ่อน ออกหลายผลด้วยกัน เป็นช่อเล็กเรียวยาว กลมหรือเป็น 2(3) พู ไม่ลิก มียอดเกสรเพศเมียติดทน ที่ปลายมีขนกำมะหยี่ละเอียด แก่ไม่แตก ผนังผลชั้นนอกหนามัน มียางขาว เมล็ดรี แข็งไม่มีเยื่อหุ้ม พบทั่วไปตามที่ว่างในป่าดิบ สูง 1,000 เมตร ขึ้นปนกับไม้ไผ่ในพื้นที่ที่ฟันพูจากป่าที่ถูกทำลาย



ข้อมูลอ้างอิง : โสมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร ก่อภรณ์ดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่ม2 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559, 792 หน้า
ภาพประกอบ : ภาพเล/ใบ : <https://www.flickr.com/photos/acaduitokla/8077254655>
ภาพถ่ายต้น : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ตั้งตาบอด

Excoecaria oppositifolia Griff.

EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : ไฟเดือนห้า, ยางร้อน

ไม้ต้น เล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 13 เมตร ทุกส่วนมียาง ขาวมาก เปลือก สีน้ำตาลอ่อนหรือสีออกเทา หนาและเป็นคอร์ก มีรอยแตกตามแนวตั้ง เปลือกในสีเหลืองอมเขียวอ่อนหรือสีอมชมพู ใบ ยาว 4-12 เซนติเมตร กว้าง 10-30 เซนติเมตร ออกตรงข้าม รูปรี ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนกลมเท่ากัน ขอบจักซี่ฟันไม่ชัดถึงซี่ฟันคม ใบอ่อนสีเขียว อ่อนเต็มสีน้ำตาลอ่อน ใบแก่หนาแน่นด้านบน ด้านล่างสีเขียวอ่อน เกือบทั้งสองด้าน เส้นใบ 14-20 คู่ ก้านใบยาว 1.3-2.5 เซนติเมตร เล็กเรียว หูใบกว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร แคบแหลม ดอก แยกเพศ ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างช่อบนต้นเดียวกัน ใบประดับมีต่อมเกลี้ยง 2 ต่อม ดอกเพศผู้เล็ก สีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อเชิงลดไม่แตกแขนง ยาวได้ถึง 26 เซนติเมตร แกนกลางช่อดอกสีเขียวสด ดอกออกเดี่ยวๆ หรืออยู่เป็นกลุ่ม เล็กๆ ที่ซอกใบประดับ ก้านดอกยาว 0.5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1.2 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ดอกเพศเมียออกเดี่ยวที่ปลายลำต้นสั้น ก้านดอกยาว 2-4 มิลลิเมตร ใบประดับยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงยาว 1.5-3 มิลลิเมตร ก้านเกสรเพศเมีย ยาวได้ถึง 2 มิลลิเมตร (ในผล) ยอดเกสรเพศ เมียขนาดประมาณ 2.5 มิลลิเมตร โค้ง ผล ขนาด 4-6 เซนติเมตร ก้านผลยาว 1.2-1.7 เซนติเมตร สีเขียวสด ออกเดี่ยว กลมหรือเป็นพู่สั้น เปลือกนอกบางเปราะ เมล็ดยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร พบทั่วไปในป่าดิบหรือป่าผลัดใบ ใกล้น้ำหรือบนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไมเคิล ฟินคา สิทธิสุนทร กิ่งกานดา ชยามฤต ไม่ปานภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปท. 2559. 792 หน้า
ภาพประกอบ : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordname=Excoecariaoppositifolia0Griff.>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



Calophyllum symingtonianum M.R.Hend. & Wyatt-Sm.

ตั้งหน

CALOPHYLLACEAE

ไม้ต้นใหญ่ สูงถึง 25 เมตร ลำต้นกลม เส้นรอบวงยาวถึง 90 เซนติเมตร ไม่มีพุ่มพอง เปลือก สีเทาอมครีมถึงสีน้ำตาลอมเหลือง แตกเป็นร่องหยาบ เปลือกในสีชมพูเข้ม มีน้ำเลี้ยงเหนียวสีคล้ายน้ำผึ้งกระจายทั่วไป ใบค่อนข้างเล็ก รูปรีแคบถึงใบหอกแกมรี กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 6-9 เซนติเมตร (ยาว 3-3.5 เท่าของกว้าง) ปลายเรียวแหลม โคนสอบรูปสามเหลี่ยมหรือแคบ เนื้อใบคล้ายหนังบาง เส้นกลางใบขนานด้านบน มีร่องตื้นที่ครึ่งด้านล่าง เส้นใบชัดหรือจาง ก้านใบเล็กยาว 1-1.5 เซนติเมตร เกือบหรือมีขน กิ่งไม่มีขนหรือเป็นขนนุ่ม เกือบ ติ่งที่ปลายยอดรูปกรวยแคบ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลละเอียด ดอก เป็นช่อกระจุกจะไม่แตกแขนง ยาว 4.5-6 เซนติเมตร ที่ปลายกิ่งและตามซอกใบบนๆ มีขนสีน้ำตาล มี 7-11 ดอก ก้านดอกยาว 0.6-1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ ยาว 4-6 มิลลิเมตร ด้านนอกมีขนสีน้ำตาลกระจายไปยังโคน กลีบค่อนนอกรูปไข่หรือกลม กลีบคู่ในรูปไข่กลับและใหญ่กว่าเล็กน้อย คล้ายกลีบดอก กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 50-70 อัน ยาวถึง 4 มิลลิเมตร ผล รูปไข่กลับ กว้าง 1.7-2.5 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ปลายห่อหรือกลม ปลายแหลมเป็นก้านเกสรเพศเมีย เปลือกหนา แห้งสีน้ำตาลอมแดงเข้มถึงออกม่วง พบน้อยในป่าดิบสมบูรณ์ สูง 100-350 เมตร จังหวัดตรัง สตูล สงขลา ยะลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ขยมนฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ตับหลามใบเล็ก

Xanthophyllum eurhynchum Miq.

POLYGALACEAE



ไม้ต้นสูงได้ถึง 20 เมตร ใบ กว้าง 2-5.5 เซนติเมตร ยาว 6-11 เซนติเมตร รูปไข่ถึงขอบขนานแกมรี พบน้อยรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนกลมถึงรูปลิ้น ขอบเป็นคลื่น ผิวเป็นฟูกเล็กน้อยด้านบน ใบแก่สีเขียวอมเทาด้านบน สีเขียวอมเหลืองด้านล่าง เกือบมีต่อม 1-5 ต่อม ไม่มีนวล เส้นกลางใบเป็นแฉ่งหรือแบนมีร่องตรงกลางด้านบน เส้นใบ 3-5(6) คู่ เป็นวงและเชื่อมกัน โกล้ขอบใบเป็นเส้น ขอบใบใกล้โคนเส้นใบย่อยเป็นร่างแห ก้านใบ ยาว 0.4-1 เซนติเมตร มีร่องด้านบน เกือบหรือมีขนในร่อง ตาใบมีขน ขนาด 0.5-1 มิลลิเมตร ไม่มีก้าน ออกที่ง่ามใบ (ไม่พบเหนือง่ามใบ) ดอก สีขาวหรือออกชมพู (ดอกแห้งสีเหลืองอมส้ม) มีสีเหลือง แต้มที่โคนกลีบดอกบน ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ที่ง่ามใบและปลายกิ่ง แตกแขนง หรือมีแขนงสั้น 1-2 แขนง โกล้โคน มีขนเล็กสั้น ก้านดอกยาว 2-3 เซนติเมตร มีขนเล็กสั้น กลีบเลี้ยงยาว 1.5-3.5 มิลลิเมตร กลีบในใหญ่ที่สุด กลีบดอกยาว 6-8 มิลลิเมตร ค่อนข้างเท่ากัน กลีบบนโค้งออก เกสรเพศผู้ยาว 6-8 มิลลิเมตร แยกกัน รังไข่มีขนแน่น ก้านเกสรเพศเมียมีขนประปราย ผล ขนาด 1.2-2 เซนติเมตร ทรงกลมถึงรีกว้าง สีเขียวอมเทาถึงน้ำตาลทอง มีร่องหรือสัน ไม่สม่ำเสมอ 2-4 อัน มักย่นซัด มีขนกำมะหยี่สั้นแน่นเป็นป็น มี 1-2 เมล็ด พบในเรือนยอดชั้นรองทั้งในป่าที่ต่ำและสูง

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โซมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561, 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





Syzygium praecox (Roxb.) Rathakr. & N.C.Nair

ตาคอม

MYRTACEAE



ไม้ต้น ขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอด รูปไข่ทึบ แตกกิ่งต่ำ เปลือกเรียบ สีเทาปนขาว มีปุ่มเล็กน้อย ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ้นค่อนข้างมน แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนเกลี้ยงเป็นมัน ด้านล่างมีนวล เส้นใบโค้งจรดกันใกล้ขอบ ใบชัดเจนมีข้างละ 11-13 เส้น ก้านใบยาว 0.8-1.2 เซนติเมตร ดอก สีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เป็นเส้นบางแคบ แยกออกจากกัน กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่กลับหรือรูปกลม ยาวกว่ากลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูอับเรณูเรียงยาว ก้านเกสรเพศเมียมีอันเดียว ก้านดอกย่อยยาว 3 มิลลิเมตร ดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5 เซนติเมตร ผล แบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด รูปทรงกระบอก ยาว 1-1.5 เซนติเมตร กว้าง 0.7-1.2 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีแดงคล้ำ เมล็ดรูปรี สีน้ำตาลอ่อน ก้านผลยาว 2-3 มิลลิเมตร พบในป่าดิบชื้น ป่าดิบทั่วไป



ข้อมูลอ้างอิง : เอื้อมพร วิสมภณาย, ไม้ถิ่นต้นของไทย 1.- พิมพ์ครั้งที่ 2.- กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด, 2552.652 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





Trevesia beccarii Boerl.

ARALIACEAE



ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





Agrostistachys gaudichaudii Bill. ex Mull. Arg.

EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น : ตาไชย เปล้า จิกน้ำ เหลา

ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 15 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียน ก้านใบยาว 0.5-0.7 เซนติเมตร ใบรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ ผิวใบมัน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม ผลเป็นพู่ สีเขียวเทา ค่อนข้างกลม ผล ขนาด 0.8-1.5 เซนติเมตร สีเทาแกมเขียว มี 7-9 เมล็ด ขนาด 5-8 มิลลิเมตร



ข้อมูลอ้างอิง : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=2378

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพดอก/ผล : <http://www.nationalherbarium.nl/Euphorbs/specA/Agrostistachys.htm>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

