

ไทรย้อยใบแหลม

Ficus benjamina L.

MORACEAE

ชื่อพื้นเมือง : จาเรย ไทร ไทรกระเบื้อง ไทรย้อย ไทรย้อยใบแหลม



ไม้ต้น กิ่งอาศัยหรือขึ้นบนพื้นดิน สูงได้ถึง 35 เมตร ทุใบยาว 0.5-2.8 เซนติเมตร ร่วงเร็ว ใบรูปรีถึงรูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 2-14 เซนติเมตร แผ่นใบหนา เกลี้ยง เส้นแขนงใบย่อยเรียงขนานกัน มีต่อมไขที่โคน เส้นกลางใบ ก้านใบยาว 0.5-2 เซนติเมตร ดอก อยู่ภายในฐานดอกที่ขยายออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ รูปกลม รูปไข่กลับ หรือรูปรี เกลี้ยงหรือมีขนประปราย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1.8 เซนติเมตร ลูกสีเหลืองอมส้มหรือแดงเข้มหรือม่วง ไร่ก้าน ช่องเปิดกว้าง 1-2 มิลลิเมตร มีขนประปรายด้านใน ใบประดับด้านบนขนาดเล็ก เรียงซ้อนเหลื่อม (สกุลย่อย *Urostigma*) พบที่ปากีสถาน อินเดีย เนปาล จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา หรือเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1,300 เมตร เป็นไม้ประดับให้ร่มเงา



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Ficus0benjamina0L>

ภาพประกอบ : ภาพผล/ใบ : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Ficus0benjamina0L>

ภาพทรงพุ่ม : http://uforest.org/Species/F/Ficus_benjamina.php



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ชื่อพื้นเมือง : กระถินแดง, กระถินป่า, สารเงิน



ไม้ต้น

ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 เมตร มีขนสีน้ำตาลแดง ตามกิ่งอ่อน ช่อดอก และกลีบเลี้ยงด้านนอก หูใบยาว 1-2 มิลลิเมตร ใบประกอบยาว 25-30 เซนติเมตร ใบประกอบย่อย มี 4-13 คู่ ใบย่อยมี 10-22 คู่ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 1.2-1.8 เซนติเมตร ปลายกลม เว้าตื้น โคนเบี้ยว แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มด้านล่าง ไร้ก้านช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 20-40 เซนติเมตร ใบประดับยาว 5-8 มิลลิเมตร ร่วงเร็ว ก้านดอกยาว 5-7 มิลลิเมตร ตาดอกกลม กลีบเลี้ยงรูปรี ยาว 5-8 มิลลิเมตร กลีบดอกรูปไข่กลับ โคนและก้านกลีบมีขน ก้านชูอับเรณูยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร รังไข่มี ก้านสั้น ๆ มีขน ฝักรูปใบหอก ปลายแหลม โคนเรียวแคบ ยาวได้ถึง 12 เซนติเมตร ขอบมีปีกกว้าง 4-5 มิลลิเมตร มี 1-4 เมล็ด เรียงตามยาว พบที่กัมพูชา เวียดนาม ตอนใต้ และภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยพบตามชายฝั่งทะเล และป่าโปร่งหลังป่าโกงกาง เป็นไม้ประดับในอินโดนีเซีย เปลือกใช้ย้อมผ้าบาติก

ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Peltophorumpterocarpum\(DC.\)XBacker0ex0K.0Heyne](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Peltophorum%20pterocarpum%20(DC.)%20Backer%20et%20al.%201957)

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Peltophorumpterocarpum\(DC.\)XBacker0ex0K.0Heyne](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Peltophorum%20pterocarpum%20(DC.)%20Backer%20et%20al.%201957)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นเล็ก สูง 16 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอมครีมหรืออมเทา เรียบหรือแตกเป็นแผ่นหรือร่องเล็ก เปลือกในสีขาวถึงสีส้มอ่อน มียางสีครีมหรือเหลืองอ่อนกระจายบาง ใบเล็กรูปไข่ถึงรูปใบหอกแกมรี กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม (มักกลมหรือเว้าเป็นแอ่งที่ยอด) โคนรูปกลม เนื้อคล้ายหนัง บาง เมื่อแห้งสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้มด้านบน ด้านล่างสีน้ำตาลอมครีมถึงน้ำตาล เส้นใบเล็ก 14-20 คู่ ห่างกัน 5-8 มิลลิเมตร ตรงและขนานกันโค้งและเชื่อมใกล้ขอบขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได จางหรือเป็นลาย เว้าชัด ก้านใบเล็กยาว 0.5-1 เซนติเมตร กิ่งอ่อนเป็น 4 สัน หรือแบน ดอก ดอกเพศผู้ยาว 0.6-1 เซนติเมตร สีเหลือง หรือแดง ออกเป็นช่อกระจุกสั้น มี 3-9 ดอก ที่ซอกใบ ก้านดอกยาว 0.5-1 เซนติเมตร ไม้เท่ากัน เล็กหรือค่อนข้างใหญ่ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ คู่อกเล็กและคล้ายใบประดับ คูใหญ่ และบางกว่า กลีบดอก 4 กลีบ ไม้เท่ากัน ยาว 3.5-5 มิลลิเมตร รูปกลมถึงรูปไข่โค้ง ปลายทู่ เกสรเพศผู้จำนวนมากเป็น 4 มัด ล้อมรอบยอดเกสร เพศเมียใหญ่ คล้ายดอกเห็ด ก้านเกสรเพศเมียสั้น ดอกเพศเมียยาว 0.5-0.8 เซนติเมตร ออกเดี่ยวหรือมี 2-3 ดอก อยู่ด้วยกันตามซอกใบ ก้านดอกยาว 4-8 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง และกลีบดอกคล้ายในดอกเพศผู้ ไม่มีเกสร เพศผู้เป็นหมัน อาจพบบ้าง และคล้ายเกล็ด รังไข่ 2 ช่อง ยอดเกสรเพศเมียใหญ่ คล้ายหมวกเห็ดอยู่บนก้าน เกสรเพศเมียใหญ่สั้น ผล ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ก้านผลเล็ก ยาว 0.5-1.2 เซนติเมตร กลมหรือรูปไข่ มียอด เกสรเพศเมียใหญ่เป็นแผ่นคล้ายจานหรือโค้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร สีเขียว ภายในเนื้อนุ่ม เมล็ดใหญ่ 1 เมล็ด รูปไต พบทั่วไปเป็นไม้ชั้นรองของป่าดิบที่ต่ำ สูงถึง 350 เมตร บางทีพบบนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง: การ์ดเนอร์, โชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



นวลดอกขาว

Garcinia eugeniifolia Wall.

CLUSIACEAE



ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 14 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอมเทา เปลือกในมียางเหนียวอยู่บางๆ ใบ เล็ก กว้าง 2.2-4 เซนติเมตร ยาว 5-9 เซนติเมตร รูปไข่ถึงรี ปลายเรียวแหลม โคนทู่หรือรูปลิ้น เนื้อคล้ายหนังบาง แห้งสีเขียวอมเทาถึงน้ำตาลอ่อน เส้นใบเล็กหลายคู่เป็นร่องขีดกัน ห่างกัน 2-3 มิลลิเมตร จางมาก ก้านใบเล็ก ประมาณ 0.8 เซนติเมตร กิ่งอ่อนมี 4 สัน ดอกเพศผู้เล็ก ยาวน้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร สีขาว ออกเป็นช่อกระจุกแน่นมี 20-30 ดอก ตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง ก้านดอกเล็ก ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 4 กลีบ คู่นอกเล็ก คู่ในเกือบเท่ากลีบดอก กลีบดอก 4 กลีบ กลม เนื้อบาง มีขนละเอียดตามขอบ เกสรเพศผู้เป็นกลุ่มหนาแน่น 4 กลุ่ม ล้อมรอบยอดเกสรเพศเมีย มองคล้ายดอกเห็ด ก้านเกสรเพศเมียสั้นแข็ง ดอกเพศเมียใหญ่กว่าดอกเพศผู้เล็กน้อย ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มี 3-10 ดอก กลีบเลี้ยงคล้ายในดอกเพศผู้หรือทุกกลีบเล็กคล้ายเป็นเกล็ด กลีบดอกคล้ายในดอกเพศผู้แต่เล็กกว่า ไม่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน ยอดเกสรเพศเมียใหญ่ รูปครึ่งวงกลม มีปุ่ม ผล ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ก้านผลเล็กเรียว ยาวถึง 0.5 เซนติเมตร กลมเกลี้ยง เนื้อบาง แข็ง มียอดเกสรเพศเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร หนูนหรือรูปจาน มีตุ่ม พบน้อยในป่าดิบที่ต่ำ และป่าดิบเขาไม่สูงนัก

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน พินดา ลิขิตสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาควิ. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้นสูงประมาณ 4-12 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9-25 เซนติเมตร แขนงกิ่งมีขนนุ่มปกคลุม ใบเรียงตัวแบบ สลับ ก้านใบยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตร แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ รูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมไข่ ขนาด 5-14×2-4(5.5) เซนติเมตร มีขนอ่อนนุ่มปกคลุมทั่วใบเรียบ ฐานใบกลม ขอบใบเป็นจักฟันเลื่อย ไม่บ่อยที่จะพบแบบ เรียบ ปลายใบเรียวแหลมถึงเรียวแหลมสั้น ช่อดอก ขนาดประมาณ 3-10 เซนติเมตร ออกเป็น ช่อกระจะ มีหลายดอกในหนึ่งช่อดอก ก้านดอกยาวประมาณ 1-1.3 เซนติเมตร มีขนอ่อนนุ่มสีเหลืองปกคลุมอย่างหนาแน่น ผล ทรงรี ถึงไข่แกมรี ขนาด 8-16×6-8 มิลลิเมตร มีขนหนานุ่มสีเทาแกมน้ำตาลปกคลุมทั่วผล เมล็ด มี 1-2 เมล็ด สีน้ำตาลเข้ม เรียบถึงมีรอยย่น ดอกออกในช่วงของเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และเป็นผลช่วงเดือนกรกฎาคมถึง พฤศจิกายน พบในป่าโปร่ง ความสูงประมาณ 500-1,700 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : อ้างอิง www.efloras.org/florataxon.aspx

ภาพประกอบ : <https://biodiversity.bt/observation/show/49273>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



Aporosa octandra (Buch.-Ham ex D. Don) Vickery var. *octandra*

นวลเสียน

PHYLLANTHACEAE

ไม้พุ่มถึงไม้ต้น สูง 15 เมตร ขึ้นไป เปลือกสีน้ำตาลถึงเทา เรียบ เปลือกในสีชมพู เนื้อไม้สีครีม ต้นที่โต
ไม่เต็มที่มีขนหนานุ่ม ใบเดี่ยว เรียงสลับในแนวระนาบ รูปไข่ถึงรูปรี ขนาดกว้าง 2-8 เซนติเมตร ยาว 5-23
เซนติเมตร โคนใบรูปมนถึงรูปกลม หลังใบมีต่อมขนาดเล็กสีเทาจาง ขอบใบเป็นคลื่นถึงขอบใบหยักหรือมนตื้นๆ
ปลายติ่งแหลม ดอก ช่อดอกออกที่ซอกใบ ผล ผลรูปรี เมื่อแห้งผลสีน้ำตาลดำ มีขนประปราย พบตามป่า
ดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ ระดับความสูง 40-1,500 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=1629

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพผล : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=1629



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



น้องขาว(ตีนเป็ดเล็ก)

Alstonia rostrata C.E.C. Fisch.

APOCYNACEAE

ไม้ต้น สูงถึง 30 เมตร เปลือกสีส้มหรือน้ำตาลอ่อน เปลือกในสีขาว มียางขาวมาก ใบรูปขอบขนานหรือรูปรี กว้าง 1.6-5.5 เซนติเมตร ยาว 5-14 เซนติเมตร ติดเป็นวงรอบข้อ 3 ถึง 4 ใบ เรียวแหลมไปทางปลาย โคนแหลม เกือบ เส้นใบ 35-55 คู่ อยู่ชิดขนานกัน ก้านใบยาว 1-2.3 เซนติเมตร มีปีกเล็กแคบ ดอกสีขาวออกเป็นกลุ่มมีหลาย ดอก ช่อดอกยาว 2-4.2 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาว 1-2 มิลลิเมตร ไม่มีขนกลีบเลี้ยงยาว 1.5-2 มิลลิเมตร สีแดงมอมๆ รูปไข่ปลายตัดหรือกลม มีขนเฉพาะที่ขอบ กลีบดอกมีหลอดกลีบยาว 4-6 มิลลิเมตร กลายเป็นกลีบรูปขอบขนานปลายกลม ยาว 2.5 มิลลิเมตร เรียงซ้อนไปทางซ้ายในตาดอก ขนละเอียดด้านในเกสรตัวผู้ติดเหนือกึ่งกลางหลอดกลีบดอกเล็กน้อย อับเรณูยาว 1 มิลลิเมตร สีเหลืองทอง รังไข่เกลี้ยง ไม่มีจานฐานดอก ก้านเกสรเพศเมียยาวมากกว่า 3 มิลลิเมตร ผล กว้าง 0.8 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร ออกเดี่ยว เกือบ พนักผลหนาเมล็ดกว้าง 2.5 มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตร ปลายกลมทั้งสองด้าน พบในป่าดิบป่าดิบ สูง 1,300 เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : โชมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ – พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพดอก : http://www.biotik.org/laos/species/a/alsro/alsro_05_lo.html



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



นากบุดเขา

Kayea kunstleri King

CALOPHYLLACEAE

ไม้พุ่มใหญ่หรือไม้ต้นเล็ก สูงถึง 11 เมตร กิ่งพาดเลื้อย เปลือก สีนํ้าตาลอมแดงแตกเป็นแผ่นเล็ก ใบ รูปรีแคบ ถึงใบหอก กว้าง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 5-9 เซนติเมตร ออกห่างๆ ปลายเรียวแหลม โคนรูปลิ้ม เนื้อคล้ายหนัง บาง ด้านบนสีเขียวสดหรือเขียวเข้มขุ่น ด้านล่างสีเขียวอ่อนกว่าถึงสีอมเหลือง เส้นใบ 10-14 คู่เห็นชัด มีเส้นใบ เส้นแขนงขนานชัดเจน ข้อมเป็นวงใกล้ขอบเส้นใบบนด้านล่าง ก้านใบยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ใบใหญ่แข็ง มีใบลดรูปคล้ายใบประดับ 2-4 ใบ รูปใบหอกหรือใบเข็ม อยู่ระหว่างโคนก้านใบ กิ่งสีนํ้าตาลเข้ม เมื่ออ่อน มีสะเก็ดเล็กน้อย ดอกสีขาวขนาด 3-4 เซนติเมตร ออกเดี่ยวที่ปลายกิ่งหรือที่ง่ามใบ ก้านดอกยาว ประมาณ 0.3 เซนติเมตร ใบใหญ่แข็ง มีใบประดับย่อยเล็กรูปใบหอกหลายใบที่โคน กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนรูปไข่ กว้างถึงค่อนข้าง กลม ยาว 8-10 เซนติเมตร ไม่เท่ากัน กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่กว้าง ปลายทู่ มักโค้งเข้าไป กว้าง 5-8 มิลลิเมตร ยาว 10-15 มิลลิเมตร บางทีแยกไปเกือบถึงโคน (ทำให้เห็นเป็น 6 กลีบแคบ) เกสรเพศผู้ ยาว 8-15 มิลลิเมตร เล็กเรียว ปลายเกสรเพศเมีย มี 4 ง่าม ผล รูปลูกแพร์มีจอยสันหรือรูปไข่ถึงกลม กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร ปลายมีก้านเกสรเพศเมียเล็กติดอยู่ ก้านผลแข็ง ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยงหนา สีเขียวอมนํ้าตาลอ่อนถึงสีนํ้าตาลอมเหลืองติดอยู่ที่โคน พบได้ทั่วไปตามป่าดิบที่ต่ำ สูง 200 เมตร ตามสันเขา หรือที่เปิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ พินดา สิทธิสุนทร ก่อแกนตา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปท., 2558, 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



นางแดงใต้

Mitrephora vulpina C.E.C.Fisch.

ANNONACEAE

ไม้ต้น สูง 24 เมตร ลำต้นตรง เรือนยอดแน่น มองไกลๆ เห็นเป็นสีทอง ออกดอกพร้อมกับออกใบใหม่สีแดง เปลือก สีนํ้าตาลเข้ม ค่อนข้างหยาบ เปลือกในสีเหลืองอ่อน มีเส้นใย กลิ่นหอมอ่อนๆ ใบ รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปใบหอก กว้าง 5-9 เซนติเมตร ยาว 10-18 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลมสั้น โคนทู่ถึงกลมหรือค่อนข้างรูปหัวใจ ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลอมส้มแน่น ใบแก่เนื้อหนาค่อนข้างหยาบ มีขนสีสนิมบนเส้นใบ ด้านบนด้านล่างมีขนสีสนิมทั่วไป เส้นใบ 12-18 คู่ มีเส้นใบสั้นแซมระหว่างเส้นใบขนานกัน ฐานทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยห่าง ก้านใบยาว 0.6-1 เซนติเมตร มีขนสีสนิมเมื่ออ่อน กิ่งอ่อนมีขนสีสนิมแน่น ต่อไปเกลี้ยง ดอก ออกเป็นช่อกระจุกจะยืดยาวถึง 18 เซนติเมตร มีดอกมากกว่า 5 ดอก เรียง 2 แถว มีเพียง 1 หรือ 2 ดอกบานพร้อมกัน ก้านดอกรวมมีขนสีน้ำตาลทองแน่น มีใบประดับชัติยาว 5-10 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 1.2-2.5 เซนติเมตร มีขนแน่น กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ขนแน่นด้านนอก ด้านในเกลี้ยง หรือมีขนกระจาย โดยเฉพาะบริเวณปลายกลีบดอกวงนอกสีเหลืองถึงสีส้มมีขีดสีแดงจำนวนมาก รูปไข่กว้างหรือรูปรี ยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร แล้วเปลี่ยนเป็นคล้ายสายเข็มขัด ขอบเป็นคลื่น ด้านนอกมีขนสีสนิม วงในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร โคนแคบคล้ายก้าน ด้านนอกมีขนกระจาย ด้านในมีขนไปยังปลายเกสรเพศเมีย 36-40 อัน ยาว 1 มิลลิเมตร สีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีส้มถึงสีม่วงเมื่อแก่ ผล กลมหรือรูปไข่ ยาว 1.8-2.4 เซนติเมตร ปลายกลมทั้งสองด้าน ไม่มีสันตามยาว มีตุ่มเล็กน้อย เมื่ออ่อนมีขนสั้นแน่นสีสนิมแก่สีเหลืองอมเขียวอ่อน ก้านผลยาว 3-4 เซนติเมตร มีถึง 25 ผล บนก้านช่อผลแข็ง มี 6-10 เมล็ด กว้างประมาณ 7 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 12 มิลลิเมตร พบในป่าดิบที่ต่ำ จังหวัดตรัง สตูล ยะลา



ข้อมูลอ้างอิง: ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤดี โมปัญญาได้ เฒ่า - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



นางแดงใบเล็ก

Mitrephora lophophora C.E.C.Fisch.

ANNONACEAE



ภาพประกอบ <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3479>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

