

ไม้ต้น สูง 5-25 เมตร มีขนสั้นหนานุ่มตามกิ่งอ่อน ช่อดอก กลีบเลี้ยงด้านใน และกลีบดอกทั้งสองด้าน ใบเรียงเวียน รูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 12-36 เซนติเมตร ปลายมน กลม หรือแหลม แผ่นใบหนา มีขนประปราย เส้นแขนงใบข้างละ 15-28 เส้น เส้นแขนงใบย่อยแบบชั้นบันได ก้านใบยาว 1.5-3 เซนติเมตร ช่อดอก แบบช่อแยกแขนง ยาวได้ถึง 35 เซนติเมตร ดอกจำนวนมาก ก้านดอกยาวได้ถึง 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงคล้ายหมวกแฉกเล็ก ด้านเดียว ยาวได้ถึง 7 มิลลิเมตร ร่วงเร็ว ดอกสีขาวอมชมพู มี 5-7 กลีบ รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ขยายในผล ปลายแหลมหรือมน เกสรเพศผู้จำนวนมาก ติดบนฐานดอก (torus) ยาวเท่า ๆ กลีบดอก รังไข่มีช่องเดียว มีก้านสั้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรมีขนยาว ผลผนังชั้นในแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 เซนติเมตร ปีกที่ขยายมาจากกลีบดอกรูปขอบขนาน ยาว 5-10 เซนติเมตร ปลายปึกมน มีเส้นกลีบ ก้านผลยาว 1.5-2 เซนติเมตร มีเมล็ดเดียว

พบที่อินเดีย พม่า และลาว ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าสน หรือป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 1,300 เมตร น้ำยาง เรียกว่าน้ำรักหรือยางรัก ใช้ลงพื้นหรือทาเครื่องเรือน แต่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ทำให้พองเป็นตุ่มน้ำใส เช่นเดียวกับน้ำเกลี้ยง *G. laccifera* (Pierre) Ding Hou ช่อดอกสั้น ผลขนาดใหญ่กว่าแต่ปีกสั้นกว่า พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ยางรักผสมน้ำผึ้งมีสรรพคุณแก้โรคผิวหนังที่เกิดจากพยาธิ

สกุล *Gluta* L. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Anacardioidae เผ่า Anacardieae มีประมาณ 22 ชนิด ส่วนมากพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยมี 11 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษาละติน “gluten” หรือ “glutus” หมายถึงติดแน่นหรือเกาะ ตามลักษณะของน้ำยาง



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=4985&words>

ภาพประกอบ : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=4985&words>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



นี้เลง

Gomphandra quadrifida (Blume) Sleumer

TEMONURACEAE

ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่ ปลายเรียวแหลม เส้นใบแบบขนนก เรียบเกลี้ยง ดอกแยกเพศ ผลเป็นรูปไข่กว้าง รังไข่และผลมี 1 ช่อง พบตามพื้นที่ราบต่ำไปจนถึงป่าดิบเขาในระดับต่ำ ประมาณ 1,200 เมตร



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





Hancea stipularis (Airy Shaw) S.E.C.Sierra, Kulju & Welzen

EUPHORBIACEAE



ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงถึง 17(27) เมตร ใบ ออกตรงข้าม คู่ตรงข้ามกันใบหนึ่งจะเล็กลงคล้ายหูใบ ใบใหญ่กว่า กว้าง 2-8 เซนติเมตร ยาว 7-20 เซนติเมตร รูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลมโคนหูใบยาวหรือ กึ่งรูปหัวใจ ขอบเรียบ หรือจักซี่ฟัน มีต่อมที่ปลายซี่ไปยังปลายใบ ใบแก่เกลี้ยงด้านบน มีขนยาวบนเส้นใบด้านล่าง มีเกล็ดสีออกขาวด้านล่าง เส้นใบ 1 เส้นจากโคนใบ ไม่มีต่อม เส้นใบข้างมีต่อมขนตามง่ามเส้นใบด้านล่าง ก้านใบ ยาว 0.4-1.6 เซนติเมตร หูใบรูปไข่แคบหรือขอบขนานแคบ ยาว 7-13 มิลลิเมตร ใบที่เล็กกว่า กว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.4-1 เซนติเมตร รูปไข่แคบถึงขอบขนาน ขอบกึ่งเป็นคลื่น ดอก เป็นช่อเดี่ยวไม่แตกแขนงตามซอกใบที่เล็กกว่าหรือที่ปลายกิ่ง ดอกเพศผู้ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร สีเหลืองแกมเขียว ช่อยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ดอกเดี่ยว ใบประดับ กว้างประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ก้านดอก ยาว 1-2 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงกว้างประมาณ 2 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มีประมาณ 55 อัน ยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ดอกเพศเมียยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร สีเขียวหรือขาว ช่อยาวประมาณ 8 เซนติเมตร มีดอกเดี่ยว ใบประดับกว้าง 1 มิลลิเมตร ยาว 1.5-4 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 3-4.5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 3-6 กลีบ รูปไข่ถึงขอบขนานแคบ ยาว 4-7 มิลลิเมตร รังไข่มีขนแบบขนแกะ หนามสั้น ก้านเกสรเพศเมีย ยาว 1-2.5 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียยาว 6-11 มิลลิเมตร ผล กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร สีออกเขียว มีขนแบบขนแกะ มี 3 พู มีหนาม ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร เมล็ดยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร กลม พบตามชายป่าดิบป่าดิบชื้น สูงถึง 1,100 เซนติเมตร จังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี สตูล ปัตตานี

ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พันดา ลีทิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตรกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตรกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้น เล็ก สูงไม่เกิน 30 เมตร เมื่อมีอายุจะมีพุ่มพอง เปลือก สีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้ม เรียบหรือลอก เปลือกในสีแดง มีกลิ่นคล้ายอัลมอนด์แรง (ไซยาไนด์) แตกเป็นร่องละเอียด ใบ กว้าง 3-7.5 เซนติเมตร ยาว 8-20 เซนติเมตร รูปไข่ถึงรูปไข่แกมขอบขนาน หรือขอบน้อยรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนกลมถึงค่อนข้างแหลม ขอบเรียบ ยอดอ่อนมีใบคล้ายเกล็ดเล็กๆ ที่โคนใบแก่เนื้อคล้าย กระดาษถึงหนังบาง เกือบทั้งสองด้าน มีจุดเล็กสีดำด้านล่าง เส้นใบเล็ก 8-12 เส้น เส้นใบย่อยห่าง กันใบยาว 0.5-1.2 เซนติเมตร มีต่อมเล็ก 2 ต่อมนอกใกล้ปลายก้าน หรือตามขอบใบใกล้โคน ทุใบกว้างได้ถึง 1.5 มิลลิเมตร ยาว 5 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยมแคบ มีสันเชื่อมกันเป็นคู่ ร่วงเร็ว ดอก สีขาว ออกเป็นช่อเดี่ยว ไม่แตกแขนง ยาว 2-6 เซนติเมตร (ถึง 10 เซนติเมตร ในผล) ส่วนมากออกไทรอยแผ่ใบ มีขนละเอียดสีน้ำตาลอมส้มหรือออกขาว (บนก้านใบและกลีบเลี้ยงด้วย) ก้านช่อดอกสั้น ก้านดอก 2-6 มิลลิเมตร หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร เกือบด้านใน กลีบเลี้ยง 5(6) กลีบ กว้าง 1-2 มิลลิเมตร ยาว 0.5-1 มิลลิเมตร ไม่ขีด รูปสามเหลี่ยม กลีบดอก 5(6) กลีบ ยาวกว่ากลีบเลี้ยงมาก รูปกลม ปลายกลม เกสรเพศผู้มี 25-50 อัน ยาว 4-7 มิลลิเมตร รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 5 มิลลิเมตร ผล กว้าง 0.7-1.2 เซนติเมตร ยาว 1.5-2.3 เซนติเมตร คล้ายลูกกระสุน ปลายแหลม โคนกลม สีเขียวอ่อน สุกสีแดง มีกลิ่นไซยาไนด์แรงเมื่อตัดผล พบในป่าดิบที่ต่ำใกล้ทะเล



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไนออน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z). กรุงเทพฯ : ชมรมพรรณไม้และศูนย์วิจัยพืชสวน กรมวิชาการ, 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพดอก : http://www.phytoimages.siu.edu/users/petserpb/9_28_14/28sep14/DSC_2319.jpg

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงไม่เกิน 15 เมตร อาจมีพุ่มพองสั้น เปลือก สีน้ำตาลถึงเทาเข้ม เรียบหรือแตกเป็นร่องละเอียด ใบ กว้าง 1.5-6 เซนติเมตร ยาว 4-14 เซนติเมตร รูปรีถึงขอบขนาน หรือรูปไข่แคบ ปลายเรียวแหลม โคนกลมหรือแหลมขอบเรียบ ยอดอ่อนมีขนละเอียด ใบแก่เนื้อค่อนข้างบาง มีขนกระจายถึงเกลี้ยงทั้งสองด้าน มักมีต่อมแบน 2 ต่อมนที่โคนหรือเหนือโคนเล็กน้อย เส้นใบ 5-8 เส้น ก้านใบยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร หูใบกว้าง 0.2-1.8 มิลลิเมตร ยาว 1.5-8 มิลลิเมตร รูปแถบแคบแยกกัน ร่วงเร็ว ดอก ออกเป็นช่อไม่แตกแขนง ยาว 0.5-2.5 เซนติเมตร ก้านช่อยาว น้อยกว่า 1 เซนติเมตร (บางทีลดรูปเป็นกลุ่มคล้ายช่อกระจุก กลุ่มละ 3-5 ดอก มีก้านช่อยาว 1-5 มิลลิเมตร) ออกเดี่ยว ที่ ก้านใบหรือใต้รอยแผลใบ มีขนสีน้ำตาลอมส้มกระจายถึงแน่น (บนก้านใบและกลีบเลี้ยงด้วย) ก้านดอกยาวได้ถึง 2 มิลลิเมตร หลอดกลีบเลี้ยงยาว 1.5-3 มิลลิเมตร สีครีมสีส้มอ่อน สีเหลืองสดและเกลี้ยงหรือมีขนที่โคนเฉพาะด้านใน กลีบเลี้ยง/กลีบดอก 7-10 กลีบ ยาว 0.5-2 มิลลิเมตร ทุกกลีบคล้ายกันหมด เกสรเพศผู้มี 20-30 อัน ยาว 4-7 มิลลิเมตร รังไข่เกลี้ยงหรือมีขนบาง ก้านเกสรเพศเมียยาว 4-7 มิลลิเมตร ผล กว้าง 0.7-1.4 เซนติเมตร ทรงกลมถึงรูปไข่ขวาง (อย่างน้อยกว้างเท่ากับยาว) ปลายหูดึงแหลมหรือเป็นจะงอย สุกสีออกขาวถึงม่วงแดง แล้วเป็นสีดำ เกลี้ยง มีเนื้อบาง เมล็ดเกลี้ยง พบในที่โล่งของป่าเดิมและป่ารุ่น ส่วนมากสูงน้อยกว่า 600 เมตร จังหวัดพังงา ตรัง พัทลุง สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพผล : http://phytoimages.siu.edu/imgs/petserpb/r/Rosaceae_Prunus_grisea_114840.html



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



เน่าในใบใหญ่

Ilex macrophylla Wall. ex Hook. f.

AQUIFOLIACEAE

ไม้ต้น เล็กถึงกลาง สูง 5-18 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอมเทาอ่อน เรียบหรือหยาบ ใบ ใบใหญ่รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4.5-7 เซนติเมตร ยาว 9-17 เซนติเมตร ปลายทู่หรือเรียวแหลม โคนแคบถึงทู่หรือกลม ขอบเรียบ ใบแก่คล้าย หน้างางหรือคล้ายกระดาษหนัง มีขนด้านบน เกลี้ยงไม่มีตุ่ม เส้นใบ 7-12 เส้น เล็ก ห่างกัน เห็นชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.8-1.2 เซนติเมตร กิ่งสีขาวอมเทาอ่อนถึงสีน้ำตาลอ่อน มีขนละเอียดหรือเกลี้ยง ดอกเพศผู้ขนาด 0.4 เซนติเมตร เป็นช่อแตก กิ่งกว้าง ยาวถึง 10 เซนติเมตร ตามซอกใบหรือกิ่งอ่อน ไม่มีใบเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่ม ดอกออกแน่นเป็นก้อนที่ปลายกิ่งย่อยที่แผ่ออก ยาว 1-2 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 2 มิลลิเมตร พูกลีบเลี้ยง 4-6 พู กลีบดอก 4-6 กลีบ รูปขอบขนานกว้าง ปลายทู่ โคนเชื่อมกัน เกสรเพศผู้ยาวกว่ากลีบดอก ดอกเพศเมียไม่พบ ผล ผลกลมหรือรูปไข่ ยาว 0.5 เซนติเมตร ก้านผลเรียวยาว 5-7 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียไม่มีก้านสุกสีแดงสด แก่เกลี้ยง มี 6-8 เมล็ด แข็งแบนมี 3 สันคม พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และคาบสมุทรมลายูเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : โชนอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า.
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



มะเกลือแดง

Diospyros fulvopilosa Fletcher

EBENACEAE

ไม้ต้นเล็ก สูงถึง 7 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอมเทา เมื่ออ่อนเรียบ แล้วเริ่มแตกสะเก็ดและเป็นแผ่น เปลือกในสีขาว ใบ รูปขอบขนาน พบน้อย รูปใบหอก กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนหู่ถึงรูปกลม กิ่งอ่อนมีขนละเอียดสีน้ำตาลอมส้ม ใบแก่คล้ายกระดาษแข็ง ด้านบนสีเขียวสด เกือบทั้งด้านล่างสีเขียวออกเทา โดยเฉพาะบนเส้นกลางใบ เส้นใบ 8-10 คู่ โค้ง แตกแขนงและเชื่อมกันห่างจากขอบใบ เห็นไม่ชัด ด้านบน หนูนด้านล่าง เส้นใบย่อยเห็นไม่ชัด ก้านใบยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ดอก เพศผู้ออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุกมี 2-3 ดอก ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยงยาว 2-4 เซนติเมตร รูปประฆังกว้าง ปลายจักลึกเป็นแฉก 4 แฉก ด้านนอกมีขนสีน้ำตาลแน่น ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกยาว 5-10 มิลลิเมตร สีครีม โคนเป็นหลอดหรือรูปคนโท ปลายจักลึกสองในสามของกลีบ เป็นแฉก 4 แฉก (ส่วนล่างของแฉกมักแนบกันแน่น) ค่อนข้างเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 14-18 อัน ก้านชูอับเรณูมีขน รังไข่เป็นหมัน มีขนยาวนุ่ม ดอกเพศเมียออกเดี่ยวตามซอกใบ ก้านดอกยาว 1-2 มิลลิเมตร มีขน กลีบเลี้ยงเหมือนในดอกเพศผู้ กลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้ แต่ปลายจักลึกครึ่งหนึ่งของกลีบ มีขน เกสรเพศผู้เป็นหมัน 8-9 อัน มีขนยาวนุ่ม รังไข่มีก้านเกสรเพศเมีย 2 อัน มีขนแน่น ผล กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร ก้านผลใหญ่ยาวน้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร รังไข่ค่อนข้างกลมปลายสั้น โคนหู่ สีเขียว เมื่ออ่อนมีขนสั้นสีน้ำตาล เมื่อสุกสีเขียวอมเหลืองทองถึงเหลืองปนและผิวแห้ง กลีบเลี้ยงจกเกือบถึงโคนเป็นแฉกกางออก 4 แฉก กว้างยาว ประมาณ 6 มิลลิเมตร ขอบค่อนข้างเป็นคลื่น แต่ไม่โค้งกลับหรือพับจับ เส้นกลีบเห็นไม่ชัด ด้านนอกมีขนแน่น ด้านในขนเกลี้ยง พบในป่าดิบที่ต่ำใกล้ลำน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน พินคา สิทธิสุนทร ก่องกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ:โครงการจัดพิมพ์คปท. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



Syzygium diospyrifolium (wall. ex duthie) s. n. mitra
บ้องหวาน MYRTACEAE

ไม้ต้น เล็ก สูง 7-20 เมตร เปลือก สีเทาอ่อนถึงเข้ม มักลอกออกเป็นแผ่นบาง ใบ กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 18-26 เซนติเมตร ออกเป็นวงรอบข้อ 3-4 ใบ พบน้อยออกตรงข้าม ขนาดและรูปร่างหลายแบบ ส่วนมากรูปรีแคบถึงรูปใบหอก แกมขอบขนาน ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนทุติงกลมหรือรูปหัวใจ สีเขียวเข้มด้านบน ด้านล่าง สีเขียวอ่อนหรือเขียวอมเทา เส้นใบสีเขียวเข้มกว่า เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 9-15 คู่ ห่างกันเป็นร่องด้านบน ละเอียดแต่เห็นชัดด้านล่าง เส้นขอบใบ 2 เส้น เส้นในห่างจากขอบใบ 5-10 มิลลิเมตร เส้นนอกใกล้ ขอบใบจางกว่า เส้นใบย่อยจากทั้งสองด้าน หรือบนเล็กน้อยด้านล่าง ก้านใบยาว 2-5 มิลลิเมตร สั้นและอ้วนล่ำ กิ่งสีเทาออกขาวถึงน้ำตาลอ่อน เรียบหรือค่อนข้างแบน แต่ไม่เป็นมุม 4 มุม ดอก ใหญ่สีขาว อาจมีแต้มสีออกชมพูเล็กน้อย ออกเป็นช่อกระจุกแตกง่ามสั้น มี 4-7 ดอก ที่ปลายกิ่งหรือง่ามใบบนๆ ก้านช่อดอกยาว ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 0.5-2 เซนติเมตร เล็กเรียว ถ้วยฐานดอกสูง 1.4-2 มิลลิเมตร รูปประจิมกว้าง สอบที่โคน เป็นก้านถ้วยล่ำ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาว 0.5-1 เซนติเมตร กลีบคู่ในใหญ่กว่าคู่นอก กลีบดอก 4 กลีบ ขนาด 1-1.2 เซนติเมตร กลม มีจุดต่อมน้ำมัน เกสรเพศผู้ยาว 2-4 เซนติเมตร เล็กเรียว ก้านเกสรเพศเมีย ยาว ประมาณ 4 เซนติเมตร เล็กเรียว ผล ขนาดประมาณ 4.5 เซนติเมตร ทรงกลม ปลายบวมล็ก มีกลีบเลี้ยงติดทน สีเหลืองออกเขียวอ่อน มี 2 เมล็ด พบทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำหรือป่าไผ่ใกล้น้ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : ธรินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : https://www.researchgate.net/figure/Inflorescence-of-Syzygium-diospyrifolium-Wall-ex-Duthie-SNMitra-Photo-by-Pranom_fig35_288931537



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



STAPHYLEACEAE

A close-up photograph of a branch of a tree, likely a species of Malus, showing several large, green, oval-shaped fruits hanging from the branch. The fruits are clustered together, and the branch is surrounded by large, green, serrated leaves. The background is dark and out of focus.

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบ เรือนยอดใหญ่แผ่กว้าง ลำต้นตรง เมื่ออ่อนมีหนาม เปลือก สีเทาอ่อนเรียบหรือแตกเป็นเกล็ด มีน้ำยางสีเหลืองอ่อนถึงสีส้มและมีสีน้ำตาลอมดำแทรก ใบ ออกดอกใกล้ปลายกิ่ง ใบย่อย 7-12 คู่ รูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 8-20 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนทู่หรือรูปหัวใจ ขอบเรียบ เกลี้ยง เส้นใบ 15-26 คู่ โค้งใกล้ขอบใบ ชัดทั้งสองด้าน ก้านใบย่อยเล็กยาว 0.7-1 เซนติเมตร ไม่มีหูใบ กิ่งก้านใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตร เมื่ออ่อนมีหนาม ดอก ดอกเพศผู้ขนาดประมาณ 0.8 มิลลิเมตร สีชมพูอ่อน ออกเป็นช่อมีหลายดอก ยาว 20-45 เซนติเมตร ที่ซอกใบ ดอกย่อยไม่มีก้าน กลีบเลี้ยงยาว 3-4 มิลลิเมตร โคนเชื่อมกันเป็นท่อปลายจักเป็นพูยาว 1 มิลลิเมตร ด้านนอกเกลี้ยง กลีบดอกปลายหนา ด้านนอกเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 6 อัน ยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร เชื่อมกันที่โคนขึ้นมาถึงครึ่ง ไม่มีเกสรเพศเมียเป็นหมัน ดอกเพศเมียไม่พบ ผล กว้าง ประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ออกเป็นช่อโปร่งยาว 20-30 เซนติเมตร รูปไข่ ค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยม เมื่อตัดขวาง ผนังผลชั้นในแข็งคล้ายหินเรียบ ภายในมี 1(2) เมล็ด พบกระจายในป่าดิบเดิมหรือป่าร่นสูง 500 เมตร มักพบบนเขาหินปูนหรือที่ถูกแผ้วถาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา นราธิวาส



อ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน พันธนา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤดี ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปท. 2558. 768 หน้า: ภาพประกอบ
ภาพประกอบ : <http://www.npic-surat.com/web/index.php/2013-07-23-06-43-31/2015-01-05-05-32-27/burseraceae/97-burseraceae?showall=&start=1>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

