

ไม้ต้น ขนาดใหญ่ สูงถึง 35 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกหนา สีนํ้าตาลอมเทาแตกเป็นร่องไม่เป็นระเบียบ เปลือกในมี เส้นใยเป็นชั้นสีเหลืองอ่อนและเหลืองเข้ม ใบ รูปขอบ ขนานแกมรี กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 7-18 เซนติเมตร ปลายและโคนหู่หรือค่อนข้างแหลม ตามใบมีขนแข็ง สีนํ้าตาล ใบแก่หนาคล้ายหนัง สีเขียวเข้มและเกลี้ยง ด้านบน ด้านล่างมีเกล็ดเล็กสีครีม (คล้ายเป็นนวล) ไม่มี ตุ่มใบ เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบเล็ก 15-20 คู่ ตรง เส้นใบย่อยเล็กเป็นร่างแห ก้านใบใหญ่ ยาว 2-4 เซนติเมตร หูใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน ร่วงเร็ว ดอก สีเหลืองอ่อนมีแฉกสี่มุมหู่ที่โคนด้านใน ขนาด 2.5 เซนติเมตร เป็นช่อยาวถึง 20 เซนติเมตร ที่ปลาย ยอดและตามง่ามใบบนๆ ตาดอกรูปไข่แคบ กว้างถึง 5 มิลลิเมตร ยาวถึง 10 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงมีหู่ รูปใบหอก ค่อนข้างเท่ากัน กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่ เกสร เพศผู้ประมาณ 15 อัน อับเรณูรูปขอบขนานแคบ ปลาย มีรยางค์เรียวกว้างยาว 2 เท่าของอับเรณู รังไข่รูปไข่ เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียเรียวกว้างยาว 2 เท่า ของรัง ไข่ ปลายแยกเป็น 3 ง่าม ผล ปีกยาว 3 ปีก กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 10-17 เซนติเมตร คล้ายสายเข็มขัด เกลี้ยง อีก 2 ปีกสั้นรูปขอบขนานแคบ กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 6-8 (12) เซนติเมตร ตัวผลรูปไข่กว้าง ถึง 2 เซนติเมตร ยาวถึง 3 เซนติเมตร ปลายเรียวกว้าง ยาว 4 เซนติเมตร เกลี้ยง โคนปีกหุ้มผลมิด พบทั่วไป ในดงที่ต่ำ และป่าดิบที่มีไม้ผลัดใบ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคได้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1- กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558, 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ชื่ออื่น : เหมือดคน เหมือดคนดง เหมือดคนขาว เหมือดตัวผู้ พรมคต ได้ความข้าง คด

ไม้ต้น สูง 5-15 เมตร ใบมีสองรูปร่าง ใบเดี่ยวหรือใบประกอบแบบสามใบย่อย ฐานใบรูปลิ้นหรือฐานใบแหลม ขอบใบเรียบ ปลายใบมีติ่งแหลมสั้นหรือมน แผ่นใบรูปหอกกลับหรือขอบขนาน 12-35 x 4-10 เซนติเมตร แผ่นใบ 25-60 x 15-50 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อ เกิดที่กิ่งหรือง่ามใบ พຍယကທີ່เกิดที่ปลายยอด วงกลีบรวมสีขาวหรือสีเหลือง ช่อดอกเพศผู้ 10-20 เซนติเมตร ช่อดอกเพศเมีย 15-22 เซนติเมตร ดอกเพศผู้ ก้านดอกยาว 5-7 มิลลิเมตร พบเกสรเพศเมียเป็นหมันลักษณะเรียบเกลี้ยง ดอกเพศเมียก้านดอกยาว 8-10 มิลลิเมตร พบเกสรเพศผู้เป็นหมัน ผล สีนํ้าตาล รูปไข่ ขนาด 3-4.5 x 1.7-3 เซนติเมตร



ข้อมูลอ้างอิง : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=2108

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพดอก : <http://www.fca16mr.com/webblog/blog.php?id=1226>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



พระเจ้าห้าพระองค์

Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe

ANACARDIACEAE

ไม้ต้น ขนาดใหญ่ สูงถึง 40 เมตร ผลัดใบช่วงสั้น เรือนยอดแน่นกลม ลำต้นสูงตรง มักเป็นร่องที่โคน เกิดพูพอนใหญ่ตามอายุ สูงถึง 5 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอมส้มอ่อนถึงสีออกเทา เรียบหรือลอกออกเป็นแผ่นบาง เปลือกในสีชมพูถึงสีน้ำตาลอมแดงอ่อน มีจุดน้ำเลี้ยง เป็นยางใสกระจาย ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ยาว 35-60 เซนติเมตร ออกสลับ ดอกใกล้ปลายกิ่ง มีใบย่อย 4-9 คู่ ออกสลับหรือตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 6-16 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนกลมเบี้ยว ขอบเรียบ (ยกเว้นตอนเป็นต้นกล้า) ใบอ่อนสีชมพู มีขนสั้นสีน้ำตาล ใบแก่หนาคล้ายแผ่นหนังบาง เกือบหรือมีขนละเอียดโดยเฉพาะบนเส้นใบด้านล่าง มักมีกระจุกขนตามซอกเส้นใบ เส้นกลางใบบนด้านบน เส้นใบ 6-12 คู่ โค้งขึ้น ชัดทั้งสองด้าน ก้านใบย่อยยาวมากกว่า 0.5 เซนติเมตร (ใบย่อยที่ปลายยาวถึง 1.7 เซนติเมตร) มีขนละเอียดหรือค่อนข้างเกลี้ยง ก้านช่อใบยาว 8-10 เซนติเมตร แบนและเป็นร่องด้านบน โคนก้านบวม กิ่งใหญ่แข็ง มีรอยแผลเป็นที่ใบร่วงชัด เมื่ออ่อนมีขนละเอียด ดอก สีขาวออกเขียวถึงสีครีมหรือสีเหลืองอ่อน รูประฆัง กลิ่นหอมอ่อน ดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อแตกแขนง เรียวยาวถึง 60 เซนติเมตร ที่ซอกใบบนๆ มักออกพร้อมกับใบอ่อนหรือก่อนใบอ่อนเล็กน้อย ก้านดอกยาวถึง 4 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงปลายมีพู่รูปสามเหลี่ยมหรือรูปไข่ 5 พู่ ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร มีขนละเอียดนุ่มด้านนอก ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกรูปใบหอก 5 กลีบ ยาว 7-10 มิลลิเมตร ยาวกว่าเกสรเพศผู้ และก้านเกสรเพศเมียเล็กน้อย ตั้งตรงและแนบกัน ยกเว้นที่ปลายซ้อนทับกันในดาดอก เกือบทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอับเรณูเล็กเรียว ยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร สมบูรณ์ทุกอัน อันที่ติดตรงกับกลีบดอกสั้นกว่าอันอื่น ฐานดอกคล้ายวงแหวน มีขนนุ่ม รังไข่รูปไข่ มี 5 ช่อง ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร เกือบมีก้านเกสรเพศเมีย 5 อัน เชื่อมติดกันอยู่ที่ปลาย ผล กลม ยาว 2.5-4(5) เซนติเมตร มีจุดคล้ายเป็นเกล็ดเล็กรอบตรงกลางผลยาวเป็นสาย สุกสีเหลืองถึงสีส้มอ่อน แล้วเป็นสีน้ำตาลขุ่น หนา เหนียว แข็ง ถึงมีเนื้อเป็นเส้นใยด้านใน ผงผลชั้นในใหญ่แข็งเป็นสามเหลี่ยม ปลาย มีรู 5 รู ทั่วไปพบในป่าดิบที่ต่ำในภาคใต้ ชอบขึ้นริมน้ำ โดยเฉพาะในที่ๆ มีหน้าแล้งชัดที่วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ เป็นตัวอย่างที่ดี ที่โคนต้นมีพูพอนใหญ่



ชื่อภาษาอังกฤษ : การ์ดเนอร์, โชมอน พินดา ลิขิตสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้ เฒ่า - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง 8 เมตร เปลือกเรียบบาง สีน้ำตาลเข้ม เปลือกในสีส้มถึงสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างมีเส้นใย ใบ รูปขอบขนานหรือพบบ้างเป็นรูปไข่แคบ กว้าง 3.5-7 เซนติเมตร ยาว 9-18 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนรูปลิ้น เนื้อคล้ายแผ่นหนังบาง ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อน เกือบหรือมีขนกระจายบนเส้นกลางใบ เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบนเล็กน้อย เส้นใบ 5-7 คู่ มีเส้นสันแซมระหว่างกลางโค้งและเชื่อมติดกันห่างจากขอบ 5-8 มิลลิเมตร งามหรือขนด้านบน ขนด้านล่าง ก้านใบยาว 3-7 เซนติเมตร เกือบหรือมีขนกึ่งอ่อนเล็ก มีขนกระจายถึงหนาแน่น เมื่อแก่เกลี้ยง ดอก ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร สีครีมมีสีชมพูแต้มหรือสีแดงปนปลายสีครีม ออกเดี่ยวหรือ 2-3 ดอก ตามซอกใบหรือตามกิ่งใต้ใบ ก้านช่อดอกยาว 1-4 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 3-5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร กลีบดอกวงนอกรูปไข่ถึงค่อนข้างกลม ยาวประมาณ 3.5 มิลลิเมตร มีขนกระจายถึงแน่นด้านนอก วงในยาว 5-7 มิลลิเมตร รูปเหลี่ยมเพชร ปลายแคบแหลม แนบกันเมื่ออ่อนแต่ไม่เชื่อมกัน ต่อไปจะค่อยๆ แยกออก มีปลายกางออก มีเนื้อเกลี้ยง หรือมีขนทั้งสองด้าน ด้านในมีต่อมน้ำหวาน รูป U คว่ำ หรือตัว H เกสรเพศผู้สมบูรณ์ (6)12 อัน เรียง (1)2 วง ไม่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน เกสรเพศเมีย 12 อัน ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีขนเล็กน้อย ผล กลม ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สีเขียวมีจุดสีม่วงอมแดง เกือบก้านผลยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร มีถึง 12 ผล ก้านช่อดอกยาว 1 เซนติเมตร มี 1-2 เมล็ด พบทั่วไป เป็นไม้ขึ้นรองในป่าดิบที่ต่ำ จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี



ข้อมูลการค้นคว้า, ไข่มอง พันดา สิทธิสุนทร กองงานดา ขยายเขต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



พริกเหลือง

Orophea cuneiformis King

ANNONACEAE

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น สูง 13 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอมเทาถึงน้ำตาลเข้ม เรียบหรือหยาบเล็กน้อย มีช่องอากาศเล็กจำนวนมาก เปลือกในสีครีมถึงเหลืองหรือส้ม มีเส้นสีน้ำตาลสานกัน ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 6-9 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนกลม ใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีขนสีสนิมหรือสีอมขาวแน่น ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีขนอย่างน้อยบนเส้นใบ เส้นใบ 8-10 คู่ ห่างกัน ก้านใบยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร มีขน กิ่งอ่อนมีขนหนาแน่นต่อไปเป็นสีน้ำตาลเข้ม เกี้ยง ดอกยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร สีชมพู ปลายมีสีเขียวเมื่ออ่อน เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีครีมเมื่อแก่ ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อมี 2-4 ดอก ก้านช่อดอกยาวถึง 7 เซนติเมตร ก้านดอกยาวถึง 5 มิลลิเมตร ขนแน่นทั้งสองด้านออกที่ซอกใบหรือเหนือ ซอกใบเล็กน้อย ดาดอกกลม กลีบเลี้ยงรูปไข่ยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ปลายแหลม มีขนแน่นด้านนอก กลีบดอกวงนอกรูปไข่ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ปลายแหลม มีเส้น 5 เส้น เนื้อบางคล้ายกระดาษ ด้านนอกมีขน แน่น ด้านในมีขนกระจายถึงค่อนข้างเกลี้ยง วงในยาว 7-10 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยมเพชร ปลายหู่ โคนมีก้าน เล็ก ยาวเท่ากับตัว กลีบแนบกันและเชื่อมกันตามขอบบน เมื่ออ่อนแยกกันเล็กน้อย แต่ไม่บานออกเมื่อแก่ ด้าน ในไปยังโคนมีต่อมน้ำหวานตามแนวราบ 2 ต่อม เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 6 อัน เรียง 1 วง ติดสลับกับเกสรเพศผู้เป็นหมัน ที่คล้ายต่อม 3 หรือ 6 อัน เกสรเพศเมียแน่น 6 อัน รูปขอบขนาน มี 2-3 ออวูล ผล ทรงกระบอก กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ปลายแหลม ไม่มีก้านผล มี 4-6 ผล สีเขียวอ่อน สุกสีแดง ขนสีขาว มี (1)2 เมล็ด รูปขอบขนาน พบทั่วไปในป่าดิบหรือป่ากึ่งผลัดใบ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไมมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่มที่ 1.

- พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





ไม้ต้นเล็ก สูง 4-14 เมตร เปลือก สีเทาถึงน้ำตาลอมส้ม เรียบหรือแตกเป็นร่องละเอียด หรือเป็นเกล็ดบาง เปลือกในสีน้ำตาลอ่อนถึงส้ม บางมาก มีเส้นใย เนื้อไม้แข็งมาก ใบ กว้าง 3-10 เซนติเมตร ยาว 8-20 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่แคบ ปลายทู่หรือแหลม โคนแคบถึงกลม ขอบเรียบ ใบอ่อนสีม่วงอมฟ้า ใบแก่เนื้อ คล้ายหนังบางถึงหนาน้ำ สีเขียวเข้มด้านบน เกลี้ยงทั้งสองด้าน ใบแก่สีน้ำตาลอมเหลือง เส้นใบ 3 เส้น ออกจาก โคนใบ เป็นร่องด้านบน ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร แบน เกลี้ยง กิ่งกลมเมื่อตัดขวาง เกลี้ยง มักพองที่ข้อ เล็กน้อย ดอก ยาว 1-1.5 เซนติเมตร สีม่วงอ่อนถึงน้ำเงินเข้ม พบน้อยที่มีดอกสีขาว ออกเป็นช่อเป็นง่าม หรือ แตกแขนง ยาว 1-7 เซนติเมตร ดอกน้อยถึงหลายดอก ตามซอกใบหรือตามกิ่งเกลี้ยงใต้รอยแผลใบ มีก้านช่อดอก หรือไม่มีแกนกลางดอก เกลี้ยง ก้านดอกยาว 1-4 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงยาว 3-6 มิลลิเมตร สีเขียวออกเขียวจาง รูปถ้วยหรือรูปประดิ่งขอบแบนหรือ มีซี่ฟันเล็ก 4 ซี่ แต่ไม่มีหมวก มีแผ่นหลายเหลี่ยม แบนคล้ายกระดองเต่าคลุม กลีบดอก 4 กลีบ ยาว 3-6 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยมกว้างถึงรูปไข่ หรือกลม ปลายแหลม โคนแคบคล้ายเป็น ก้านทางออกแล้วพับลง เกสรเพศผู้มี 8 อัน ก้านชูอับเรณูสีฟ้าหรือม่วง ยาว 2-4 มิลลิเมตร อับเรณูสีครีมหรือส้ม ยาว 2-3 มิลลิเมตร ผล ยาว 0.7-1 เซนติเมตร กลม ปลายกลวง มีแผ่นคล้ายกระเบื้องปกคลุม สุกสีเหลือง ถึงฟ้าเข้ม แล้วเป็นสีดำอมม่วง แก่ไม่แตก มีเนื้อด้านใน เมล็ดสามเหลี่ยมหลายเมล็ด ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร พบทั่วไปในภาคใต้ ในป่าดิบค่อนข้างเปิด หรือตามลำธารที่เป็นหิน ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลถึงสูง 250 เมตร

ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ไผดภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพดอก/ผล : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/Special-Pages/plant-detail.aspx?id=3091>

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



พลองใบมัน

Memecylon campanulatum C. B. Clarke

MELASTOMATACEAE

ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 เมตร โคนมีพูพอนเล็ก เปลือก สีครีมหม่นถึงน้ำตาลอมเทา หรือถึงน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องละเอียด นุ่ม ใบ กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร รูปรี ปลายทู่หรือแหลมสั้น โคนสอบแคบ ไปยังก้าน ใบสีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน เนื้อหนาคัลลัสหน้าง กิ่งเป็นร่อง 2 ร่อง หรือเป็นมุมเล็ก 4 มุม เมื่อยังอ่อน เมื่อแก่กลม ดอก สีขาว ออกเป็นช่อแน่น มีหลายดอก ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร บนปุ่มแข็งตามกิ่งแก่ ก้านช่อดอกสั้น (ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร) ก้านดอกยาว 3-4 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงยาว 2-3 มิลลิเมตร รูปประฆัง ขอบแบนหรือจักเป็นพูตื้น คอดเหนือรังไข่ กลีบดอกกว้างประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร รูปไข่กว้าง ปลายแหลมเล็กน้อย หนา ขอบบาง อับเรณูยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร สีม่วงหรือสีฟ้ารูปตัว (C) มีต่อมตรงกลาง ผล ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร บนก้านผลยาว ได้ถึง 4 มิลลิเมตร รูปค่อนข้างกลม ขอบมีกลีบเลี้ยง คล้ายเป็นปล่อง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร ผิวหนา สุกสีชมพูถึงแดงเข้ม มีเนื้อสีครีมหยาบ สีสอดดำเมื่อแห้ง หายาก เป็นไม้ขึ้นรองในป่าดิบเดิม สูงประมาณ 500 เมตร จังหวัดสงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พันดา สิริลีนูพร ก่อการตา ชยามฤต ไม่ไยผาได้ พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559-792 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



พลองลีลา

Memecylon lilacinum Zoll. & Moritzi

MELASTOMATACEAE

ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงกลาง สูงได้ถึง 25 เมตร บางทีพบเป็นไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 เมตร โคนเป็นร่องสั้นๆ เปลือก สีครีมถึงน้ำตาลอมส้มหรือสีออกเทา แตกเป็นร่องละเอียดหรือเป็นแผ่น เปลือกในสีครีมออกน้ำตาลถึงส้มอ่อน ใบ กว้าง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 5-9 เซนติเมตร รูปไข่ถึงใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนเรียวแคบไปยังก้านใบ สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน เนื้อคล้ายหนัง เส้นใบข้างจางมาก กิ่งแบนและเป็นร่อง หรือเป็นมุม 4 มุมเล็ก เมื่อยังอ่อน เมื่อแก่กลม ดอกยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร สีขาวถึงสีม่วงหรือฟ้าอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกแน่น ยาว 0.8-1.2 เซนติเมตร ตามซอกใบล่างๆ หรือใต้ก้านใบเล็กน้อย หนึ่งช่อมี 12-24 ดอก ก้านช่อดอกยาว 1-3(5) มิลลิเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มักอยู่ด้วยกัน 3 ก้าน กลีบเลี้ยงยาว 1.5-2 มิลลิเมตร สีเขียวอ่อนถึงออกขาว รูปกรวย จักเป็นซี่ฟันรูปสามเหลี่ยม 4 ซี่ ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร กลีบดอกกว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยมแคบถึงรูปใบหอกแกมขอบขนาน ปลายเรียวแหลมเล็ก โคนแบนหรือกึ่งรูปหัวใจ อับเรณูยาว 1-1.5 มิลลิเมตร สีขาวหรือฟ้า ตรง รูปชวาน ไม่มีต่อม ผล ยาว 0.8-1.2 เซนติเมตร ก้านผลยาว 1-2 มิลลิเมตร กลม หรือกึ่งรูปไข่ ขอบมีกลีบเลี้ยงจักตื้น เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร มักแบนที่ปลายทั้งสองด้าน อาจมีร่องจางๆ 4-8 ร่อง โดยเฉพาะใกล้โคน เกือบ หรือมีตุ่มละเอียด ผิวหนา สุกสีเหลืองถึงส้มอ่อน (หรือสีฟ้า) แล้วเป็นสีดำ พบทั่วไป เป็นไม้ขึ้นรองในป่าดิบที่ต่ำ มักพบใกล้น้ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชมอน พินดา สิงธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าวนาคได้ - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปท. 2559. 792 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





Memecylon pubescens (Cl.) King

MELASTOMATACEAE



ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



พลับกล้วย

Diospyros frutescens Blume

EBENACEAE



ไม้ต้น สูงถึง 18 เมตร ใบ รูปรีถึงใบหอกแกมขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ กว้าง 4-10 เซนติเมตร ยาว 10-25 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนแหลมถึงทู่ หรือกลม เนื้อบาง มีปุ่มเล็กๆ เกือบ เส้นใบ 8-12 คู่ เชื่อมเป็นวงห่างจากขอบใบ เป็นร่องด้านบน เส้นใบย่อย เป็นร่างแหเห็นไม่ชัด ก้านใบยาว 0.7-1.5 เซนติเมตร มีขน ดอกเพศผู้เป็นช่อแน่น ยาว 1-2 เซนติเมตร มีหลาย ดอกตามซอกใบหรือใต้ก้านใบ ก้านดอกยาว 3-5 มิลลิเมตร มีขน กลีบเลี้ยงยาว 2-3 เซนติเมตร รูปประฆัง กว้าง ปลายจักลึกเกือบถึงโคน เป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม แคบ 4 แฉกพับจีบลึก ไม่ซ้อนกัน เกือบหรือมีขน กลีบ ดอกยาว 4-6 มิลลิเมตร สีขาวหรือเขียวอ่อน โคนรูป โคนโท ปลายจักลึก 1/2 กลีบเป็นแฉก 4 แฉก มีขน โดยเฉพาะที่เส้นกลางกลีบด้านนอก เกสรเพศผู้ 14-20 อัน เรียง 2 แถว รังไข่เป็นหมัน มีขน ดอกเพศเมียเป็นช่อสั้น มี 3-10 ดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเหมือนในดอกเพศ ผู้แต่ใหญ่กว่า เกสรเพศผู้เป็นหมัน 8 อัน ขอบมีขน รังไข่ มีขนเส้นไหม ผล กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร ก้านผลยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร กลมหรือ รี ปลายสองด้านกลม มีขนเมื่ออ่อนแล้วเกลี้ยง ยกเว้น ที่ปลาย เมื่อสุกสีเหลืองถึงส้ม ไม่มีเนื้อ กลีบเลี้ยงเส้น ผ่านศูนย์กลางถึง 2 เซนติเมตร ปลายจักลึก 1/2 กลีบเป็น แฉก 4(5) แฉก ปลาย ตรงแต่ขอบโค้งกลับ พับจีบและ ขอบเป็นคลื่น เกือบ พบทั่วไปในป่าดิบ สูงถึง 500 เมตร

ข้อมูลอ้างอิง: การ์ดเนอร์, ไชยอน พินดา สิทธิสุนทร ก้องกนกดา ขยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรมพญา :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

