

พะยอม

Shorea roxburghii G.Don

DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กะยอม ชะยอม ชะยอมดง พะยอมดง แคน

ไม้ต้น สูง 15-25 เมตร โคนมีพูพอนต้น ๆ เปลือกแตกเป็นร่อง มีขนสั้นนุ่มและเกล็ดสีน้ำตาลตามกิ่งอ่อน หูใบก้านใบ แผ่นใบด้านล่าง และกลีบเลี้ยงด้านนอก หูใบรูปแถบขนาดเล็ก ใบรูปขอบขนาน ยาว 5-15 เซนติเมตร เส้นแขนงใบข้างละ 14-20 เส้น ก้านใบยาว 2-4 เซนติเมตร ช่อดอกยาว 3-8 เซนติเมตร ช่อแยกแขนงมี 2-4 ดอก ดอกเรียวยาว ก้านดอกยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ดอกสีขาว โคนมีปื้นสีชมพู รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาวได้ถึง 1.2 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 15 อัน ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูเรียวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร รยางค์ยาวประมาณ 1.5 เท่า ของอับเรณู รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 3-4 มิลลิเมตร ยอดเกสรจัก 3 พู หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผล เกลี้ยง ปีกยาว 3 ปีก ยาว 5-10 เซนติเมตร ปีกสั้น 2 ปีก ยาว 3-6 เซนติเมตร ผลรูปไข่ ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ดึงแหลมยาว 3-5 มิลลิเมตร พบที่อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู ตอนบน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้นใกล้ชายฝั่งทะเล ความสูงถึงประมาณ 1,500 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Shorea%20roxburghii%20G.Don>

ภาพประกอบ : ภาพดอกไม้ : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Shorea%20roxburghii%20G.Don>

ภาพผล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้นขนาดใหญ่ พุ่มพองสั้น เปลือกสีน้ำตาลแดงเข้ม เกลี้ยงถึงแตกสะเก็ด เปลือกในสีแดงเข้ม มีเส้นใย ใบเล็ก รูปรีกว้างถึงรูปไข่ ยาว 5-9 เซนติเมตร กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนห่อ เนื้อคล้ายหนังบางแห้งสีน้ำตาลแดง เกลี้ยงหรือมีขนกระจาย โดยเฉพาะบนเส้นใบ มีตุ่มใบใหญ่คล้ายเกล็ด เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 9-12 คู่ เรียวโค้ง แบนด้านล่าง เส้นใบย่อยเล็กแบบชั้นบันได ก้านใบยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร หูใบยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร กว้างติดแน่น ดอก ขนาด 1.5 เซนติเมตร สีครีมแต่มีสีชมพูหรือแดงอมชมพู เป็นช่อเล็กเรียวแตกกิ่ง 1(2) ชั้น ยาวถึง 12 เซนติเมตร ที่ปลายกิ่งและซอกใบบน ขนละเอียด ดาดอกรูปไข่แบน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 15 อันไม่เท่ากัน 5 อันในยาวเป็น 2 เท่าของอันอื่น อับเรณูกลม ปลายเรียวสั้น รังไข่ขนแน่น ยกเว้นที่โคน รูปไข่แคบ ก้านเกสรเพศเมียสั้นกว่ารังไข่ ผล 3 ปีกยาว กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 5-7(9) เซนติเมตร รูปช้อน มีขน 2 ปีกสั้น กว้างถึง 0.5 เซนติเมตร ยาวถึง 2.5 เซนติเมตร รูปแถบไม่เท่ากัน ตัวผลขอบขนานแกมไข่ กว้าง 0.7 เซนติเมตร ยาว 1.4 เซนติเมตร ปลายแหลมยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร มีขนสั้นสีอ่อน โคนปีกหุ้มผลครึ่งหนึ่ง พบในป่าดิบที่ต่ำ สูงถึง 350 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ดินดา ลิธิสสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์ฉบับ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Shorea+parvifolia>

ภาพถ่ายใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพดอก : <http://www.natureloveyou.sg/Forest%20Floor/Shorea%20parvifolia/Main.html>

ภาพผล : <http://dbh30cm.blogspot.com/2005/07/shorea-parvifolia.html>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 7-35 เมตร เนื้อไม้แดงอมน้ำตาลสดหรือแดงอมขาวเป็นลายสีเข้มและมีกลิ่นหอม เปลือกเรียบสีค่อนข้างเหลืองอมน้ำตาล หรือค่อนข้างเทาอมน้ำตาลถึงดำ มีรอยแตกตามยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือรูปเรือ เปลือกด้านในสีค่อนข้างแดง มียางสีคล้ายน้ำมันหรือสีเหลือง กิ่งแขนงแบนข้าง ค่อนข้างเกลี้ยงหรือมีขนสั้นหนา นุ่มสีทึม เป็นปล้องยาวประมาณ 5-40 มิลลิเมตร มีตาอวบที่ปลายกิ่ง มีขนสั้นหนานุ่มสีทึม ขนาดเล็กมาก ขนเรียงกันเป็นชั้นเดียว สีสนิมยาวประมาณ 7-10 มิลลิเมตร ใบเรียบ ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปใบหอกถึงรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 10-16 เซนติเมตร โคนใบแหลมหรือเป็นรูปลิ้น ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลมด้น ใบคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยงเป็นมันวาว ผิวเป็นมันทั้งสองด้าน สีค่อนข้างแดงเมื่ออ่อน มีเส้นใบข้างมาก เรียวยาว แยกจากกันประมาณ 5 มิลลิเมตร ทำมุมแหลมกับเส้นกลางใบบนเล็กน้อยทั้งสองด้าน เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน บนและมีขนประปรายด้านล่าง ก้านใบ ยาว 1-2 เซนติเมตร มีร่องเล็กตามยาว มีขนสั้นอ่อนนุ่มแล้วเกือบเกลี้ยง ไม่มีหูใบ ช่อดอก ออกตามซอกปลายกิ่ง ดอกเต็มช่อ 5-13 ดอก ช่อดอกแยกแขนง ยาว 10-16 เซนติเมตร ดอกสมบูรณ์เพศหรือมีดอกเพศเดียวและดอกสมบูรณ์ร่วมต้น ดอกมี 4 ส่วน สีขาว มีกลิ่นหอม ดอกออกตรงข้าม ยาว 1-2 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยเรียวยาว เกลี้ยง ยาว 4-12 มิลลิเมตร ใบประดับรูปไข่ ร่วงเร็ว หรือไม่มีใบประดับ มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ เป็นคู่ตรงข้ามสลับตั้งฉาก เรียง 2 ชั้น มีลายเส้นชัดเจน เป็นแผ่นบาง อยู่รอบนอก 2 กลีบ รูปไข่ถึงกลมกว้าง ยาว 2-4 มิลลิเมตร กว้าง 2-3.5 มิลลิเมตร รอบใน 2 กลีบ รูปไข่ถึงไข่กลับ สีขาวคล้ายกลีบดอก ยาว 4-8 มิลลิเมตร กว้าง 3.5-6 มิลลิเมตร กลีบดอกกาง รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาวกว่ากลีบเลี้ยง แต่ร่วงก่อนบาน มีเกสร 130-320 อัน เป็นกระจุกสีทึม ไม่ติดกันเป็นเส้นใบเรียวยาว ติดกันที่โคน ยาว 2.5-5 มิลลิเมตร อับเรณูของเกสรเพศผู้ติดที่ฐาน รูปขอบขนานสีเหลือง ยาว 0.5-1 มิลลิเมตร มีรอยแตกตามยาว รังไข่อยู่สูงกว่าเป็นรูปไข่กลม มี 1 ช่อง ขนาด 1.5-2.5 มิลลิเมตร ออวูลเดี่ยวตั้งขึ้น ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ยาว 2-3 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียแบนก้นปัด ขอบเรียบหรือหยักมนถี่ ขนาด 0.7-1.2 มิลลิเมตร ผล มีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด เป็นรูปกลมรีคว่ำถึงทรงกลม ยาว 2.5-3 เซนติเมตร กว้าง 1.8-2 เซนติเมตร ผนังผลชั้นนอกบางเรียบ ผนังผลชั้นกลางแห้งและแข็งเหมือนหิน ผนังผลในนุ่มเป็นรูปท่อน สีม่วงเข้มเมื่อสุก พบทั่วไปในป่าดิบชื้น สูงได้ถึง 1,600 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : แปลจาก : <http://indiabiodiversity.org/species/show/8627>

ภาพประกอบ : ภาพผล : <https://indiabiodiversity.org/species/show/8627>

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





ไม้ต้นใหญ่ สูงได้ถึง 32 เมตร โคนเป็นร่อง มีพุ่มนวล เปลือกสีน้ำตาลอมเทาอ่อน ขรุขระหรือแตกเป็นเกล็ด มีช่องอากาศ เปลือกในสีแดงเข้ม มีเส้นใย ใบ กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ออกเป็นกระจุก รูปรีถึงไข่กลับ ปลายเรียวหรือแหลมกว้าง โคนแคบ อ่อนมีขนสีน้ำตาลแล้วเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นกลางใบเล็ก เส้นใบ 11-18 คู่ เป็นร่องตื้นด้านบน โค้งเชื่อมกันเป็นเส้น ขอบใบจาง เส้นใบย่อยขนานกับเส้นใบข้างหรือเป็นร่างแห ห่าง จางหรือเป็นร่องตื้นด้านบน ก้านใบยาว 1-2 เซนติเมตร มีขนสีสนิมถึงเกลี้ยง กิ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 2.5 เซนติเมตร กิ่งอ่อนมีขนขุยสีสนิม ดอก เป็นกลุ่ม มี 4-10 ดอก ออกตามซอกใบ ก้านดอกยาว 6-10 มิลลิเมตร มีขนสีสนิม กลีบเลี้ยงยาว 2.5-4 มิลลิเมตร มีขนสีสนิมด้านนอก เกลี้ยงด้านใน กลีบดอกยาว 5-8 มิลลิเมตร จักจี้ก เกสรเพศผู้มี 12 อัน ยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร รังไข่และโคนก้านเกสรเพศเมียมีขน ผล กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 3-4 เซนติเมตร รูปขอบขนาน ปลายเล็ก (ก้านเกสรเพศเมีย) ยาว ประมาณ 1 มิลลิเมตร เป็นสันจาง 12 สัน สีเหลืองอ่อน มีขนสีสนิมหรือเกลี้ยง เมล็ด 1 เมล็ด มีรอยเป็นแผล ใหญ่ (1/3 ของผล) พบตามป่าดิบ สูง 50-900 เมตร จังหวัดระนอง พังงา สตูล ปัตตานี

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ชื่อพื้นเมือง : ขางดง พิกุลเขา พิกุลเถื่อน พิกุลป่า แก้ว กุน ไกรทอง ต้นหยง มะเมา พกุล พิกุลทอง

ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 10-25 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม กว้างหนาทึบ เปลือกต้นเป็นสีเทาอมสีน้ำตาลและแตกเป็นรอยแตกกระแหว่งตามแนวยาว ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาว ส่วนกิ่งอ่อนและตามีขนสีน้ำตาลขึ้นปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันแบบห่าง ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปรี ใบมีความกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมหรือหยักเป็นติ่งสั้น ๆ โคนใบมน ส่วนขอบใบเรียบและเป็นคลื่นเล็กน้อย หลังใบเป็นสีเขียว เรียบเป็นมัน ท้องใบจะเป็นสีเขียวอ่อน และเนื้อใบมีลักษณะค่อนข้างเหนียว ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก ประมาณ 2-6 ดอก โดยจะออกตามซอกใบหรือตามปลายกิ่ง ดอกพิกุลจะมีขนาดเล็กสีขาวนวล มีกลิ่นหอม (กลิ่นยังคงอยู่แม้ตากแห้งแล้ว) และหลุดร่วงได้ง่าย ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ถึงรี ผิวผลมีลักษณะเรียบ ผลอ่อนเป็นสีเขียว มีขนสั้นนุ่ม เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงที่ขั้วผล มีกิลิบลึงติดคงทน ผลมีขนาดกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร เนื้อในผลเป็นสีเหลืองมีรสหวานอมฝาดและมีเมล็ดอยู่ 1 เมล็ด ลักษณะแบนรี แข็ง สีดำเป็นมัน ติดได้ตลอดปี



ข้อมูลอ้างอิง : <https://medthai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%B1%E0%B8%B8%E0%B8%A5/>

ภาพประกอบ : <https://medthai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%B1%E0%B8%B8%E0%B8%A5/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ต้นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่ สูงได้ถึง 40 เมตร โคนเป็นร่องหรือเป็นพูพอนแคบ เปลือกสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นริ้วหรือเป็นแผ่นสากันเป็นร่างแห เปลือกในสีชมพูหรือสีแดง ใบ กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร รูปใบหอกถึงหอกแกมขอบขนาน ปลายเรียวแหลม โคนแหลมถึงกลม ค่อนข้างเบี้ยว เนื้อบางด้านบน เขียวเข้มเป็นมันและเกลี้ยง ด้านล่างมีขนละเอียดสีสนิม แล้วเกลี้ยง ยกเว้นบนเส้นใบหลักไม่เป็นนวล เส้นกลางใบเล็กแบน หรือเป็นร่องด้านบน เส้นใบเล็ก 10-20 คู่ เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด ก้านใบยาว 1-2.5 เซนติเมตร มีขนสั้นสีสนิม กิ่งเล็กเรียว กิ่งอ่อนมีขนละเอียดสีสนิม ดอก สีขาวถึงครีมเหลืองอ่อน ออกเป็นกลุ่ม มี 3-10(14) ดอก ดอกออกตามง่ามใบหรือใต้แผลใบ ก้านดอกยาว 8-12(15) มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงยาว ประมาณ 4 มิลลิเมตร มีขนสีสนิม โดยเฉพาะด้านบน กลีบดอกยาว 6-9 มิลลิเมตร แฉกจักลึก 2/3 ของกลีบเลี้ยง เกลี้ยง หรือพบน้อยมีขน เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 1.3 เซนติเมตร มีขนที่โคน ผล รูปไข่ 1.3-2.5 เซนติเมตร ยาว 3-4.5 เซนติเมตร มีขนละเอียดสีน้ำตาลอมส้ม เมล็ด 1 เมล็ด พบในป่าดิบที่ต่ำ สูงได้ถึง 400 เมตร บางที่พบบนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง: การ์ดเนอร์, โฮมอนด์, ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาการมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาการมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



พิกุลเถื่อน

Payena lucida A.DC.

SAPOTACEAE

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 25 (40) เมตร โคนมีพูพอน สูงได้ถึง 1.2 เมตร เปลือก สีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้ม แตกเป็นแผ่นถึงค่อนข้างแตกเป็นแผ่นเล็ก เปลือกในสีชมพูถึงน้ำตาลแดง ใบ กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 8-21 เซนติเมตร ส่วนมากรูปใบหอกแกมรี ปลายเรียวแหลม โคนรูปกลมกว้าง ค่อนข้างเป็นรูปลิ้นเบี้ยว เนื้อบางคล้ายกระดาษถึงคล้ายหนังบาง ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนสีสนิมแล้วค่อนข้างเกลี้ยง ยกเว้นบนเส้นใบ เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 10-17(22) คู่ เป็นวงและเชื่อมกัน เป็นร่องด้านบน เส้นใบย่อยเป็นร่างแหต่างๆ งามทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-2.2(3) เซนติเมตร เล็กเรียว มีขนขุยสีสนิมถึงเกลี้ยง กิ่งเล็ก เรียว กิ่งอ่อนมีขนขุยสีสนิม แล้วเกลี้ยง ดอกสีขาว ออกเป็นกลุ่ม มี 2-8 ดอก ออกตามง่ามใบหรือใต้แผลใบ ก้านดอก ยาว 8-22 มิลลิเมตร มีขนละเอียด กลีบเลี้ยงยาว 4.5-6 มิลลิเมตร มีขนละเอียดด้านนอก เกือบด้านใน กลีบดอกยาว 7-9(11) มิลลิเมตร จักจี้มากกว่า 1/2 กลีบ เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูมีขน รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียเกลี้ยง ยาว 9-15 มิลลิเมตร ผล รูปรีหรือค่อนข้างกลมกว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 1.5-4 เซนติเมตร ปลายทู่หรือกลม มีขนละเอียดสีสนิม ผลแก่ค่อนข้างเกลี้ยง เมล็ด 1 เมล็ด พบกระจายในป่าดิบที่ต่ำ หรือชายป่าผลัดใบ สูงได้ถึง 500 เมตร บางทีพบบนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพผล : <https://www.inaturalist.org/taxa/427345-Payena-lucida>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



พิกุลใบหนา

Palaquium sumatranum Burck

SAPOTACEAE

ไม้ต้น สูงได้ถึง 45 เมตร เปลือกสีน้ำตาลออกสีสนิม ด้านในสีน้ำตาลซีด กิ่งอ้วนสั้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 มิลลิเมตร มีขนสีน้ำตาลอ่อนประปรายถึงเกลี้ยง ตายาวได้ถึง 12 มิลลิเมตร มีขนเล็กน้อย ใบเลี้ยงรูปใบหอก กว้าง 1.5 มิลลิเมตร ยาว 5 มิลลิเมตร มีขนประปรายด้านบนนอก เกลี้ยงด้านใน ร่วงง่าย ใบขึ้นถี่ทั้งกิ่ง คล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยงทั้งสองด้าน รูปรีถึงขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง 6-9.5 เซนติเมตร ยาว 13-19 เซนติเมตร ฐานใบรูปลิ้น ปลายใบมน เส้นกลางใบด้านบนเห็นได้ชัด ด้านล่างนูนชัด เส้นแขนงใบ 19-24 คู่ ชี้ขึ้นบน ทำมุม 70-85 องศากับเส้นกลางใบ ค่อยๆ จางลงไปยังขอบใบ ด้านบนเรียบ นูนด้านล่าง เส้นแขนงใบย่อยสานกันเป็นร่างแห ก้านใบยาว 2.5-4 เซนติเมตร เป็นร่องและหนาขึ้นเล็กน้อยที่โคน มีขนสีแดงประปรายถึงเกือบเกลี้ยง ช่อดอกออกตามง่ามใบ เป็นกระจุก 1-3 ดอก ก้านดอกโค้ง ยาว 5-8 มิลลิเมตร มีขนสั้นหนานุ่ม สีน้ำตาลปกคลุม กลีบเลี้ยงด้านนอกเป็นรูปไข่ กว้าง 2-5 มิลลิเมตร ยาว 5-6 มิลลิเมตร มีขนสั้นหนานุ่มสีน้ำตาลปกคลุมด้านนอก ด้านในเกลี้ยง กลีบเลี้ยงด้านในขอบเป็นเยื่อบาง วงกลีบดอกเป็นแฉกรูปรีหรือรูปไข่ ยาวได้ถึง 8.5 มิลลิเมตร มีเกสร 12 อัน ก้านชูอับเรณูเป็นเส้นตรง ยาว 2-3 มิลลิเมตร เกลี้ยง เกสรเพศผู้รูปขอบขนานหรือไข่คว่ำ ยาว 2-3 มิลลิเมตร เกลี้ยง อับเรณูมีรอยแตกเห็นออก รังไข่คล้ายรูปจาน ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร มีขนสีน้ำตาลประปราย มี 6 ช่อง ก้านเกสรเพศเมีย รูปลิ้นแคบ ยาว 8-14 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียเป็นแฉก 5 แฉก ผล คล้ายรูปไข่ถึงไข่กลับ ขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร มี 1 เมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดบางมาก เกลี้ยง เมล็ดเล็กกว่าผลเพียงเล็กน้อย ผิวเมล็ดไม่เรียบ เป็นรอยย่นประมาณ 1/4 ของผิวเมล็ด พบกระจายในภาคใต้และมาเลเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : แปลจาก : Tree flora of Sabah and Sarawak volume 4

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



พุดป่า

Rothmannia schoemanii (Teijsm. & Binn.) Tirveng.

RUBIACEAE

ไม้ต้น ขนาดกลาง สูงได้ถึง 29 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นประมาณ 36 เซนติเมตร หน่อใบยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ใบ เดี่ยวเรียงตัวเป็นวงรอบ เส้นแบบขนนก มีขนปกคลุม ดอก ออกเป็นช่อเล็ก สีขาวแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มิลลิเมตร มีหลอดกลีบดอกยาว ผล เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 62 มิลลิเมตร สีเขียว พบในป่าผสมผลัดใบ (เบญจพรรณ) จนถึงระดับความสูง 700 เมตร ปกติพบตามที่ลาดเชิงเขาและสันเขา รวมทั้งในป่ารุ่นสอง



ข้อมูลอ้างอิง : www.asianplant.net

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



พุดพอ

Kopsia pauciflora Hook.f.

APOCYNACEAE

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นเล็ก สูง 10 เมตร เปลือกสีครีมออกน้ำตาลอ่อน มีช่องอากาศนูนขึ้น เปลือกนอกสีส้มอ่อน มียางขาวมาก ใบรูปรี กว้าง 2.5-11 เซนติเมตร ยาว 5-27 เซนติเมตร ออกตรงข้าม ปลายแหลมทู่ โคนใบรูปปลีถึงกลม ใบแก่สีเขียวด้านบน ด้านล่างสีเขียวอมเหลือง เนื้อคล้ายหนัง เกือบทั้งสองด้าน เส้นใบ 8-20 คู่ เห็นชัด ก้านใบยาว 0.4-1.2 เซนติเมตร มีต่อมที่ง่ามใบ กิ่งเกลี้ยงเล็กเรียวปล้องยาว ดอก กว้าง 3.5-5 เซนติเมตร สีขาว มีตาสีเหลือง บางทีสีขาวบริสุทธิ์ เป็นช่อแตกแขนง ยาว 5-10 เซนติเมตร มีเพียง 1-2 ดอกที่บานในเวลาเดียวกัน แกนกลางช่อเกลี้ยง ก้านช่อยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ก้านดอกย่อยยาวถึง 0-5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร สีแดงเข้ม รูปขอบขนาน ปลายกลม เกือบทั้งช่อมีขนละเอียดโดยเฉพาะตามขอบ กลีบดอกรูปคล้ายดอกเข็ม หลอดกลีบดอกบานที่ปลายหรือใกล้ปลาย มีหลอดกลีบเล็ก ยาว 2.5-4.5 เซนติเมตร (1-1.5 เท่าของพุกกลีบ) มีขนที่ปากหลอดตอนบนด้านใน พุกกลีบรูปไข่กลับ กว้าง 0.8-1.2 เซนติเมตร ยาว 1.5-3 เซนติเมตร เกือบทั้งสองด้าน ไม่มีขนที่ขอบ เกสรเพศผู้ติดที่ส่วนบนของหลอด โคนหลอดมีหลอดดอก ก้านเกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร อับเรณูยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร รูปหัวใจ สีน้ำตาลอมครีม รังไข่เกลี้ยง 2 อันแยกกัน มีต่อมแคบ 2 ต่อมที่โคน ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ผล ยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร ออกเป็นคู่ มีจะงอยใหญ่ ด้านในมีเนื้อ ผนังผลชั้นในบาง เมล็ดขนาด 8-20 มิลลิเมตร พบกระจายกว้างทั่วในป่าดิบหรือป่าดิบ-ป่าไผ่ ความสูง 300 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชนอน ฟินลา สิริสุนทร ก่อภานตา ชามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คืบไพล 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordname=Kopsia%20pauciflora%20Hook.f.>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

