

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 12 เมตร ความยาวรอบลำต้น 30 เซนติเมตร กิ่ง แข็ง มีขนบางถึงหนาแน่น (สั้น เรียบ มีขนรูปดาวอยู่เป็นกระจุก) ทุใบ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม มักจะร่วงเร็ว ตั้งตรง ขนาดความยาว 1-4 มิลลิเมตร กว้าง 0.5-1.5 มิลลิเมตร ก้านใบ มีขนเบาบางถึงหนาแน่น ใบ ออกตรงข้าม รูปไข่ ยาว 10.5-20 เซนติเมตร กว้าง 4-8 เซนติเมตร ก้านใบยาว 2 เซนติเมตร เส้นกลางใบยาว 6 เซนติเมตร เส้นแขนงใบ 5-12 คู่ ไม่บรรจบกันที่ขอบ ฐานใบกว้าง โค้งมนเล็ก น้อยขอบใบหยักแบบฟันปลาเล็กน้อย ผิวใบทั้งสองด้านเกลี้ยงและมีขนประปรายบนเส้นใบ บริเวณฐานของเส้นใบมีต่อม 2-8 ต่อม ต่อเนื่องตามแนวขอบใบทั้งสองด้าน ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกไม่แตกแขนง ดอก อยู่เป็นกลุ่ม มีใบประดับบริเวณขอบ ผล มีขนาดโตได้ถึง 6 เซนติเมตร (รวมปีก) มี 3 พู ไม่มีหนามแต่มีขนยาวคล้ายหนาม เอนราบปกคลุมผล พบที่ความสูงตั้งแต่ 50 เมตร ขึ้นไปตามป่าดิบชื้นและป่าพรุ



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.asianplant.net/MacMalBorneo/Mallotus%20sumatranus.htm>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



## มะเกลือกา

*Diospyros defectrix* Fletcher

EBENACEAE

**ไม้ต้น** ขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 10 เมตร เปลือกสีดำ แตกเป็นสะเก็ด ตามยอดปกคลุมด้วยขนสั้นนุ่ม สีนํ้าตาล ก้านใบยาว 0.6-1.5 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีถึงรูปรีแคบ กว้าง 3.5-5 เซนติเมตร ยาว 10-14 เซนติเมตร ใบบางคล้ายกระดาษ เกือบทั้งสองด้าน เมื่อแห้งผิวด้านล่างเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ผิวด้านบนเป็นสีเขียว โคนรูปไข่ กว้างถึงมน ขอบเรียบ ปลายหู่ เส้นใบข้างละ 6-8 เส้น ปลายโค้งเกือบจรดกัน เส้นแขนงใบแบบร่างแห เห็นชัดเจน ทั้งสองด้าน ดอกแยกเพศ ออกรวมกัน ดอกเพศผู้ ออกแบบช่อกระจุกตามซอกใบ หลุดร่วงง่ายหลังจากบานเต็มที่ วงกลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปประฆัง ปลายแยกเป็น 4 แฉก ด้านนอกมีขนคล้ายเส้นไหม ด้านในมีขนสั้นนุ่ม กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปคนโท ยาว 3-4 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 16-18 อัน รังไข่ไม่เจริญปกคลุมด้วยขนหยาบแข็ง ดอกเพศเมีย ออกเดี่ยว ๆ ก้านดอกสั้นมาก วงกลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปประฆัง ปลายแยกเป็น 4 แฉก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปคนโท ไม่มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน รังไข่กลม ปกคลุมด้วยขนคล้ายเส้นไหม มี 4 ช่อง ก้านยอดเกสร 1 อัน ผล แบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ดทรงรีถึงเกือบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร เกือบเกลี้ยง ผลสุกสีเหลืองแกมส้มหรือแดง ก้านผลสั้นมาก วงกลีบเลี้ยงติดทนปกคลุมด้วยขนสั้นหนานุ่มทั้งสองด้าน กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาว 3.5-5 มิลลิเมตร พบในป่าดิบแล้ง และป่าละเมาะเขาหินปูน ที่ความสูงจากระดับทะเล 10-500 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : [www.asianplant.net](http://www.asianplant.net)

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 28 เมตร กิ่งเล็กเรียวห้อย มีใบแผ่แบนคล้ายขนนก ลำต้นตะปุ่มตะป่ำ หรือเป็นร่องเมื่ออายุมาก ใบ ยาว 8-16 เซนติเมตร ใบประกอบขนนกยอตกู่ ใบย่อย 10-18 คู่ ออก(กึ่ง)ตรงข้าม กว้าง 0.4-1 เซนติเมตร ยาว 1-3 เซนติเมตร รูปขอบขนานถึงรูปแถบปลายคล้ายหัวนม โคนกลมเบี้ยว ก้านใบย่อยสั้นมาก ยออ่อนสีเขียวอ่อน มีขนละเอียดสีเงิน ใบแก่สีเขียวเข้มช่นด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่า เกือบ ดอกสมบูรณ์เพศ ไม่สมมาตร ออกเป็นช่อโปร่งไม่แตกแขนง ยาว 2-14 เซนติเมตร ระหว่างใบหรือใต้ผลใบ ก้านดอกยาวได้ถึง 1.4 มิลลิเมตร ฐานดอกสูง 5 มิลลิเมตร รูปลูกข้างแคบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กว้าง 5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 12 มิลลิเมตร สีเหลืองอ่อนหรือส้ม รูปขอบขนานแกมรี เรียงซ้อนกัน กลีบดอก 3(5) กลีบ สีครีมหรือเหลืองอ่อน มีเส้นสีแดง กลีบบนกว้าง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 10-12 มิลลิเมตร รูปขอบขนานโคนรูปหัวใจ กลีบข้างกว้าง 6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 13 มิลลิเมตร รูปขอบขนานแกมไข่กลับ โคนแคบ กลีบล่างลดรูปมากหรือไม่มี เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 3 อัน ยาว 12-15 มิลลิเมตร เชื่อมกันครึ่งหนึ่งของหลอด มีขนติดสลับกับเกสรเพศผู้เป็นหมัน 4-5 อัน คล้ายซี่ฟัน รังไข่ยาว 7 มิลลิเมตร ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว 7 มิลลิเมตร ผล ห้อย กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร รูปขอบขนาน ตรงหรือโค้ง มักเป็นแอ่งระหว่างเมล็ด สีน้ำตาล มีขุย เปลือกแข็งบางเปราะ ไม่แตก เมล็ดสีน้ำตาลเข้มประมาณ 12 เมล็ด มีเนื้อ เป็นเส้นใยล้อมรอบ อาจเป็นพิษพื้นเมืองของแอฟริกา ตะวันออก พบในป่าดิบที่ต่ำ จังหวัดสตูลถึงนราธิวาส ปลูกกันมากในภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง: ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 2 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559, 792 หน้า

ภาพประกอบ: www.google.com



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



## มะขามป้อม

*Phyllanthus emblica* L.

PHYLLANTHACEAE

ชื่ออื่น : กันโตด กำหวด

ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-12 เมตร เปลือก ตันสีน้ำตาลปนเทา ผิวค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องตามความยาวของลำต้น เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้าง ปลายลู่ลง ใบ ประกอบออกเรียงสลับกัน ใบย่อยเล็ก ขนาดใบกว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ขอบใบขนานกัน ปลายใบมนป้าน โคนใบมนแคบเข้าหาก้านใบ ดอก ดอกเล็ก มากสีขาวหรือขาวนวล ออกรวมกันเป็นกระจุกตามง่ามใบ ผล กลมแข็งอูม่น้ำ โตเต็มที่เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 2 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวอ่อนค่อนข้างใส ผลแก่สีเขียวอมเหลือง รสฝาดเปรี้ยว ใช้รับประทานได้ เป็นไม้ดั้งเดิมแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้ง และป่าดิบแล้งทั่วไป ที่สูงจากระดับ น้ำทะเล 150-300 เมตร การผลัดใบจะผลัดใบหมดทั้งต้นและผลิใหม่ในเวลาอันรวดเร็ว ออกดอก มกราคม- มีนาคม เป็นผล กุมภาพันธ์-เมษายน



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/EPAC/province\\_plant/sakeaw.htm](http://www.dnp.go.th/EPAC/province_plant/sakeaw.htm)

ภาพประกอบ : [http://www.qsbg.org/database/botanic\\_book%20full%20option/search\\_detail.asp?botanic\\_id=1768](http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1768)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ชื่ออื่น : มะกล่ำตาช้าง กาสะทอน ไคร้อยง เล็บมื่น คางซุงหลวง ถ่อนภู เลน หัสกีน เหมือดหยวก นมวา ยมวา

ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 15 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงเวียนสลับ ก้านใบรวมเป็นเหลี่ยม ยาว 15-30 เซนติเมตร ใบย่อย มี 5-8 คู่ รูปขอบขนาน กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 2-6 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อแบบแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ช่อยาว 30-50 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว ยาว 4-8 มิลลิเมตร ผล เป็นฝักแบบถั่วแบนบิดโค้ง กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร สีส้มถึงแดง แตก ออกเป็น 2 แฉก เมล็ดรูปกลมแกมรีสีดำ กระจายพันธุ์ในเขตร้อนและกึ่งร้อนในทวีปเอเชีย ประเทศไทยพบใน ป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล ประมาณ 1,000 เมตร

เปลือกต้นด้านใน บรรเทาอาการปวดฟัน ใช้อาบสำหรับคนเป็นลม ใบ แก้ไข้ แก้กตาแดง ชี้ตามาก แก้กตาตาย ตันตัมล้างตาแก้ตาพร่ามัว ใบ หรือทุกส่วน ใช้อาบน้ำสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.qsbj.org/Database/BOTANIC\\_Book%20full%20option/search\\_detail.asp?botanic\\_id=2513](http://www.qsbj.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2513)

ภาพประกอบ : [http://www.qsbj.org/Database/BOTANIC\\_Book%20full%20option/search\\_detail.asp?botanic\\_id=2513](http://www.qsbj.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2513)



# จีชันโจร

*Kokoona filiformis* C.E.C.Fisch.

CELASTRACEAE

ไม้ต้นสูงถึง 30 เมตร กิ่งก้านเล็กเรียว สีนํ้าตาลเข้ม เปลือก สีนํ้าตาลอมเทา แตกเป็นแผ่นเปราะหักง่าย ชื้น กลางมีสีเหลืองสด เปลือกในสีนํ้าตาลอมแดง ใบ รูปไข่ หรือรีกว้าง 1.8-4 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร ปลาย เรียวแหลม โคนทู่หรือแหลม ขอบเป็นคลื่นหรือจักเป็น ชีฟันเล็กน้อยใกล้ปลาย ใบแก่คล้ายกระดาษ เกลี้ยง ก้านใบยาว 1 เซนติเมตร ไม่มีหูใบ ดอก ยาว 0.6 เซนติเมตร สีครีมหรือสีเหลืองอ่อน หอมอ่อน เป็นช่อ แตกแขนงเล็กที่ซอกใบบนๆ หรือที่ปลายกิ่ง ยาวถึง 7 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 1-2.5 มิลลิเมตร เล็ก กลีบ เลี้ยงจักเป็นพู่กลมสั้น 5 พู่ กลีบดอก 5 กลีบ ตั้ง รูปไข่ ยาว 3 มิลลิเมตร ปลายกลมและขอบโค้งกลับ ปิดในตา ดอก เกลี้ยง ไม่มีริ้วประดับใน เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาว 2.5 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูเล็กยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ปลายมน อับเรณู 1 มิลลิเมตร รูปขอบขนาน ติดกับจาน ฐานดอกรูปถ้วย เกสรเพศเมียยาว 2 มิลลิเมตร สีเหลือง อ่อน จมอยู่ในจานฐานดอกครึ่งหนึ่ง รูปแฉกแคบไป ยังก้านเกสรเพศเมียสั้น ผล (ไม่พบในไทย) กว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร พบน้อยในชั้นเรือนยอด สูงในป่าดิบ-ป่าไผ่ ตามสันเขาสูง 200 เมตร



ข้อมูลอ้างอิงการค้นคว้า, โหมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ขยาฤดีไม้ป่าภาคใต้ เน้น - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558  
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



**ไม้ต้น** สูงถึง 30 เมตร เรือนยอดแคบไม่เป็นระเบียบ ลำต้นเป็นเสากลม เปลือก สีนํ้าตาลอมเทาถึงนํ้าตาลเข้ม เรียบหรือแตกเป็นแผ่นหรือเกล็ด เปลือกในขาวถึงเหลืองอ่อน ใบ ออกสลับหรือเวียนสลับแผ่แบน ส่วนมากรูปรีหรือขอบขนาน กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 8-16 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนหูถึงรูปลิ้ม ขอบจักซี่ฟันละเอียด ใบแก่ด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวออกเทา อ่อน เส้นกลางใบแบนด้านบน เส้นใบ 6-10 คู่ โค้งจางหายไปใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อยจางด้านบน ชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.5-1.3 เซนติเมตร หูใบเล็กมาก กิ่งสีน้ำตาลอ่อน ถึงสีน้ำตาลแดง เกือบดำ มักคดไปมา ดอกยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ไม่สมมาตร ดอกสมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ สีส้มถึงสีขาวหรือค่อนข้างโปร่งแสง มีแต่มีสีเขียว ออกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อ มีดอกไม่มากนักที่ช่อ ใบ ก้านช่อดอกสั้น ยาว 0.5-1.5 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 0.5-1 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงจักเป็นพู 5 พู ยาว 1-2 มิลลิเมตร รูปกลมหรือรูปไข่ ช้อนกัน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ปลายหู่หรือกลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาว 1-2 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูแบนคล้ายสายหนัง โคนล่างเชื่อมติดกัน เป็นวงรอบจานฐานดอก มักโค้งเข้าไปในกลีบเกสรเพศเมีย รังไข่มีหลายช่อง ค่อนข้างจมในฐานดอกใหญ่ๆ สีเขียว ปลายกลวง มีก้านเกสรเพศเมีย อยู่ตรงกลาง ผล ทรงกลมถึงรูปไข่กลับหรือรูปลูกแพร์ยาว 3-6 เซนติเมตร สีเขียวสด สุกสีเหลือง มีปมหนาหรือเปลือกเขียวอ่อน แก่ไม่แตก ภายในแน่นและแข็ง มีผนังหุ้ม เมล็ดแข็งคล้ายหิน พบกระจายทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำหรือป่ากึ่งผลัดใบ มักพบที่เชิงเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : โชนอน การ์ดเนอร์ พันธุศาสตร์ กิ่งก้านตา ขยายผล ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพมหานคร :โครงการจัดพิมพ์คปท. 2558. 768 หน้า

ภาพผล/ดอก : <http://www.dnp.go.th/botany/plantdetail.aspx?monthno=201704&monthname=April&language=thai>

ภาพใบ : <http://crassa.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/siphonodon-cela.html>



## มะเดื่อขาว

*Ficus callosa* Willd.

MORACEAE

ไม้ต้น ไม้เฝ้าค้ำไม้อื่น ผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 30 เมตร เรือนยอดกลม ลำต้นเป็นทรงกระบอก โคนมีพูพอนหนาสูงชันเมื่ออายุมาก เปลือก สีเทาอ่อน เกลี้ยง มีช่องอากาศเล็ก เปลือกในสีน้ำตาลอมส้มอ่อน มียางขาวเป็นน้ำ ใบ กว้าง 6-12 เซนติเมตร ยาว 14-28 เซนติเมตร ออกสลับเรียงเวียน รูปรีถึงขอบขนานหรือกึ่งรูปไข่กลับ ปลายทุ่หรือแหลมสั้น โคนทุ่ถึงกลมหรือกึ่งรูปหัวใจ เท่ากันหรือเบี้ยวเล็กน้อย ขอบไม่จัก ยอดอ่อนมีขนเส้นไหม ใบแก่เนื้อคล้ายหนังค่อนข้างแข็ง เป็นเงาและเกลี้ยงด้านบน เนื้อหยาบขัด (คล้ายกระดาษทราย) แต่ไม่มีขนด้านล่าง เส้นกลางใบนูนเล็กน้อย หรือกึ่งแบน เส้นใบจากโคนใบ 1-2 คู่ เล็กเรียวยาวไปถึง 1/10 ถึงครึ่งหนึ่งของใบ เส้นใบข้าง 7-10 คู่ นูนชัดด้านล่าง เป็นวงและเชื่อมกันใกล้ขอบ เส้นใบย่อยคล้ายชั้นบันไดจาก ละเอียดแต่เห็นทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 3-8 เซนติเมตร มักยาวไม่เท่ากันในกิ่งเดียวกัน เป็นร่องด้านบน ไม่เป็นเกล็ด หูใบยาว 1-3 มิลลิเมตร มีขนเส้นไหม ร่วงเร็ว ผล ขนาด 1.8-2.5 เซนติเมตร ก้านเล็กเรียวยาว 1-2.5 เซนติเมตร (รวมคอผลยาวถึง 1.2 เซนติเมตร) ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ที่ง่ามใบใต้แผลใบ ทรงกลมถึงรูปไข่หรือคล้ายลูกแพร์โคนแคบเป็นคอยาว 1.2 เซนติเมตร มีขนเล็กสั้นนุ่ม สีเขียวอมเทา แก่สีออกเหลืองอ่อน ใบประดับติดทนที่โคน 2-3 ใบ ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร พบทั่วไปในป่าภาคใต้ ในป่าดิบหรือป่ากึ่งผลัดใบ สูงถึง 1,000 เมตร มักพบใกล้ลำน้ำหรือเชิงหน้าผาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Ficus+callosa>

ภาพผล : [http://www.qpb.org/Database/Botanic\\_Book%20full%20option/search\\_detail.asp?botanic\\_id=2618](http://www.qpb.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2618)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



## มะเดื่อทอง

*Ficus vasculosa* Wall. ex Miq.

MORACEAE

ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ ไม้อาศัยไม้อื่น สูงได้ถึง 20 เมตร เรือนยอดแคบ ลำต้นกลม โคนค่อนข้างมีพูพอน เมื่ออายุมากขึ้น เปลือก สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลอมเทา เรียบหรือค่อนข้างหยาบ โดยมีช่องอากาศเล็กๆ หนูน เปลือกในสีครีมหรือส้มอ่อน มียางขาวคล้ายน้ำประปราย ใบ กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 7-16 เซนติเมตร ออกสลับเรียงเวียน รูปรีแคบถึงขอบขนาน หรือกึ่งรูปไข่กว้าง ปลายทุติงเรียวแหลมสั้น ยาว 1-1.5 เซนติเมตร โคนทุติหรือรูปลิ้น ไม้เบี้ยว ขอบไม้จัก ใบแก่เนื้อบางแต่แข็ง เป็นมันด้านบน ด้านล่างสีออกเทา เกือบทั้งสองด้าน ไม่มีต่อมไข เส้นกลางใบแบนหรือมนเล็กน้อยด้านบน เส้นใบจากโคนไม้ชัด เส้นใบข้าง 8-14 คู่ เป็นวงใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อยคล้ายร่างแหหรือมีบางส่วนขนานกับเส้นใบข้าง หนูนชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 1-4 เซนติเมตร เล็กเรียว ยาวเท่ากันบนกิ่งเดียวกัน เกือบหรือมีขนนุ่มสั้นมากเมื่ออ่อน ทุติยาว 0.4 -1.2 มิลลิเมตร เกือบ ร่วงเร็ว ผล ขนาด 1-1.3 เซนติเมตร ก้านเล็กเรียวยาว 0.5-1.2 เซนติเมตร ออกเป็นคู่ที่ง่ามใบหรือใต้แผลใบ ทรงกลมหรือคล้ายลูกแพร์ ตรงช่องเปิด แบนหรือมน โคนแคบเป็นคอเรียวยาวได้ถึง 7 มิลลิเมตร เกือบ สุกสีเหลืองถึงชมพูอมส้มแล้วเป็นสีแดง ใบประดับเล็กที่โคน 3 ใบ ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร พบทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำที่ถูกทำลายหรือป่าดิบ ป่าไผ่ทั่วภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไซมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



## มะเดื่อปล้อง

*Ficus hispida* L.f.

MORACEAE

ชื่อพื้นเมือง : มะเดื่อปล้อง, เตื่อป่อง, เตื่อสาย, ตะเอน่า, เอาแทน, สะกอสะนียา



**ไม้ต้น** เล็ก ไม่อาศัยไม้อื่น ไม่ผลัดใบหรือผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 12 เมตร เปลือก สีเทาอ่อนเรียบหรือหยาบเพราะมีช่องอากาศนูนและสันตามแนวราบ เปลือก ในสีครีมมียางขาวจำนวนมากหรือแทรกอยู่ประปราย ใบ กว้าง 5-13 เซนติเมตร ยาว 11-28 เซนติเมตร ออกตรงข้ามเรียงเวียน (หรือกึ่งแผ่แบนแผ่ระนาบเดียวบนกิ่งเมื่อยังอ่อน) รูปไข่แคบ ถึงขอบขนานแกมรีหรือรูปไข่กลับ ปลายแหลมหรือเรียวแหลมสั้น โคนห้ถึงกลมหรือรูปหัวใจตื้น อาจเบี้ยวเล็กน้อย ขอบจักละเอียดอย่างน้อยในครึ่งบน โดยมีหนามหยาบๆ โดยเฉพาะบนเส้นใบด้านล่าง เส้นใบจากโคนยาวไปถึงครึ่งใบ มักแตกแขนง เส้นใบข้าง 6-10 คู่โค้งชัด มักแตกง่ามหรือแตกแขนงห่างจากขอบใบ มีต่อมไขเล็กๆ ที่ซอกเส้นใบ เส้น ใบย่อยคล้ายชั้นบันได นูนด้านล่าง ก้านใบยาว 1.5-6(10) เซนติเมตร มีขนหยาบ มีเกล็ด มักมีต่อมไข 1 คู่ ที่โคน หูใบยาว 1-2.5 เซนติเมตร มีขน ค่อนข้างติดทน กิ่งล่ำ กลวงและมีหนามเมื่ออ่อน ผล ขนาด 2-4 เซนติเมตร มีก้านชัดยาว 0.5-2.5 เซนติเมตร ออกเป็นช่อตามลำต้น เล็กเรียวยาวไม่มีใบ ยาวได้ถึง 1.5 เซนติเมตร ห้อยตามลำต้นและกิ่งใหญ่ พบบ้างเลื้อยไปตามพื้นดิน บางที่ทิ้งามใบโดยเฉพาะต้นที่ยังอ่อนอยู่ ผลทรงกลมถึงรูปไข่กลับ หรือคล้ายลูกแพร์ ปลายแบนหรือป้อมเล็กน้อย ช่องเปิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 มิลลิเมตร ล้อมรอบด้วยใบประดับใหญ่ 5-6 ใบ โคนมักแคบ สั้น เป็นคอเรียวยาวได้ถึง 6 มิลลิเมตร มีสันจางสูงสี่เหลี่ยม ชุ่มมีจุดจาง ขนหยาบละเอียด มักมีเกล็ดด้านข้าง 2-3 เกล็ด ก้านผลยาว 1.2-5 เซนติเมตร เล็กเรียวยาว มีวงใบประดับเล็ก รูปสามเหลี่ยม 3 ใบ พบมากในป่า รุน และป่าที่ถูกทำลายทั่วไปในภาคใต้

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ฅนวิทย์พันธุ์พืชและสวนพฤกษศาสตร์, 2561. 880 หน้า  
ภาพประกอบ : [http://biodiversity.forestry.go.th/index.php?option=com\\_dofplant&id=186&view=showone&Itemid=59](http://biodiversity.forestry.go.th/index.php?option=com_dofplant&id=186&view=showone&Itemid=59)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

