

มะไฟชวา

Baccaurea javanica (Blume) Mull.Arg.

PHYLLANTHACEAE



ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3-12 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร ไม้มีพุ่มหรือมี ความสูง 30 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร หนาประมาณ 5 เซนติเมตร แขนงกิ่งกลม มีขนเล็กๆปกคลุมกิ่งเมื่อยังอ่อน เปลือกสีน้ำตาลอ่อนถึงสีเทาอ่อน เปลือกหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร เรียบและนํม แก่นไม้สีน้ำตาล ใบ ก้านใบ ยาวประมาณ 2-4.5 มิลลิเมตร ทรงกลม เป็นสีน้ำตาลเมื่อแห้ง หูใบ 1-6 คู่ ยาว 1-2 มิลลิเมตร มีขนปกคลุม ทั้งสองด้าน ดอก ช่อดอกออกตามง่ามด้านล่าง ของใบ ยาวประมาณ 1.5-14 เซนติเมตร หนาประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร มีขนปกคลุมกระจายถึงโคนข้างเกลี้ยง มีหลายดอกย่อยกระจายในช่อดอก ผล ทรงกลมถึงทรง กระบอก มี 1-2(4) เมล็ด เป็นผลสดแบบมีผนังเมล็ดหุ้ม ขนาด 10-17 ถึง 7-11 มิลลิเมตร ผลจะไม่แตกกลางพู สีส้มถึงสีเหลือง ก้านผลยาวประมาณ 1.5-5 มิลลิเมตร ผนังผลหนา ประมาณ 0.1-1.5 มิลลิเมตร เมล็ด เป็นรูป ทรงรีถึงทรงกลม สีม่วงแกมฟ้าถึงม่วงเข้มพบในป่าฝนหรือบริเวณแหล่งน้ำสะอาด จนถึงระดับความสูง 1,800 เมตร ติดดอกและผลตลอดทั้งปี

ข้อมูลอ้างอิง : nationalherbarium.nl

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/rarefruit/6084448606/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



มะไฟดิน

Baccaurea ptychopyxis Airy Shaw

PHYLLANTHACEAE

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 9 เมตร แตกกิ่งก้านพุ่มคล้ายเชิงเทียน กิ่งย่อยเกลี้ยง หรือเป็นขนบางๆ มีหูใบ ขนาด 1.7-3 x 4.3-6.5 มิลลิเมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว ก้านใบยาว 9-46 มิลลิเมตร ใบรูปรีถึงรูปไข่กลับ ขนาด 3.3-7.8x7.4-20 เซนติเมตร เนื้อใบคล้ายแผ่นกระดาษ ฐานใบสอบเรียวถึงเป็นรูปลิ้น เส้นแขนงใบ 6-8 คู่จะ ไม่พบต่อมกลมๆ ใต้ท้องใบเหมือนชนิดอื่นในสกุลมะไฟ ดอกเป็นแบบแยกเพศ ออกเป็นช่อ ช่อดอกเพศผู้เป็น ช่อเดี่ยว ออกตามลำต้นถึงง่ามใบ ช่อดอกยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร ดอกเพศผู้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.6-3.1 มิลลิเมตร มีสีแดง ช่อดอกเพศเมียออกเป็นช่อกระจุก ตามลำต้นถึงกิ่ง ยาวได้ถึง 36 เซนติเมตร พบได้ทั่วไปใน ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ จนถึงความสูง 1,200 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.nationalherbarium.nl/ThaiEuph/ThSpecies/ThBaccaurea.htm>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้น สูงได้ถึง 12 เมตร ลำต้นเป็นปุ่มปม แตกกิ่งไม่เป็นระเบียบ เปลือก สีเทาอ่อนถึงสีน้ำตาล ค่อนข้างหยาบและแตก เป็นเกล็ด เปลือกในสีเหลืองอ่อน ใบ กว้าง 4-15(26) เซนติเมตร ยาว 10-30 (45) เซนติเมตร ออกห่างๆ กัน (ไม่ชิดกันเป็นกลุ่ม) รูปรีถึงรูปไข่กลับ ปลายแหลมสั้น โคนแคบถึงกลม ยอดอ่อนเกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยงใบแก่เนื้อคล้ายแผ่นกระดาษ เมื่อแห้งสีเขียวอมเทา เกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านล่างไม่มีต่อม เส้นใบ 6-11(13) คู่ โค้งเป็นวงใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแห ก้านใบยาว 2-12(18) เซนติเมตร เกลี้ยง ทุใบกว้าง 2-6 มิลลิเมตร ยาว 5-16 มิลลิเมตร ติดแน่น ดอกเพศผู้ขนาด 2-7 มิลลิเมตร สีครีมถึงสีเหลืองหรือสีม่วงอมชมพู ออกเป็นช่อ เกลี้ยงยาวได้ถึง 18 เซนติเมตร ตามลำต้นมีหลายช่ออยู่ด้วยกัน ใบประดับยาว 0.4-1.5 มิลลิเมตร ดอกออกตามแกนกลาง ก้านดอกยาว 2-7 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงมี 3(4-5) กลีบ กว้าง 0.5-3 มิลลิเมตร ยาว 1.6 มิลลิเมตร รูปไข่กลับถึงรูปช้อน มักมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน บางที่มีจำนวนเท่ากับกลีบดอกที่ลดรูป เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มี 3(4-5) อัน ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณู ตรงเกสรเพศผู้เป็นหมัน มี 3-5 อัน ดอกเพศเมีย ขนาด 3.5-10 มิลลิเมตร สีครีมถึงสีส้มหรือสีม่วงอมแดง ออกเป็นช่อ เกลี้ยง ยาวได้ถึง 50 เซนติเมตร ออกบนปุ่มแข็งบนลำต้นหลัก มีสองสามช่อ ก้านดอกยาว 1-4.5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงมี 4-5 กลีบ กว้าง 1-3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1-6 มิลลิเมตร รูปไข่ถึงไข่กลับ กลีบดอกลดรูปมี 2-8 กลีบ ยอดเกสรเพศเมียขนาด 0.7-1 มิลลิเมตร จักจี้หรือเป็นง่ามไม่มีก้านเกสรเพศเมีย ผล ขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร สีขาวหรือสีเขียวอ่อน ทรงกลมหรือรี แก่ไม่แตก เกลี้ยงทั้งสองด้าน มี 1-4 เมล็ด เนื้อใสหรือสีขาว พบในป่าดิบเดิมและป่ารุ่นสูงได้ถึง 1,300 เมตรบางที่พบบนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โทมัส ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ธรินพริ้นต์แอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), 2561, 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพบน : [https://www.sciencesource.com/archive/Mulu-Apple-tree-\(Baccaurea-lanceolata\)-SS2769932.html](https://www.sciencesource.com/archive/Mulu-Apple-tree-(Baccaurea-lanceolata)-SS2769932.html)

ภาพล่าง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



มะไฟลิง(จำไทร)

Baccaurea polyneura Hook. f.

PHYLLANTHACEAE

ไม้ต้น สูงได้ถึง 22(30) เมตร แตกไม่เป็นระเบียบ มีพุ่มพอง เปลือก สีครีมอมน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม แตกเป็นเกล็ด เปลือกในสีแดงอมชมพู ใบ กว้าง 6-12 เซนติเมตร ยาว 15-22 เซนติเมตร ไม่เป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง รูปไข่ถึงขอบขนานแกมรี ปลายกลมหรือแหลม โคนกลมถึงรูปหัวใจหรือสอบแคบ ยอดอ่อนมีขนเส้นไหม ใบแห้งสีออกน้ำตาล ด้านบนมีขนตามเส้นใบ ด้านล่างมีขนสั้นสีน้ำตาลอมเหลือง ไม่มีจุดต่อม เส้นใบ 7-14 คู่ เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได ก้านใบยาว 1-7 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลอมเหลือง แน่น หูใบยาว 2-10 มิลลิเมตร ปลายแคบแหลม ดอกเพศผู้ขนาด 1.1-3.3 มิลลิเมตร สีขาวออกเขียวถึงเหลือง เป็นช่อแน่น ยาวได้ถึง 7 เซนติเมตร ตามซอกใบหรือขีดใต้ผลใบ (หรือออกตามกิ่งแก่) มี 1-5 ช่อ ใบประดับยาว 0.2-1.3 มิลลิเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 4-6 กลีบ ยาว 0.7-1.5 มิลลิเมตร รูปไข่ เกสรเพศผู้มี 4-8 อัน ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูตั้งหรืองอเป็นเข่า ดอกเพศเมียขนาด 2.5-6.5 มิลลิเมตร สีน้ำตาลอมเหลืองมี 1-3 ช่อ ยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร ตามซอกใบหรือกิ่งแก่ ก้านดอกยาว 2-6 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ ยาว 0.5-6 มิลลิเมตร รูปไข่ ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 0.2 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียยาว 0.6-0.9 มิลลิเมตร จักเกินครึ่ง ผล กลม กว้าง 1.2-2.8 เซนติเมตร สีเหลืองแก่สีส้มหรือน้ำตาลอมเหลือง แก่จัดแตก มีขนถึงขนคล้ายไหม เมล็ดมีเนื้อสีแดงอมส้ม พบน้อยในป่าดิบหรือป่าพรุ สูงได้ถึง 600 เมตร พบที่จังหวัดพังงา สตูล



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชนอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



มะม่วง

Mangifera indica L.

ANACARDIACEAE

ไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาล หรือน้ำตาลดำ ถ้าสับเปลือกมียางใสๆ ซึมออกมา ยางเมื่อถูกอากาศนานๆ จะเปลี่ยนเป็นสีดำ ฝักนี้จะกั้วผิวหนึ่ง ใบดกหนาทึบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมรูปหอก ยาว เนื้อใบหนาเหนียวเป็นมัน ดอก ช่อดอกย่อยสีเหลืองอ่อนๆ ขนาดเล็กมาก รวมกันอยู่เป็นช่อใหญ่ออกที่ปลายกิ่ง ในช่อจะมีดอกทั้งเพศผู้และเพศเมียปะปนกันอยู่ เกสรเพศผู้มี 5 อัน แต่จะเป็นเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์เพียงหนึ่งอัน ผล กลมหรือรี มีเนื้อมาก มีเมล็ด 1 เมล็ด ผลสุกเนื้อจะนิ่ม มีสีเหลืองถึงเหลืองส้ม กลิ่นหอม รสหวานมีเส้นใยมาก



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.rspg.or.th/plants_data/homklindokmai/budhabot/mango.htm

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Mangifera+indica>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



มะม่วงชี้กวาง

Mangifera macrocarpa Blume

ANACARDIACEAE

ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ บางทีอาจผลัดใบ ไม่มีพุ่มพอง เปลือก เรียบถึงแตกเป็นร่องหรือเป็นเกล็ด เปลือกในมีจุดสีเหลืองถึงอมน้ำตาล มีน้ำเลี้ยงใสหรือสีน้ำตาลแดง เมื่อถูกอากาศจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเข้ม มีกลิ่นฉุนสน ใบ ยาว 4-6 เท่าของความกว้าง ใบรูปใบหอกแกมขอบขนานแคบ กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 15-45 เซนติเมตร ปลายแหลม เนื้อคล้ายหนังบาง เส้นใบ 23-44 คู่ เล็ก เส้นใบย่อยชัด ก้านใบยาว 3.5-6 เซนติเมตร ดอก สีขาว ออกเป็นช่อ กลีบยาว 15-20 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 1.5 มิลลิเมตร กลีบดอก 5 กลีบ กว้าง 3 มิลลิเมตร ยาว 9 มิลลิเมตร ด้านในมี 3 เส้นจากโคนขึ้นมา 1/4 ของกลีบ จากฐานดอกไม่ชัด เกสรเพศ ผู้สมบูรณ์ 1 อัน หัน 4 อัน ผล รูปไข่เบี้ยว ยาว 8-12 เซนติเมตร เนื้อสีเหลืองมีเส้นใย



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา ลิขิตสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้พุ่มสูง 0.5-1.5 เมตร พบน้อยสูงได้ถึง 11 เมตร กิ่งอ่อนแตกแขนงในข้อปล้องที่สาม ขนาดความกว้าง 2-4.5 มิลลิเมตร ใบ รูปไข่ถึงรูปไข่กลับ มีขนแบบกำมะหยี่บริเวณหลังใบและมีขนประปรายบริเวณเส้นกลางใบและเส้นใบย่อย ใบยาว 4-9.5 เซนติเมตร ยาว 2-3.8 เซนติเมตร ดอก ส่วนใหญ่แยกเพศพบน้อยดอกสมบูรณ์เพศ ช่อดอกออกบริเวณซอกใบ ยาว 6 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 0.1-2.5 เซนติเมตร แตกแขนงจากน้อยไปมาก ก้านช่อดอกย่อยยาว 0.6-2 มิลลิเมตร แต่ในดอกที่เป็นผล ยาว 2.5-4 มิลลิเมตร มีขนก้านดอกประปราย กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันฐานรองดอก ผิวของกลีบเลี้ยงด้านนอกมีขน กลีบดอกกว้าง 2-3.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มี 4 อัน ดอกเพศสมบูรณ์เพศ กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ดอกเพศผู้กว้าง 1.5-2 มิลลิเมตร ดอกเพศผู้เส้นใยน้อย ดอกสมบูรณ์เพศปลายป้านหรือแหลม วงเกสรเพศเมียเกลี้ยงไม่มีขน ช่อดังไขมี 5-8 มิลลิเมตร ผลเกลี้ยง เมล็ดขนาด 4-5 มิลลิเมตร พบบริเวณป่าเบญจพรรณที่ระดับ ความสูงจากน้ำทะเล 500-700 เมตร ในมณฑล ยูนนาน ลาว มาเลเซีย และประเทศไทย



อ้างอิง : http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=250084126

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



มะม่วงละว้า

Mangifera griffithii Hook. f.

ANACARDIACEAE

ชื่ออื่น : มะม่วงละว้า มะม่วงละโว้ มะม่วงราวา ราวอ

ไม้ต้น สูง 25-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูงถึงแผ่กว้าง ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาลเทา แตกเป็นสะเก็ด เปลือกชั้นในสีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง แผ่นใบเรียวยาว รูปขอบขนานแกมรูปรีถึงแกมรูปไข่กลับ กว้าง 3-9 เซนติเมตร ยาว 10-25 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม หรือหู่ โคนใบสอบเป็นรูปลิ้นบาง ครึ่งหู่ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบ 8-10 เซนติเมตร (-16) คู่ ก้านใบยาว 2-5 เซนติเมตร ดอกเล็กสีเหลืองอ่อนหรือสีครีม ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผล กลมรี กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร เมื่อแก่สุกสีเหลืองส้ม แต่ถ้าสุกมากจะมีสีคล้ำเกือบดำ ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผลแก่ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม พบขึ้นตามที่ลุ่มต่ำ ตามชายฝั่งแม่น้ำ และในป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย ในต่างประเทศพบที่มาเลเซีย และอินโดนีเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/Pattani_botany/พันธุ์ไม้ป่าพรุ/มะม่วงละว้า/มะม่วงละว้า.htm.

ภาพประกอบ : http://www.plantsofasia.com/index/mangifera_griffithii/0-1335



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



มะมุด

Mangifera foetida Lour.

ANACARDIACEAE



ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 36 เมตร เรือนยอดรูปขอบขนานแน่น ลำต้นสูงตรง เปลือก สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลแดง ขรุขระถึงแตกเป็นร่องตื้นและเป็นเกล็ด เปลือกในสีแดง มีกลิ่นฉุนสนแรง มีน้ำเลี้ยงสีขาว เหนียว ใบ ออกเวียนหรือเวียนรอบข้อแหลม รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่กลับแคบ กว้าง 6-14 เซนติเมตร ยาว 14-35 เซนติเมตร ปลายทุ้งถึงกลมหรือปลายเป็นแฉ่งตื้น โคนรูปลิ้มถึงค้อยๆสอบแคบ ใบแก่เนื้อหนาแข็ง สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน ไม่มีเส้นใยคล้ายเส้นผมเมื่อหัก เส้นใบ 14-28 คู่ มีเส้นแฉมระหว่างคู่เส้นใบ โค้งใกล้ ขอบขนานชัดเจนล่าง เส้นใบย่อยห่าง ก้านใบยาว 2.5-6 เซนติเมตร กลมด้านบน มีปีกที่ส่วนบน โคนบวม ดอกสีชมพูหรือแดง ไม่หอม ออกเป็นช่อประมิตแตกแขนง ยาว 10-40 เซนติเมตร (อาจกว้างถึง 18 เซนติเมตร ยาวถึง 48 เซนติเมตร ในต้นกล้า) ที่ปลายกิ่งหรือตามง่ามใบบนๆ ดอกค่อนข้างแน่น กิ่งใหญ่และก้านสีทองแดงถึงสีแดงเข้ม เกลี้ยง ก้านดอกยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง ยาว 3-5 มิลลิเมตร มี 5 พู สีแดงเข้ม เกลี้ยงหรือพบบ้าง ที่มีขนนุ่มด้านนอก กลีบดอก 5 กลีบ รูปใบหอกแคบ กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร ด้านในมี 3 เส้นสีเหลืองจากโคนขึ้นมาครึ่งกลีบ เมื่อแรกตั้งตรงแล้วโค้งลง โคนเชื่อมติดกับจานฐานดอกที่ลดลงเป็นก้านสั้นระหว่างกลีบดอกและเกสรเพศผู้ เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 1(2) อัน ยาว 6-10 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้เป็นหมัน (3)4 อัน ยาว 3-5 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูสีชมพู อับเรณูสีม่วงแดง รังไข่กลมขนาด 1-1.5 มิลลิเมตร สีเหลือง เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียติดเยื้องจากศูนย์กลางยาว 5-7 มิลลิเมตร ผล รูปไข่เบี้ยวหรือขอบขนาน กว้าง 7.5-10 เซนติเมตร ยาว 6-7 เซนติเมตร (ในพันธุ์ปลูกกว้าง 12 เซนติเมตร ยาวถึง 18 เซนติเมตร) ใบแบนหรือแบนเล็กน้อย เปลือกหนา สีเขียวอมเทา สุกสีเหลือง เนื้อสีเหลือง มีเส้นใยจำนวนมาก เปี้ยวหรือหวานเมื่อสุกงอม มีกลิ่นคล้ายชันสนแรง เมล็ดใหญ่ มีเส้นใยแข็ง พบในป่าดิบที่ต่ำพบปลูกทั่วไปโดยเฉพาะตามจังหวัดใกล้ชายแดนมาเลเซีย

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โจนอน ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาณุวัฒน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3012>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



มะมุ่น

Elaeocarpus stipularis Blume

ELAEOCARPACEAE

ชื่ออื่น : แดง ตอนลอด ตูชน ท่อนลอก เม่าเล็ก สมัด

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่แคบหรือรูปรี กว้าง 3-9 เซนติเมตร ยาว 7-25 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนมน ขอบจักเป็นฟัน มีหนามเล็ก สีนํ้าตาลเข้ม แผ่นใบมีขนตามเส้น ใบ หูใบรูปสามเหลี่ยมปลายแยกเป็น 2-3 แฉก ติดทน ดอก ออกเป็นช่อกระจุก ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ยาว 7-13 เซนติเมตร ดอกบานขนาด 1.2-1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีขาวครีม รูปใบหอก กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวครีม ปลายกลีบเป็นริ้ว มีขนด้านใน เกสรเพศผู้ 30-40 อัน รังไข่ป้อม มีขนสั้นคลุมแน่น ก้านเกสรเพศเมียสั้น มีขนยาว ผล เมล็ดเดี่ยว แข็ง รูปกลมหรือรี ขนาด 1.5-4 เซนติเมตร สีเขียวออกนํ้าเงิน มี 3 เมล็ด ก้านผลยาว 2-6 เซนติเมตร ขึ้นทั่วไปในป่าดิบ ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&Itemid=59&id=1912

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

