

Knema furfuracea (Hook.f. & Thomson) Warb. เลือดควายใบใหญ่ MYRISTICACEAE

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 25 เมตร เรือนยอดเปิด เปลือก สีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องละเอียด หรือหลุดเป็นแผ่น แต่ไม่หลุดล่อน ค่อนข้างเปราะ เปลือกในสีครีมถึงส้ม มีน้ำเลี้ยงแดงประปราย มีเส้นใยหรือเป็นชั้น ใบ กว้าง 5-20 เซนติเมตร ยาว 25-50 เซนติเมตร พบน้อยที่เล็กกว่า กว้างได้ถึง 3 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 10 เซนติเมตร รูปใบหอกแกมขอบขนาน ปลายแหลมหรือกึ่งหอก ค่อนข้างแคบไปยังโคนเป็นรูปหัวใจ ยอดอ่อนมีขนรูปดาวละเอียดสีน้ำตาลอมเหลือง แน่น ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง ไม่ช้ำจะเกลี้ยงทั้งสองด้าน มีตุ่มเล็กๆ ด้านล่าง ไม่มีจุดดำ เส้นกลางใบล่าง ฐานด้านบน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดละเอียดแต่ชัด ฐานเป็นร่องด้านบน ก้านใบยาว 0.5-2.5 เซนติเมตร มีขนเมื่ออ่อน กิ่งอ่อนค่อนข้างดำ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-10 มิลลิเมตร ไกล่ปลาย) มีขุยหุ้มสีน้ำตาลอมเหลืองแน่น ยาว 1-1.5 เมตร ถูออกง่าย แก่จะแตกและลอกเป็นแผ่นบางมีสีนํ้าจาง ดอกเพศผู้สีเหลืองถึงชมพูหรือแดงเข้มด้านใน ออกเป็นช่อสั้น ยาวได้ถึง 1.5 เซนติเมตร มี 3-30 ดอก ไม่มีก้านช่อดอก ก้านดอกยาว 3-15 มิลลิเมตร อดดอกขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร ทรงกลมหรือ รูปไข่กลับแบน บางที่เป็นรูปสามเหลี่ยม เมื่อตัดขวาง จักสามส่วนสี่ถึงสี่ส่วนห้า เป็น 3-4 แฉก ปลายโค้ง ด้านนอกมีขุยแน่นและขนสีน้ำตาลอ่อน ยาว 0.5-1 มิลลิเมตร จานเกสรเพศผู้ขนาด 2-2.5 มิลลิเมตร บนเส้นเกสรเพศผู้สั้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร กลมถึงรูปสามเหลี่ยม แกนกลางแบนหรือเว้าตื้น อับเรณู 10-14 อัน ดอกเพศเมียออกเป็นช่อได้ถึง 20 ดอก อดดอกขนาด 6-8 มิลลิเมตร ทรงรีหรือไข่กลับ แยกออกสองส่วนสาม รังไข่ขนาด 2.5-4 มิลลิเมตร มียอดเกสรเพศเมียคล้ายจานรองถ้วย จัก 10-18 พู ไม่มีก้านเกสรเพศเมีย ผล กว้าง 2-2.8 เซนติเมตร ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร ก้านผลสั้น ยาวน้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร มี 1-4 ผล อยู่ด้วยกันทรงกลมถึงรูปไข่กว้างหรือไข่กลับ สีเหลืองอ่อนถึงน้ำตาลอมส้ม มีขนสีสนิมยาว 1-2 มิลลิเมตร ผงหนา 3-5 มิลลิเมตร พบกระจายในป่าดิบเดิมหรือป่าถูกทำลาย สูงได้ถึง 900 เมตร มักขึ้นบนเขาหินปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา ยะลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โทมสัน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ธรินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
 ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)




เลื้อยต้นก

Horsfieldia glabra (Blume) Warb.

MYRISTICACEAE

ไม้ต้น สูง 6-25 เมตร มีเส้นใบ 2-3 แถว ใบบางคล้ายแผ่นหนัง (เปราะมากเมื่อแห้ง) ใบ รูปรี หรือรูปไข่กลับ ไปจนถึงรูปหอกขนาน ยาว 8-27 เซนติเมตร กว้าง 3-10.5 เซนติเมตร ฐานใบเรียวเข้าสู่ก้านใบเป็นครึ่งยาว (รูปสอบเรียว) ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกตามซอกใบหรือหลังใบ เป็นกลุ่มแน่นถึงกระจัดกระจาย ระยะห่างประมาณ 0.1 มิลลิเมตร ผล ทรงรีรูปไข่ ผิวเกลี้ยง ใน 1 ช่อผล มี 2-6 ผล ยาว 1.8-2.4 เซนติเมตร กว้าง 1.4-1.9 เซนติเมตร ฐานผลกลมกว้าง เมื่อผลแห้งจะมีสีน้ำตาลเข้ม พบในแถบภูมิภาคเอเชีย เกาะขาว เกาะบาทลี เกาะเมตตาไว ประเทศอินโดนีเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : แปลจาก Portal.cybertaxonomy.org/flora-malesiana

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



เลือดใบยาว

Knema lenta Warb.

MYRISTICACEAE

ไม้ต้นเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลอมเทาเข้ม ลอกเป็นแผ่น ใบ กว้าง 2-8 เซนติเมตร ยาว 8-24 เซนติเมตร พบน้อยกว้างได้ถึง 9 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 33 เซนติเมตร รูปใบหอกแกมขอบขนาน ยอดอ่อนมีขน รูปดาว ขนาด 0.2 มิลลิเมตร ใบแก่มีขนติดแน่นใกล้โคนและก้านใบ หรือเกลี้ยง เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบ 16-31 คู่ แบนหรือเป็นร่องด้านบน เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียดมาก เห็นชัดด้านบน กิ่งอ่อนมีขนเล็กๆ เป็นขุย แก่แล้วเกลี้ยง ดอกเพศผู้สีเหลืองอ่อนถึงแดงด้านใน ออกเป็นช่อธรรมดาหรือแตกเป็นง่าม ยาวได้ถึง 8 มิลลิเมตร มี (5)10-20 ดอก มีก้านช่อดอกยาวได้ถึง 5 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 5-10 มิลลิเมตร ดาดอกกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ทรงกลมปลายแบน จัก 4/5 ออกเป็น 3 พู มีขนแน่น สีน้ำตาลอมเหลืองด้านบน ก้านเกสรเพศผู้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 มิลลิเมตร บนเส้นเกสรเพศผู้เล็กเรียวยาว 0.5-1.3 มิลลิเมตร กลมหรือสามเหลี่ยมแบน มีอับเรณู 8-16 อัน ดอกเพศเมียคล้ายดอกเพศผู้ ยกเว้นก้านดอก ยาว 2-6(10) มิลลิเมตร ดาดอกกว้าง 2-3.5 มิลลิเมตร ยาว 4-6 มิลลิเมตร ทรงขอบขนานแกมรีกว้างหรือรูปไข่กลับ รังไข่มีขนยาวแน่น ยาว 0.5-1 มิลลิเมตร ผล กว้าง 1.2-1 เซนติเมตร ยาว 1.8-3.5 เซนติเมตร ก้านผลยาว 0.2-1.2 เซนติเมตร ทรงรีกว้าง โคนค่อนข้างแคบ มีขนรุงรังชัดสีออกเหลืองหรือออกแดง ยาว 1-2 มิลลิเมตร มักจะค่อยๆ เกลี้ยง ยกเว้นใกล้โคนผล พบน้อยในป่าดิบที่ถูกล่าลาย หรือป่าดิบ ป่าไผ่สูง 250-750 เมตร จังหวัดระนอง พังงา



ข้อมูลอ้างอิง: ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพลำต้น : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=1060



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



MYRISTICACEAE

ไม้ต้นไม่ผลัดใบหรือผลัดใบช่วงสั้น สูงถึง 30 เมตร บางที่มีพูพอนสั้น เปลือกสีครีมถึงเทาอ่อน หรือสีน้ำตาลอมเทา เรียบหรือแตกเล็กน้อยเป็นแผ่นหรือเป็นเกล็ด มีช่องอากาศเล็กทั่วไป เปลือกในสีชมพูถึงสีส้มหรือน้ำตาลอมแดง บางที่เป็นแผ่น มีน้ำยางเหนียวสีครีมแทรกอยู่ ใบ ยาว 18-60 เซนติเมตร ใบย่อย 3-5 คู่ รูปไข่ถึงรูปรีหรือขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 4-14 เซนติเมตร ปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลม โคนทุติงกลม หรือรูปหัวใจตื้น เบี้ยวเล็กน้อย ขอบจักตื้นหรือจักเห็นชัด (บางที่เป็นฟันตื้นๆ โกล้ปลายใบ แต่ไม่เรียบทั้งหมด) ใบแก่ คล้ายแผ่นหนัง ขนเกลี้ยงถึงขนแน่นด้านล่าง และมีเฉพาะบนเส้นกลางใบด้านบน พบน้อยที่เป็นนวล เส้นกลางใบบนด้านบน เส้นใบ 9-18 คู่ ใบโค้งโกล้ขอบใบ จมด้านบน เส้นร่างแห จางถึงชัดด้านบน ก้านใบย่อยยาว 4-8 มิลลิเมตร โคนบวมเล็กน้อย หูใบกว้างประมาณ 1.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร กลมหรือรูปไต มีขนติดที่ซอกใบ หรือโกล้โคนใบ เห็นชัดเมื่อเป็นยอดอ่อน บางที่ติดทน ดอก ขนาด 0.6-1.2 เซนติเมตร เป็นช่อแคบ ยาว 5-40 เซนติเมตร ที่ปลายกิ่ง บางที่มีดอกเล็กๆ ที่โกล้ซอกใบบน มีขนสีน้ำตาล แดงแน่นหรือค่อนข้างเกลี้ยง กลีบเลี้ยงยาว 4-9 มิลลิเมตร มีขนสีสนิมแน่นหรือขนสีอ่อน กระจาย ด้านนอก (ในกลีบดอกด้วย) ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแตกแขนง เกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านชูอับเรณูเกลี้ยงเชื่อมติดกัน โกล้โคน จานฐานดอกรูปถ้วย ไม่มีเกสรเพศเมียเป็นหมันหรือกลมถึงรูปแจกัน เรียวแหลมไปยังปลาย คล้ายเป็นก้านเกสรเพศเมีย ดอกเพศเมียออกเป็นช่อไม่แตกแขนง เกสรเพศผู้ 6 อัน ติดที่ขอบ เป็นคลื่นของจานฐานดอก รังไข่เกลี้ยง หรือมีขนยาว ผล ค่อนข้างใหญ่ กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร เป็นช่อยาว 5-25 เซนติเมตร มีถึง 6 ผล รูปรีหรือค่อนข้างรูปไข่กลับ ค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยมเมื่อตัดขวาง ขนกระจาย หรือเกลี้ยง กลีบเลี้ยงขนาด 0.8-1.5 เซนติเมตร เป็นรูปกรวยถึงแบน ขอบมักเป็นคลื่น ผงังผลชั้นในแข็งคล้ายหิน เป็น 3 มุมชัด เกลี้ยง ภายในมี 1-2 เมล็ด พบทั่วไปในภาคใต้ ในป่าดิบเดิมและป่ารุ่น มักขึ้นโกล้ชายฝั่งทะเล แต่พบลึกเข้ามาจากฝั่งด้วย พบในป่าพรุสูงไม่มากนัก แต่ในภูมิภาคมาเลเซีย พบที่ความสูง 1,600 เมตร (เป็นพืชวงศ์ Burseraceae ชนิดเดียวที่พบในระดับนี้) พบที่ จังหวัดระนอง สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โจนอน พินดา สิทธิสุนทร ก่อมนานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพมหานคร :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูงถึง 28 เมตร บางทีมีพูพอนเล็ก เปลือก สีครีมถึงเทาอ่อน เรียบหรือแตกเล็กน้อยเป็นแผ่น เปลือกในสีส้มถึงแดงอ่อน มีน้ำยางแทรกอยู่ ใบ ยาว 25-45 เซนติเมตร ใบย่อย 2-6 คู่ รูปไข่ถึงรีหรือรูปใบหอก กว้าง 2.5-9(12) เซนติเมตร ยาว 6-18(24) เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนทู่หรือกลมเบี้ยว ขอบจักห่างไปทางปลายใบ ใบแก่คล้ายแผ่นหนัง ด้านบนเป็นมัน เกือบหรือมีขนบนเส้นกลางใบด้านล่าง ใบแห้งสีน้ำตาลแดง เส้นใบ 10-16(20) คู่ มักจะโค้งใกล้ขอบใบ ฐานด้านล่างเส้นร่างแหจากทั้งสองด้าน ก้านใบย่อยยาว 0.5-1.2 เซนติเมตร (ก้านใบปลายสุดยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร) หูใบยาว 1-2.5 เซนติเมตร จักลึกเป็นแฉกไม่เท่ากันติดทนที่ก้านใบใกล้โคนเนื้อแห้งสีอมเทา ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน เป็นช่อแคบ ยาว 13-26 เซนติเมตร ออกตามง่ามใบบนหรือมีหลายช่อใกล้ปลายกิ่ง มีขนละเอียดสีเทาหรือสีสนิมแน่น ก้าน ดอกยาว 2-4 เซนติเมตร แข็ง สีเขียวอ่อนถึงม่วงอมแดง กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร มีขนละเอียดแน่น (แต่น้อยกว่าในกลีบดอก) ดอกเพศผู้ขนาด 5-6 มิลลิเมตร เป็นช่อแตกแขนงแน่น กลีบดอกรูปไข่กว้าง ค่อนข้างกางออก เกสรเพศผู้ 6 อัน เกือบเชื่อมติดกับจานฐานดอกนูนจัก 12 พู ล้อมรอบเกสรเพศเมียเป็นหมันยาวมากกว่า 0.5 มิลลิเมตร ดอกเพศเมียขนาด 6-8 พู เป็นช่อสั้น และดอกน้อยกว่า กลีบดอกมีปลายหนา โค้งขึ้นไม่กางออก เกสรเพศผู้ติดกับจานฐานดอกเกสรเพศเมีย ไม่มีขน ผลกว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ออกเป็นช่อยาวถึง 20 เซนติเมตร มีขน มี 2-10 ผล รูปรีหรือไข่กลับ ค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยม เมื่อตัดขวาง ไม่มีขน เมื่อแก่สีม่วงดำเป็นมัน กลีบเลี้ยง 1.3 เซนติเมตร รูปกรวยกว้าง ผนังผลชั้นในมี 3 มุม เกือบ ภายใต้มือ 1(3) เมล็ด พบทั่วไปในป่าดิบสูง สูง 700 เมตร มักพบตามเชิงหน้าผาเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไมออน, ฟินดา, ลิกิตสุนทร, ก้องกานดา, ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปท. 2559. 792 หน้า
ภาพประกอบ : ภาพขาวสุด : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?word=Canarium%20denticulatum%20Blume>
ภาพกลางและซ้าย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จันทบุรี



ศรีตรัง

Jacaranda obtusifolia Bonpl.

BIGNONIACEAE

ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง 4-10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปทรงไม่แน่นอน โปรง เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคี่ ก้านใบรวม ยาว 40-50 เซนติเมตร ใบย่อยจำนวนมาก เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปขอบขนานแกมรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด กว้าง 0.5-0.7 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน แผ่นใบทั้งสองด้านขนาดไม่เท่ากัน ดอก สีม่วง ออกดอกเป็นช่อแขนงขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง ช่อดอกรูปพริ้ว ยาว 5-9 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมาก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1.5-2.5 เซนติเมตร โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 2-4 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ คล้ายรูปประฆัง ดอกทยอยบานและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผล เป็นฝักแบน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 2 ซีก เมล็ดแบนขนาดเล็ก มีปีก เป็นไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ ตอนเหนือของอเมริกาใต้ เวเนซุเอลา



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.royalparkrajapruek.org/Plants/view?id=834>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 10 เมตร ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 4-8 คู่ รูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3-9 เซนติเมตร ยาว 7-30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบถึงมนกลม ใบอ่อนห้อยลง ออกสีแกมม่วง ดอกมีสีเหลืองสด ออกเป็นช่อ ขนาด 15-35 เซนติเมตร ใบประดับรูปไข่ ดอก ดอกย่อยจำนวนมาก ฐานรองดอกเชื่อมเป็นหลอด แฉก ยาว 1.2-2.6 เซนติเมตร กลีบรองดอก 4 กลีบ ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 4-6 อัน รังไข่มีขน ผล สีม่วงอมแดง เป็นฝักแบนรูปขอบขนาน กว้าง 3.5-8 เซนติเมตร ยาว 15-40 เซนติเมตร เมื่อแก่แล้วแตกด้านข้าง พบตามป่าดงดิบใกล้ริมน้ำทางภาคใต้ พม่า จนถึงอินโดนีเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : http://rpplant.royalparkrajapruek.org/Display/details_fr/5330

ภาพประกอบ : ภาพใบ/ดอก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยานวกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพฝัก : http://www.qdbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1526



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยานวกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



สกุลนี้

Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe COMBRETACEAE

ชื่ออื่น : ลัตคุณิ ขี้มอด ตาโหลน ตีนนก แอ้น แหนแดง ประคำขี้ควาย เปี้ยแคว

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 8-20 เมตร ผลัดใบ กิ่งก้านแผ่ ที่โคนต้นมักมีพูพอนขนาดเล็ก ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับกันแน่นใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กลับแคบๆ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 9-18 เซนติเมตร เนื้อใบค่อนข้างหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนมักเป็นเงามัน ก้านใบเรียว ยาว 1-4 เซนติเมตร มักมีต่อมหนึ่งคู่ อยู่บริเวณกึ่งกลางก้านใบ ดอกสีขาวแกมเหลือง ออกเป็นแกนช่อตามง่ามใบ ช่อดอกยาว 8-16 เซนติเมตร ดอก ย่อยไม่มีก้านดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มิลลิเมตร มีกลิ่นหอมเย็น กลีบดอกเชื่อมติดกัน เป็นรูปถ้วย ยาว 1-2 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นกลีบรูปสามเหลี่ยม ยาว 1 มิลลิเมตร ด้านนอกมีขน ด้านในมีเกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลเป็นรูปสามเหลี่ยม แก่ไม่แตก มีปีก 2 ปีก มีขนคลุมสีน้ำตาลอ่อน กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร พบทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงฟิลิปปินส์ และนิวกีนิ ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณในระดับต่ำ ที่ความสูงไม่เกิน 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ติดผลเดือนธันวาคม-เมษายน ทั้งใบช่วงสั้นๆ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.qsbj.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=943

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ส้มกบ

Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.

RUBIACEAE

ชื่ออื่น : อุโลก ลาตา ลู ส้มลู ส้มเหาะ ส้มเห็ด อุโลก ส้มเหาะ

ไม้ต้น สูงถึง 30 เมตร ผลัดใบ เปลือกต้นหนา สีเทาปนน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ด เปลือกด้านในสีแดง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับฉาก เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปไข่หรือรูปไข่ ปลายใบแหลม ฐานใบมน ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ผล แบบผลแห้ง รูปรี สีน้ำตาลแดง ที่ปลายเมล็ดมีปีกเป็นครีบบาง พบในป่าเต็งรังและเบญจพรรณ ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย



ข้อมูลอ้างอิง : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&id=373&view=showone&Itemid=59

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Hymenodictyon+orixense>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

