

สลัด

Mallotus peltatus Mull. Arg.

EUPHORBIACEAE



ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นกิ่งพุ่ม ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้นมีหลายลำ หรือแตกแขนงใกล้โคนต้น เปลือกสีเทาอ่อนถึงน้ำตาลเข้มเกลี้ยง เปลือกในสีขาวหรือครีม มีชั้นบางๆ สีแดงเข้ม ใบ กว้าง 2.50-10 เซนติเมตร ยาว 6-22 เซนติเมตร ออกสลับหรือตรงข้าม รูปไข่กลับถึงขอบขนาน หรือรูปไข่แคบ ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนกลมหรือเกือบรูปหัวใจก้นปิด ก้านใบติดลึกลงจากขอบถึง 14 มิลลิเมตร ขอบจักซี่ฟันตื้นปลายซี่มีต่อม กิ่งอ่อนสีเขียวอ่อนถึงม่วงแดงหรือสีออกน้ำตาล ขนกำมะหยี่ ใบแก่สีเขียวเข้ม เกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยด้านบน ด้านล่างมีเกล็ด มักมีกลุ่มขนที่ซอกเส้นใบ เส้นใบ 3-7 เส้นออกจากโคนใบ เส้นล่างมีตุ่มเล็กสีดำ 2-6 ด้านบน เส้นใบข้าง 5-8 คู่ แต่ละคู่ห่างไม่เท่ากัน ก้านใบยาว (0.5)2-11 เซนติเมตร มีขนประปราย หูใบรูปสามเหลี่ยม ขนาด 2-4 มิลลิเมตร ดอก เป็นช่อไม่แตกแขนงที่ปลายกิ่ง พบข้างตามซอกใบบนออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ ดอกเพศผู้ขนาด 3-5 มิลลิเมตร สีเขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อน กลิ่นหอม ออกเป็นช่อยาว 2-25 เซนติเมตร มีดอกถึง 9 ดอก อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม ก้านยาว 1-2 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 2-4 กลีบ รูปรีแกมรูปไข่ ยาว 1.5-3 มิลลิเมตร ปลายโค้งมีขน เกสรเพศผู้มี 17-35 อัน ยาว 1.2-3.5 มิลลิเมตร ดอกเพศเมียขนาด 3-4 มิลลิเมตร สีเขียวถึงเหลืองอ่อนหรือสีออกแดงเป็นช่อยาว 8-22 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 2-4.5 มิลลิเมตร (ในผล) กลีบเลี้ยงยาว 4-6 มิลลิเมตร รูปชวดคอกยาวมี 2 พู สั้น ไม่เท่ากัน เมื่ออ่อนแนบชิดรอบรังไข่ แล้วแยกออกจากกันรวดเร็วทั้งรอยแผลเป็น วงในผล รังไข่ 3-4 ช่อง สีเขียวอ่อนถึงแดงเข้ม มีหนามหนาแน่น ยอดเกสรเพศเมียยาว 6-9 มิลลิเมตร รวมก้าน เกสรเพศเมียสั้น ผล ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร สีเขียวถึงแดงเข้มหรือสีม่วงมีเกล็ดสีเหลือง เป็นพู 3-4 พู มีหนามหุ้ม เมล็ดขนาด 4-5 มิลลิเมตร สีน้ำตาลคล้ายหินอ่อน พบทั่วไปในภาคใต้ ทั้งป่าเดิมและป่ารุ่น สูงถึง 800 เมตร มักขึ้นริมน้ำหรือบนหิน

ข้อมูลอ้างอิง : โสมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่ม2 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2559. 792 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 15 เมตร เรือนยอดแคบและกิ่งก้านเล็กเรียว กิ่งต้น(ไม่มีดอกอาศัยอยู่) เปลือก สีเลือนจนเกือบเทาขุ่น แตกเป็นแผ่นตื้นแนวตั้ง ช่องอากาศเล็กจำนวนมาก เปลือกในสีส้มแก่ ก่อนข้างแห้ง ใบ กว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 10-18 เซนติเมตร รูปไข่แคบ ไม่จักเป็นพู ปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลมเล็กน้อย โคนหู่ กึ่งรูปหัวใจ หรือกึ่งกันปัด ก้านใบติดห่างขอบใบมากกว่า 1 มิลลิเมตร มักโค้งขึ้นที่ใกล้ๆ โคนใบ ขอบใบเรียบไม่เป็นคลื่น โคนใบเล็กน้อย ใบอ่อนสีครีมมีขนหยิกสีส้ม ใบแก่ด้านบนสีเขียวเข้มขุ่น เกือบมีนวลเล็กน้อยและเกลี้ยง ด้านล่างมีขนหยิกสีสนิมบนเส้นใบ มีต่อมเล็กหลายต่อมที่ใกล้โคน ก้านใบยาว 5-8 เซนติเมตร เล็กเรียว สีม่วงแดง เกลี้ยง หรือมีขนหยิกสีสนิม หูใบรูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 10 มิลลิเมตร โค้งกลับ มีขนละเอียดสีสนิม ร่วงเร็ว ดอกเพศผู้อยู่ใต้วงผล ใบช่อแข็งออกมาจากกิ่ง เป็นกลุ่มประมาณ 20 ดอก ออก เป็นช่อแคบไม่แตกแขนง ยาวได้ถึง 18 เซนติเมตร แกนกลางมีขนสีน้ำตาลอมส้มหนาแน่น ใบประดับย่อยยาวได้ถึง 8 มิลลิเมตร หักหักไม่เป็นระเบียบ มีต่อมอยู่ที่แต่ละปลายหัก ขนหยิกสีส้ม กลีบเลี้ยงมี 2 พู เกสรเพศผู้มี 2(3) อัน ดอกเพศเมียคล้ายกับดอกเพศผู้ แต่ดอกอยู่กลุ่มละ 3 ดอก ผลขนาด 4 มิลลิเมตร มีก้านยาว 2-3 มิลลิเมตร มี 2(3) พู แบนเล็กน้อย มีกลีบเลี้ยงติดที่โคน ยอดเกสรเพศเมียเล็กติดทน ไม่มีหนามหรือขน มีต่อมเป็นจุดสีเหลืองอ่อน ฐานดอกง่าย พบทั่วไปตามข้างและป่ารุ่น สูงได้ถึง 400 เมตร ขึ้นได้ในที่แล้งและดินเลว พบที่ จังหวัดตรัง นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไม้เมืองร้อน พืชสวนและไม้ประดับ เล่มที่ 1 หน้า 100 - ไม้เมืองร้อน เล่มที่ 1 หน้า 100 - ไม้เมืองร้อน เล่มที่ 1 หน้า 100 - ไม้เมืองร้อน เล่มที่ 1 หน้า 100



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



สะเดาเทียม

Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs

MELIACEAE

ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดใหญ่ สูงถึง 30-40 เมตร ลำต้นกลมใหญ่ เปลือกเรียบเมื่ออายุน้อย เมื่ออายุมากขึ้นเปลือกจะแตกล่อน เป็นแผ่น โคนต้นเป็นพูพอนเล็กน้อย เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่ง มีกิ่งก้านน้อย เนื้อไม้สีน้ำตาลแดง ใบ เป็นรูปช่อแบบขนนก ก้านใบยาว 20-60 เซนติเมตร ขึ้นรวมกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ตามกิ่งจะเห็นเป็นรอยแผลขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากการหลุดร่วงของก้านใบ โคนก้านใบมีร่องเล็กๆ ด้านละ 1 ร่อง ใบย่อยขึ้นเยื้องสลับกันเล็กน้อยจำนวน 7-11 คู่ ก้านใบย่อยสั้นประมาณ 2 มิลลิเมตร ใบย่อยรูปหอกแกมใบมน ฐานใบเบี้ยวไม่เท่ากัน ขอบใบเรียบ หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ยกเว้นขณะที่ยังเป็นกล้าไม้ ขอบใบจะหยัก เป็นฟันเลื่อย ใบหนา เกลี้ยงและมีสีเขียวเป็นมัน ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกสีขาวอมเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ก้านดอกยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีขนสั้นละเอียดปกคลุม กลีบรองกลีบดอกสันมีขนาดเล็กสีเขียว กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร ปลายแหลม โคนกลีบติดต่อกันมีขนสั้นละเอียดปกคลุม กลีบดอกมี 5 กลีบ ขนาดยาว 5.5 มิลลิเมตร กว้าง 1.5-2.2 มิลลิเมตร ออกดอกประมาณต้นเดือนมีนาคม ผล รูปไข่ เมื่อยังอ่อนมีสีเขียว ถ้ากรีดดูจะมียางสีขาวไหลออกมา ผลแก่สีเหลือง ขนาด 2.4-3.2 x 1.3-1.6 เซนติเมตร เมื่อแก่ไม่แตก เปลือกผลหนา มีเนื้อภายในนุ่ม รับประทานได้ 1 ผล มี 1 เมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดบางแต่แข็ง เนื้อในของเมล็ดมีกลิ่นแรง



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองงานค้า ขยายผล, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559 792 หน้า.
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



สะเดาป่า

Ailanthus integrifolia Lam.

SIMAROUBACEAE

ไม้ต้น สูงได้ถึง 60 เมตร ใบ เป็นใบย่อยเรียงเป็นแถวตาม
ก้านใบ แบบขนนกยาวประมาณ 30-200 เซนติเมตร มี 2-9
คู่ ใบเป็นแผ่นบางคล้ายหนัง ขอบเป็นใบมีด หรือเคียว ขนาด
10-40x4-15 เซนติเมตร มีต่อมนบนใบ ดอก ดอกตัวผู้
และตัวเมียแตกต่างกันชัดเจน มีก้านยาวจนถึงปลาย ยาว
ได้ถึง 40 เซนติเมตร ออกตามซอกใบ ผล ผลแก่ไม่แตกมี
ก้านยื่นออกมา ผล มีเส้นคล้ายตาข่ายคลุม มีร็วรอย ขนาด
ประมาณ 11-22x2.5-5 เซนติเมตร ผลเรียว เล็กกลึงที่ละน้อย
พบได้ในป่าสมบูรณ์และในป่าที่เคยถูกทำลาย จนถึงระดับ
ความสูง 900 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : <https://lorafloraunweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=6813>

ภาพตอน : http://keys.trin.org.au/key-server/data/0e0f0504-0103-430d-8004-060d07080d04/media/Html/taxon/Ailanthus_integrifolia_subsp._integrifolia.htm

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ มีลำต้นสูงได้มากถึง 30 เมตร โคนต้นเป็นพูพอน รูปทรงลำต้นเปลาตรง เปลือก ลำต้นมีสีน้ำตาล ผิวเปลือกแตกสะเก็ดขนาดเล็กหรือเป็นร่องตื้นๆขนาดเล็ก ลำต้นแตกกิ่งค่อนข้างน้อย จึงแลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง กิ่งแตกมากบริเวณเรือนยอด ใบ สะตอเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น คือ มีก้านใบหลักยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ที่ประกอบด้วยก้านใบย่อย 14-24 คู่ แต่ละก้านใบย่อยยาวประมาณ 2.2-6 เซนติเมตร มีใบย่อยเรียงตรงข้ามกัน 30-38 คู่ ใบย่อยมีลักษณะเป็นขอบขนาน สีเขียวสดถึงเขียวเข้ม ตามอายุ ใบ แผ่นใบเรียบ ปลายใบมน มีติ่งเล็กตรงกลางของปลายใบ ดอกสะตอออกดอกเป็นช่อ ยาว 30-50 เซนติเมตร ขนาดช่อ 0.5-1 เซนติเมตร ส่วนดอกจะยาว 5-7 เซนติเมตร ขนาดดอก 2-4 เซนติเมตร ดอกประกอบด้วยกลีบดอกที่มีลักษณะเป็นหลอดเรียงติดกันในแนวตั้ง โคนดอกเป็นเกสรเพศผู้ ส่วนถัดมาเป็นเกสรชนิดสมบูรณ์เพศ ดอกจะเริ่มออกประมาณเดือนเมษายน และอีกประมาณ 70 วัน ก็สามารถเก็บฝักได้ และจะให้ฝักต่อเนื่องจนถึงอายุ 15-20 ปี ผล สะตอมักเรียกว่า ฝัก ที่มีลักษณะแบน มีทั้งชนิดที่เป็น ฝักบิดเป็นเกลียว และชนิดที่แบนตรง ฝักยาวประมาณ 25-45 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร เปลือกฝักอ่อน มีสีเขียว และค่อยเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อแก่ ตรงกลางฝักเป็นที่อยู่ของเมล็ดที่เรียงซ้อนกันเป็นตมูนูน เมล็ดมีลักษณะคล้ายหัวแม่มือ หรือรูปรีค่อนข้างกลม ขนาดเมล็ดทั่วไป กว้างประมาณ 2.2-2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร เมล็ดอ่อนมีสีเขียว ให้รสหวานมัน และมีกลิ่นฉุน และเมื่อแก่จะเริ่มเหลืองและดำในที่สุด



ข้อมูลอ้างอิง : <https://puechkaset.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD/>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



สะตือใบขน

Crudia scortechinii Prain

FABACEAE

ไม้ต้น สูง 24-27(36) เมตร กิ่งเมื่ออ่อนมีขนสั้นนุ่ม สีนํ้าตาลอมเหลืองหม่น มีพูพอน สูงได้ถึง 1.8 เมตร ใบ ประกอบด้วยใบย่อย 9-13 ใบ ก้านใบ ยาว 17-24 เซนติเมตร หูใบยาว 2.5 มิลลิเมตร อยู่ระหว่างก้านใบ ดอก ออกเป็นช่อ ตามซอกใบ ยาว 7.5-15 เซนติเมตร ก้านช่อดอกเป็นเหลี่ยม มีขนนุ่มปกคลุม ใบประดับและ ใบประดับย่อยเล็กมาก ใบประดับย่อยพบบ่อยที่กึ่งกลางของก้านดอก ก้านดอกยาว 6-15 มิลลิเมตร มีขนประปราย เกสรเพศผู้ 10 อัน พบน้อยมี 9 อัน สั้นและยาวสลับกัน ผลส่วนมากมี 1 เมล็ด



ข้อมูลอ้างอิง : <http://portal.cybertaxonomy.org/flora-malesiana/node/9486>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



สักขี้ไก่

Premna tomentosa Willd.

LAMIACEAE

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูง 5-18 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอ่อน ลอกออกเป็นแผ่นใหญ่ ใบ กว้าง 5-15 เซนติเมตร ยาว 10-25 เซนติเมตร มักขนาดเล็กกว่าถ้าอยู่ใต้ดอก รูปไข่ถึงไข่กลับ ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนแหลมถึงกลมรูปหัวใจ ขอบเรียบหรือจักตื้นห่างๆ กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลรูปดาวแน่น ใบแก่เรียบ สีสเขียวช่นด้านบน ด้านล่างสีครีม หรือออกน้ำตาลอ่อนๆ มีขนแตกแขนงหรือขนรูปดาวแน่น มีต่อมเล็กสีออกขาวทั้งสองด้าน เส้นใบ 1 หรือ 3 เส้น ออกจากโคนใบ เส้นใบข้าง 4-8 คู่ ก้านใบยาว 2.5-6 เซนติเมตร มีขน กิ่งมีขนแน่นเมื่อยังอ่อน ไม่มีใบประดับที่โคนของส่วนต่างๆ ที่แตกใหม่ มักมีสันสามเหลี่ยมระหว่างโคนของก้านใบที่ออกตรงข้ามกัน ดอก สีขาวออกเขียวถึงเหลืองอ่อน กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อพริ้วแตกแขนง (ช่อกระจุกแตกแขนง) ยาว 10-28 เซนติเมตร มีขนแน่น เหมือนใบใบ กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร เป็น 2 ปากไม้ขีด มีซี่ฟัน (4)5 ซี่ เท่ากันยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีขน สีน้ำตาลอมส้มแน่น ขยายขึ้นเล็กน้อยในผล กลีบดอกเป็นกลีบ 2 ปาก มี (4)5 พู เท่ากันยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร พูกลางของปากล่างแหลม พูอื่นๆ กลม หลอดกลีบยาว 2-4 มิลลิเมตร มีขนยาวที่คอหลอด ที่อื่นเกลี้ยง เกสรเพศผู้ยาว 1.5-3 มิลลิเมตร ค่อนข้างเท่ากัน ยื่นพ้นหลอดกลีบดอกเล็กน้อยเมื่อแก่ รังไข่เกลี้ยงหรือมีขนใกล้ยอด ไม่มีต่อม ก้านเกสรเพศเมียยาว 4-5 มิลลิเมตร ผลยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร กลม มีขนที่ปลายเมื่อยังอ่อน แล้วค่อยๆ เกลี้ยง สีดำอมม่วงเมื่อแก่ เมล็ด 4 เมล็ด พบทั่วไปในภาคใต้ ในป่าผลัดใบและป่าร่วนในที่ต่ำ มักขึ้นบนเขาหินปูนหรือที่โล่งตามลำธาร



อ้างอิง: ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร, กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 2 - พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์ฉบับใหม่, 2559, 92 หน้า: ภาพประกอบ
ภาพประกอบ: <http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Premna+tomentosa>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



สักเขา(พันจำ)

Vatica harmandiana Pierre
DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น : ขี้มอด ชัน ซี ชิดง ต่าง ตำเสา เติงตง พันจำ ยางหนู รือเสาะ สัก สักเขา

ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเทา กิ่งมีขนรูปดาวสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงหรือเกือบเกลี้ยง ทุใบรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ยาว 5.5-12 เซนติเมตร มีเส้นแขนงใบแฉก ก้านใบยาว 0.7-2 เซนติเมตร ช่อดอกยาว 2-8 เซนติเมตร ช่อแขนงย่อยมี 2-5 ดอก ตาดอกรูปใบหอก ยาว 0.7-1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม กลีบรูปใบหอกกลับ ปลายมน ยาว 0.9-1.2 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร เกสรตัวเมียเป็นดิ่ง ยาวเท่า ๆ อับเรณู รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ รังไข่ ผล เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร ปลายเป็นดิ่งแหลม ก้านยาว 2-3 มิลลิเมตร ปีกยาว 2 ปีก ส่วนมากยาว 4-6 เซนติเมตร ปีกสั้น 3 ปีก ยาว 0.7-2 เซนติเมตร พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู และบอร์เนียว ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 600 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=0&words=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3&typeword=word>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)




สักคลอง

Vatica umbonata Burck
DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมือง : สักควน

ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงถึง 22 เมตร เรือนยอดเปิดไม่เป็นระเบียบ เปลือกสีเทาอ่อนถึงสีน้ำตาลเรียบหรือแตกเล็กน้อย เปลือกในสีครีมถึงสีเหลืองอ่อน ด้านนอกด้านในสีน้ำตาลอมเหลือง มีเส้นสีน้ำตาลเข้มตามยาว มีเส้นใยใบรูปไข่กลับแกมรียาว 12-25 เซนติเมตร เนื้อหนาคล้ายหนังเส้นใบ 8-12 คู่ เส้นกลางใบขนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1.7-3 เซนติเมตร ผลรูปไข่ กว้างถึง 2.5 เซนติเมตร ยาวถึง 4 เซนติเมตร ก้านผลยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เซนติเมตร พูกลิบลึงงุ้ม 1/2-3/4 ของผล



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร ก่องกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



สักใบยาว

Vatica rassak Blume
DIPTEROCARPACEAE

ไม้ต้น ขนาดกลาง สูงได้ถึง 34 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นประมาณ 69 เมตร ลำต้นมียาง หูใบ ยาว 14 มิลลิเมตร ใบ เดี่ยว เรียงตัวแบบสลับ ใบเรียบ เส้นใบแบบขนนก ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 24 มิลลิเมตร สีขาว เหลือง แดง ดอกออกเป็นช่อ ผล ยาว 41 มิลลิเมตร สีสน้ำตาลแกมเขียว ผลไม่มีปีก พบในป่าสมบูรณ์ และ ป่าเบญจพรรณ จนถึงความสูง 400 เมตร บางครั้งพบตามที่ลาดเชิงเขาและสันเขาแต่บางครั้งพบบนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : www.asianplant.net

ภาพประกอบ : <https://www.monaconatureencyclopedia.com/vatica-rassak-2/?lang=en>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

