



กะทังใบแข็ง

Litsea robusta Blume

LAURACEAE

ไม้พุ่ม เล็ก สูงได้ถึง 23 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ใบเดี่ยว ไม่มีหูใบ เรียงตัวแบบสลับ แผ่นใบเรียบและเกลี้ยง ดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร สีเหลือง ออกเป็นช่อกระจุก ผล เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร สีแดงผลเดี่ยว เมล็ดแข็งและมีฐานหุ้มผล พบในพื้นที่ป่าผสมที่ยังไม่ถูกรบกวน ในความสูงระดับกลาง ไปจนถึง 1,700 เมตรตามพื้นที่ลุ่มและตามริมน้ำ



ข้อมูลอ้างอิง : WWW.asianplant.net

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



กะทังใบใหญ่

Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hook.f.

LAURACEAE

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มรูปเจดีย์ เปลือกสีน้ำตาลอมเทา มีตุ่มขรุขระ กิ่งอ่อนมีขนนุ่มสีน้ำตาลอมเหลืองหนาแน่น ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรีรูปไข่หรือรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 14-26 เซนติเมตร ปลายมนหรือมีติ่งสั้นๆ โคนมน ขอบเรียบ แผ่นใบหนาแข็ง ด้านบนสีเขียวเข้ม มีขนประปรายตามเส้นกลางใบ ด้านล่างสีจางกว่า มีขนนุ่มสีน้ำตาลอมเหลืองทั่วไป เส้นแขนงใบข้างละ 8-14 เส้น ระหว่างเส้นแขนงใบมีเส้นชั้นบันไดถี่ เห็นได้ชัดทางด้านล่าง ก้านใบยาว 1.6-3.4 เซนติเมตร มีขนนุ่มประปราย ช่อดอกแบบช่อซี่ร่มสั้นๆ ออกตามกิ่งด้านข้างและตามง่ามใบ แกนช่อดอกยาว 0.5-1 เซนติเมตร แต่ละช่อมีดอกจำนวนมาก ดอกแยกเพศ สีเหลืองอ่อน เมื่อบานกว้าง 7-9 มิลลิเมตร ก้านดอกเรียวยาว 0.8-1.7 เซนติเมตร กลีบรวมโคนติดกัน คล้ายรูปถ้วย ปลายแยกเป็นกลีบๆ ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้จำนวนมาก เป็นกระจุก อับเรณูเป็นช่องมีฝาเปิด ผลออกเป็นกลุ่มบนช่อสั้นๆ 3-8 ผล รูปไข่หรือรูปรีปลายมน ยาว 0.8-1.4 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-1 เซนติเมตร ติดอยู่บนฐานรูปถ้วยซึ่งเจริญมาจากกลีบรวม ผลสีเขียวเมื่อแก่สีดำ มีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด ขึ้นตามป่าดิบที่ค่อนข้างโปร่ง ป่าเบญจพรรณ และป่ารุ่นที่ชุ่มชื้นบนพื้นที่ราบและตามภูเขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/lauracea/lgrand_2.htm
ภาพประกอบ : <http://www.natureloveyou.sg/Litsea%20grandis/Main.html>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



กะทังป่า

Litsea costata Boerl.

LAURACEAE

ไม้ต้น สูง 20-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูงถึงค่อนข้างกลม ลำต้นกลมเปลาตรง เปลือกเรียบ สีน้ำตาลเทาคล้ำ ถึงน้ำตาลแกมแดง มีรอยบุ๋มตามขวางห่าง ๆ และมีร่องหายใจเป็นตุ่มขนาดเล็ก กระจัดกระจายทั่วไป เปลือกชั้นในสีน้ำตาลอ่อนถึงเหลืองนวล ใบอ่อน กิ่งอ่อน และช่อดอก มีขนอ่อนนุ่มสั้น ๆ สีน้ำตาลอ่อน แผ่นใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร หลังใบเขียวเข้มเป็นมัน ท้องใบสีเขียวนวล เกือบหรือมีขนเล็กน้อยตามเส้นใบ ปลายใบมนเป็นติ่งแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบสอบ เส้นแขนงใบ 8-11 คู่ เป็นร่องลึกทางด้านหลังใบ ก้านใบยาว 2-3 เซนติเมตร ดอก เล็ก สีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ผล รูปไข่ปลายแหลม กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร แก่สุก สีแดงหรือสีแดงอมม่วง ออกดอกระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม ผลแก่ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ พบขึ้นในป่าที่ลุ่มต่ำ และชายป่าพรุ บริเวณน้ำท่วมขังเป็นครั้งคราว ทางภาคใต้ของประเทศไทย ในต่างประเทศพบที่พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



กะปะ (คั่นແหลນ)

Psydrax nitida (Craib) K.M.Wong

RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : หมากพริก ลิเกาไม้

ไม้ต้นเล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร ลำต้นมักเรียวตรง กิ่งใหญ่ออกเป็นคู่ตามแนวราบออกมาทุกมุมคล้ายซี่ร่ม ไม่มีหนาม ใบ ออกเป็นคู่ตรงกันข้าม แผ่นแบนยาวบนกึ่ง เป็นระยะห่างกัน เนื้อใบคล้ายหนังเป็นมันด้านบน เกือบทั้งสองด้าน ดอก สีเขียวอ่อนหรือขาวออกเหลือง สมบูรณ์เพศ ก้านชูอับเรณูเล็กเรียวอย่างนอยยาวเท่าอับเรณู โค้งกลับเมื่อดอกแก่ ก้านเกสรเพศเมียยาวเรียวโผล่พ้นหลอดดอก หรือก้านชูอับเรณูยาวโผล่พ้นดอก ยอดเกสรตัวเมียรูปทรงกระบอก โคนกลวง ผลทรงกลมรีหรือไข่กลับ เนื้อบาง ผืนแข็งหุ้มเมล็ด



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมยอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : https://www.tistr.or.th/sakaerat/flora_fauna/TREE/PDF/%E0%B8%81%E0%B8%80%E0%B8%9B%E0%B8%80.pdf



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



กะพวมกะพร้าว

Strobocalyx arborea (Buch.-Ham.) Sch. Bip.

ASTERACEAE

ชื่อพื้นเมือง : ช้อน จวง อ้ายเหนียวหมา ตอนเลาะ นวลแบ่ง สมองกุ่ม



ไม้ต้น

สูง 10-15 เมตร มีขนสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ก้านช่อดอกและวงใบประดับ ใบเรียงเวียน รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 10-25 เซนติเมตร ปลายแหลมยาว ก้านใบยาว 1-3.5 เซนติเมตร ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่นแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ก้านช่อกระจุกสั้น ติดบนวงใบประดับที่เรียงซ้อนเหลื่อมกันประมาณ 5 วง ยาว 2-3 มิลลิเมตร แต่ละช่อมี 3-5 ดอก ไม่มีใบประดับย่อย ดอกสีชมพูอมม่วง หลอดกลีบดอกยาว 5-7 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดภายในหลอดกลีบดอก รังไข่ใต้วงกลีบ มีช่องเดียว ก้านเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก เรียวยาวม้วนงอ ผลแห้งเมล็ดล่อน รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร มี 8-10 สัน มีขนยาว แปรปัสเป็นขนแข็ง ติดทน เรียง 2 วง วงในยาว 5-7 มิลลิเมตร วงนอกสั้น พบที่อินเดีย เนปาล ศรีลังกา จีนตอนใต้ พม่า เวียดนาม คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทย ขึ้นตามป่าดิบชื้นหรือริมลำธาร ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Strobocalyx0arborea0\(Buch.-Ham.\)0Sch.0Bip.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Strobocalyx0arborea0(Buch.-Ham.)0Sch.0Bip.)

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Strobocalyx0arborea0\(Buch.-Ham.\)0Sch.0Bip.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Strobocalyx0arborea0(Buch.-Ham.)0Sch.0Bip.)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





Sageraea elliptica (A. DC.) Hook. f. & Thomson

ANNONACEAE

กะโมกเขาเป็นไม้ต้น สูง 15–20 เมตร เรือนยอดรูปกรวยคว่ำ เปลือกต้นสีเทาอ่อน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ สองข้างของกิ่งในระนาบเดียวกัน แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 5–10 เซนติเมตร ยาว 20–30 เซนติเมตร ปลายใบมนถึงเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นแขนงใบ 14–16 คู่ ก้านใบยาว 0.5 เซนติเมตร ดอกเล็ก สีเหลืองอมเขียว ออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 2–6 ดอก ตามกิ่งหรือลำต้น ก้านดอกยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร กลีบดอก 6 กลีบ เรียงสลับกันเป็น 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ รูปไข่ งามคล้ายช้อน กว้างประมาณ 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบชั้นในเล็กกว่าชั้นนอกเล็กน้อย ผล ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 6–7 ผล แต่ละผลรูปกลมรี ยาว 2.5–3 เซนติเมตร มี 4 เมล็ด ก้านผลสั้นกระจายพันธุ์ในป่าดิบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความสูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง 50–600 เมตร ออกดอกเดือน มกราคม-พฤษภาคม



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/pattani_botany

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Sageraea+elliptica>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)




กะหนานปลิง

Pterospermum acerifolium (L.) Willd.

MALVACEAE

ชื่อพื้นเมือง : หูควาย,ตองเต้า,ปอเต้า,เต้าแมว,ปอหูช้าง,สนานดง,สากกะเท้า,สลักกะพาด

ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 18-25 เมตร เปลือกสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างเรียบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปทรงไม่แน่นอน ส่วนใหญ่รูปไข่หรือรูปรี ค่อนข้างกว้างจนเกือบเป็นแผ่นกลม ปลายแหลมโคนเว้า ลึก คล้ายรูปหัวใจ ดอกเดี่ยว ออกตามง่ามใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวอมเหลือง เกสรเพศผู้ สมบูรณ์ 15 อัน แยกออกเป็น 5 มัด มัดละ 3 อัน เกสรเพศผู้ไม่สมบูรณ์ 5 อัน เรียงสลับกับมัดเกสรเพศผู้ที่ สมบูรณ์ รังไข่สั้น รูปทรงกระบอกห้าเหลี่ยม ผลรูปทรงกระบอกห้าเหลี่ยม กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 14-20 เซนติเมตร ปลายแหลมมน โคนผลคอดเรียวเป็นก้านทรงกระบอกแคบๆ ผลแก่แตกออกเป็น 5 เสี่ยง เมล็ดมี จำนวนมาก รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนเป็นปีกบางยาว สีขาว กระจายพันธุ์ในอินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ใน ประเทศไทยพบที่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กระบี่ และนราธิวาส พบตามป่าดิบระดับ ความสูง 50-400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ติดผลช่วงเดือนมีนาคม- มิถุนายน




ข้อมูลอ้างอิง : http://www.qsbj.org/Database/Botanic_Book%20Full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2428

ภาพประกอบ : <https://medthai.com/กะหนานปลิง/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้น ไม้ผลัดใบหรือกึ่งผลัดใบ สูงได้ถึง 30 เมตร ลำต้นใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางวัดได้ถึง 200 เซนติเมตร พุ่มพองใหญ่สูงได้ถึง 3 เมตร ทุกส่วนมียางขาวข้นเหนียว เปลือก สีครีมถึงน้ำตาลเทา เรียบหรือแตกเป็นเกล็ดเล็กน้อย เปลือกในสีเหลืองถึงส้มอ่อนหรือออกน้ำตาล ใบ กว้าง 10-35 เซนติเมตร ยาว 15-60 เซนติเมตร ในต้นอ่อนอาจกว้างได้ถึง 45 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 90 เซนติเมตร ออกเรียงเวียน รูปไข่หรือรูปรีกว้าง ปลายทู่หรือแหลมสั้น โคนรูปกลมหรือกลม จักเป็นพูลึกในต้นอ่อน ขอบใบไม่จักในต้นแก่ (บางทีอาจจักเป็นพูในกิ่งล่างๆ แม้ว่าจะเป็นต้นใหญ่แล้ว) ขอบใบเรียบ มักเป็นคลื่นชัด ส่วนยอดมีขนหยาบสีทองแน่น ใบแก่คล้ายหนังแข็งค่อนข้างหยาบทั้งสองด้าน เพราะมีขนแข็ง โดยเฉพาะบนเส้นใบ เส้นใบ 10-16 คู่ ค่อนข้างตรง เห็นชัดด้านล่างโค้งและไปเชื่อมกันใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อย คล้ายชั้นบันได ฐานด้านบน ก้านใบยาว 4-10 เซนติเมตร อ้วนล่ำ มีร่องด้านบน มีขนสีน้ำตาลทอง ไม่เป็นสะเก็ด หูใบยาว 6-20 เซนติเมตร มีขนเส้นไหมสีน้ำตาล กิ่งแข็งล่ำ มีตาเป็นก้อนใหญ่ขนาด 10-17 เซนติเมตร ปกคลุมด้วยขนหยาบสีทองแน่นเมื่ออ่อน ช่อดอกกลม ออกเดี่ยวที่ซอกใบ ช่อดอกเพศผู้กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร บนก้านยาว 4-7.5 เซนติเมตร ทรงกระบอกหรือค่อนข้างโค้ง (เหมือนแท่งซิกการ์หรือกล้วยหอม) มักเป็นร่องหรือเป็นสันสีเหลืองหรือออกน้ำตาล ช่อดอกเพศเมีย กว้าง 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ทรงรีหรือถึงเบียร์ ก้านลำยาว 6-10 เซนติเมตร มีหนามโค้งนุ่มและหนามรูปกรวยปะปนกันอยู่ ผล กว้าง 6-10 เซนติเมตร ยาว 10-17 เซนติเมตร ทรงรีหรือทรงกระบอก บนก้านลำยาว 7-12 เซนติเมตร มีหนามนุ่ม 2 แบบปกคลุมแน่น (กว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร ยาว 12-55 มิลลิเมตร) สุกสีน้ำตาลอมเหลือง กลิ่นหอม เมล็ดขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร มีเนื้อสีขาว พบมากในป่าที่ต่ำที่ถูกแผ้วถางและตามสองข้างทาง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ฅวนวิทย์วิทย์รังสรรค์และคณะ, 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/Special-Pages/plant-detail.aspx?id=2732>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



กันเกรา

Fagraea fragrans Roxb.

GENTIANACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กันเกรา ตะมะชู ตำมูชู ตาเตรา ต่าเสา ทำเสา มั่นปลา

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 เมตร เปลือกแตกเป็นร่อง หูใบยาว 1-2 มิลลิเมตร ใบเรียงตรงข้าม รูปรีรูปขอบขนานแกมรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ยาว 7-11 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือยาวคล้ายหาง เส้นแขนงใบข้างละ 5-9 เส้น ข้อดอกแบบข้อกระดูก ยาว 4-12 เซนติเมตร ก้านช่อยาว 2-6.5 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 3-6 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 2-3 มิลลิเมตร ปลายกลีบกลม ดอกรูปแตร สีครีมเปลี่ยนเป็นสีเข้มก่อนร่วง หลอดกลีบ ดอกยาว 0.7-1.2 เซนติเมตร กลีบรูปขอบขนาน ยาว 5-8 มิลลิเมตร พังออกกลับ เกสรเพศผู้ 5 อัน ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ก้านชูอับเรณูแผ่กว้าง ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 6 เซนติเมตร ยอดเกสรเพศเมียรูปโล่หรือจัก 2 พู ผลสดมีหลายเมล็ด เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 มิลลิเมตร สุกสีเหลืองหรืออมแดง ปลายมีติ่งแหลม เมล็ดขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร เป็นเหลี่ยม พบที่อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย นิวกินี ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายฝั่งทะเล ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น



ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Fagraea0fragrans0Roxb.>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไฉ้แกรกใบขน

Pellacalyx parkinsonii C.E.C.Fisch.

RHIZOPHORACEAE

ไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 18 เมตร เปลือก สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องหยาบ ใบ กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 12-18 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมรีถึงกึ่งไข่กลับ ปลายเรียวแหลมสั้น โคนรูปกลม ขอบเรียบ ยอดอ่อนมีขนอ่อนสั้น ใบแก่ เนื้อบาง มีขนสีขาวโดยเฉพาะด้านล่าง เส้นกลางใบจมด้านบน เส้นใบประมาณ 8 คู่ ฐานด้านล่าง ก้านใบยาว 0.8-1 เซนติเมตร ขนละเอียด หูใบขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร แบนไม่ซ้อนกัน กิ่งอ่อนกลวง มีขนเล็กบาง ดอก ขนาดน้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกธรรมดาหรือแตกแขนงสั้น มี 2-8 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร เล็กเรียว มีขนละเอียด กลีบเลี้ยงยาว 8-12 มิลลิเมตร รูปขอบขนาน จักประมาณหนึ่งในสี่ของกลีบ เป็นพู สามเหลี่ยมตรง 5(6) พู ยาว 2-3 มิลลิเมตร สีเขียวอมเหลือง มีขนสั้นด้านนอก ด้านในมีขนคล้ายขนแกะในครึ่งล่าง กลีบดอก 5(6) กลีบ ยาว 2-3 มิลลิเมตร ติดที่ขอบหลอดกลีบเลี้ยง สีขาว รูปไข่กลับ ขอบรุ่มมีรยางค์คล้ายเส้นด้าย ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ในครึ่งบน เนื้อบาง กางหรือโค้ง กลีบร่วงเร็ว เกสรเพศผู้มี 8 อัน ติดที่ขอบของหลอดกลีบเลี้ยง สั้นและยาวสลับกันรองรับไขไต้หวันกลีบ 10 ช่อ เชื่อมกับหลอดกลีบเลี้ยงที่โคน มีสันเล็กน้อย ก้านเกสรเพศเมีย ยาว 6-8 มิลลิเมตร ยื่นพ้นหลอดกลีบเลี้ยงเล็กน้อย มีขนละเอียดเฉพาะด้านล่างสองในสาม ยอดเกสรเพศเมีย คล้ายจานแยกเป็นพูเล็ก ผล ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ออกได้ผลใบ ทรงลูกแพร์หรือมะเดื่อ พูกลิบล้าง ติดทนที่ปลายสีเหลืองออกเขียว เกลี้ยง ภายในมีเนื้อเมล็ดน้อยถึงหลายเมล็ด สีดำ ขนาด 1-1.5 มิลลิเมตร พบตามชายป่าดิบที่ต่ำ ใกล้น้ำ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โจนอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <http://www.npic-surat.com/web/index.php/2013-07-23-06-43-31/m-o-p-r/lauraceae-/132-lauraceae?showall=1>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

