

# หนามเล็บแมวใหญ่

*Canthium horridum* Craib

RUBIACEAE

ไม้พุ่มเลื้อยพันสูง 2-3 เมตร มีหนามแข็งโค้ง ยาวได้ถึง 1 เซนติเมตร ใบ กว้าง 1.2-2.5 เซนติเมตร ยาว 2-4 เซนติเมตร รูปรีแกมรูปไข่ ปลายทู่หรือเรียวแหลมสันโคนทู่ เนื้อคล้ายหนังบาง ด้านบนเขียวช่น มีขนตามขอบและตามเส้นใบหลักโดยเฉพาะด้านล่าง หรืออาจเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 3-4 คู่ ดอก ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุก มี 2-4 ดอก ตามง่ามใบ ก้านดอกยาว 2-3 มิลลิเมตร หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ปลายเป็นพู 4 พู ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ผล รูปไข่หรือค่อนข้างเป็น 2 พู กว้าง 1-2.2 เซนติเมตร ยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร สุกสีเหลืองถึงแดง มีเมล็ด 1-2 เมล็ด พบกระจายกว้างในป่ารุ่นและชายป่า



ข้อมูลอ้างอิง: การ์ดเนอร์, โจนอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า.  
ภาพประกอบ: <http://www.naturelovesyou.sg/Canthium%20horridum/Main.html>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



## หมักแปม

*Garcinia lanceifolia* Roxb.

CLUSIACEAE

**ไม้พุ่ม** เล็กหรือไม้ต้นเล็ก สูง 2-6 เมตร แตกกิ่งก้านคู้ห่างๆ กันตามแนวนอน เปลือก สีน้ำตาลเข้มถึงสีอมเทา ค่อนข้างรุ่มรัง เปลือกในสีเหลืองถึงแดงเข้ม ใบ กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 7-11 เซนติเมตร รูปร่างรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนสอบ ค่อนข้างเบี้ยว เนื้อบาง สีเขียวด้านบน ด้านล่างสีอมเทา ใต้สีเขียวอมสีเทา ก้านใบ คู่ ประมาณ 8 คู่ ระยะห่าง 7-18 เซนติเมตร ค่อนข้างตรงและเชื่อมกันเป็นเส้นเรียบขอบใบค่อนข้างนูน เส้นใบ ย่อยเล็กเป็นชั้นบันได เป็นแฉ่งไม่สม่ำเสมอ และมีเส้นย่อยเล็กๆ เป็นร่างแหละเอียดจาง ก้านใบเล็กยาว 0.8-1.3 เซนติเมตร ปลายเป็นปีกเล็ก กิ่งเล็กสีน้ำตาลเข้ม ดอก ดอกเพศผู้สีส้มอ่อนถึงแดงเข้ม ออกเดี่ยวหรือ 2-3 ดอก อยู่ด้วยกันที่ซอกใบและปลายกิ่ง ก้านดอกแข็งยาว 2-4 มิลลิเมตร กว้างไปยังปลาย ใบประดับ 1-3 ใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบยาว 4-5 มิลลิเมตร ไม่เท่ากัน สีส้มหรือแดง เนื้อคล้ายหนังขอบบาง กลีบดอก 4 กลีบ สั้นกว่ากลีบเลี้ยง รูปไข่กลีบแนบกัน เนื้อบาง ร่วงเร็ว เกสรเพศผู้ประมาณ 15 อัน อยู่แน่นเป็นก้อนแบนตรงกลาง ดอก ไม่มีเกสรเพศเมียเป็นหมัน ดอกเพศเมียไม่พบ ผล รี ยาว 5 เซนติเมตร ไม่มีก้าน ผลปลายแหลมเมื่อยังอ่อน แล้วเริ่มกลมหรือแบน ปลายกลมหรือบวมมียอดเกสรเพศเมียเล็กอยู่ในช่องต้น โคนบวม กลีบเลี้ยงไม่ขีด ขนาด 4 มิลลิเมตร กลี้ยง ลูกสีแดงสด หนึ่งสีดำ ย่นมาก พบในป่าดิบบนเขาหินปูน สูง 80-150 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน พินดา สิทธิสุนทร กิ่งกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





หมักฟัก

*Drypetes harmandii* Pierre ex Gagnep.

PUTRANJIVACEAE

ไม้ต้นเล็กถึงกลางไม่ผลัดใบ ไม่มียางขาว ใบ เดี่ยว เรียงเวียน โคนมักเบี้ยว ขอบใบจัก ใบยาว 13-21 เซนติเมตร ก้านใบยาว 0.7-1.1 เซนติเมตร ผลขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร ไม่มีก้าน ใบแห้งสีน้ำตาล ยอดอ่อน มีขนแน่น



อ้างอิง: การ์ดเนอร์, โสมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



# หมากขี้ยายขาว

*Cryptocarya ferrea* Blume

LAURACEAE

**ไม้ต้น** สูงได้ถึง 15 เมตร เปลือกเรียบ สีน้ำตาลแดง กิ่งเล็กเรียว เมื่ออ่อนมีขนละเอียดสีออกน้ำตาล ใบกว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 9-16 เซนติเมตร รูปขอบขนาน ถึงรีแคบหรือรูปไข่กลับ ปลายทู่หรือเรียวแหลมสัน โคนรูปลิ้นหรือกลมค่อนข้างเบี้ยว เนื้อคล้ายหนัง เกี้ยงและเป็นมัน ด้านบนมีขนและขนละเอียดถึงเกลี้ยงด้านล่าง เส้นใบ 6-14 คู่ โค้ง ก้านใบยาว 0.5-1.8 เซนติเมตร ช่อดอกยาว 4-16 เซนติเมตร มีสัน มีขนกำมะหยี่ ใบประดับย่อยยาวมากกว่า 1 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงยาว 2.5-4 มิลลิเมตร มีขนสีออกเหลืองแน่น ผลรูปไข่ถึงขอบขนาน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร ก้านเล็กเรียว มีสันตื้นๆ เรียบหรือเป็นตุ่ม สีม่วงถึงออกดำ มีน้ำยาง พบทั่วไปในป่าที่ต่ำและป่าดิบเขา สูงได้ถึง 1,000 เมตร บางทีพบในป่าพรุน้ำจืด



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : ธรรมสารพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า  
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ปาล์มลำต้นเดี่ยวขนาดใหญ่ สูงเหนือเรือนยอดต้น  
ไม้อื่นๆ คือสูงได้ถึง 20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางต้น  
15-25 เซนติเมตร มีรอยกาบใบ ใบประกอบแบบขนนก  
เอนหรือห้อยลง 15-20 ทาง กาบใบยาว 60 เซนติเมตร  
กาบแยกต่ำ ขอบกาบใบมีใย ก้านใบยาว 50-75  
เซนติเมตร แผ่นใบยาว 3.50 เมตร ลักษณะโค้งลง หรือ  
บางครั้งจะบิด มีใบย่อยด้านละ 60-75 ใบ ใบขนาด 5-8  
x 75-100 เซนติเมตร เรียงชิดกันเป็นระเบียบ ปลายใบ  
ย่อยห้อยลง ใต้ใบสีเทาอมน้ำตาลแกมสีเงิน ปลายใบ  
ตัดและหยักไม่เท่ากัน ช่อดอกแผ่ออกระหว่างกาบใบ  
3-5 ช่อ แต่เมื่อติดผลอาจจะอยู่ใต้ช่อดอกรวมยาว  
75-90 เซนติเมตร ก้านช่อดอกอ้วน ยาว 30-45  
เซนติเมตร ช่อดอก 25 เซนติเมตร แตกกิ่งย่อยจำนวน  
มาก ยาว 25-30 เซนติเมตร ซึ่งจะแผ่ออกขณะออก  
ดอก แต่จะห้อยลงเมื่อติดผล ผลทรงกลม ขนาด 3.5-4  
เซนติเมตร สีเหลืองหรือสีเหลืองอมเขียว ติดผลเกือบ  
ตลอดปี พบได้บ่อยในป่าขึ้นเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้  
ที่ความสูง 100-600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล



ข้อมูลอ้างอิง : พูนศักดิ์ วัชรารักษ์ ปาล์มและปรงในประเทศไทย - กรุงเทพฯ: บ้านและสวน, 2548. 271 หน้า: ภาพประกอบ (สี). (ชุดไม้ดอกไม้ประดับ ลำดับที่ 33)  
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



หยีน้ำ

*Derris indica* (Lam.) Bennet

FABACEAE

ไม้ต้นเล็ก ไม้ผลัดใบ หรือผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 15 เมตร (พบน้อยที่สูง 25 เมตร) ลำต้นสีน้ำตาล กิ่งแผ่กว้าง เปลือกสีเทาอ่อนถึงน้ำตาลอมส้ม เนื้อแน่นแข็ง กลิ่นแรงคล้ายถั่วบด ใบ ยาว 15-30 เซนติเมตร ใบย่อย 2(3) คู่ ออกตรงข้าม กว้าง 4/8 เซนติเมตร ยาว 7-14 เซนติเมตร พบน้อยที่กว้างถึง 15 เซนติเมตร ยาวถึง 25 เซนติเมตร รูปรีกว้างถึงรูปไข่ ปลายหุบสั้น โคนกลมหรือหุบ ยอดอ่อนสีแดงถึงสีชมพู มีขนละเอียด ใบแก่บางคล้ายกระดาษ สีเขียว เป็นมันด้านบน สีเขียวขุ่นด้านล่าง เกือบทั้งสองด้าน เส้นใบ 5-8 คู่ โค้ง ชัดด้านล่าง ก้านใบย่อยของใบข้างยาว 5-8 มิลลิเมตร ค่อนข้างใหญ่ล่ำ ใบย่อยปลายยาวกว่ามาก ไม่มีหูใบย่อย หูใบยาว 3-4 มิลลิเมตร รูปขอบขนาน มีขนตามขอบ ร่วงเร็ว ดอก ยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร สีขาวถึงสีม่วงหรือสีชมพูอมม่วง มักมีสีเหลืองหรือสีเขียวแซมด้านใน กลิ่นหอม ออกเป็นช่อเล็กเรียวยาว ไม่แตกกิ่งตามซอกใบ ยาว 12-20 เซนติเมตร ดอกออกเป็นคู่ก้านดอกยาว ประมาณ 8 มิลลิเมตร เล็กเรียวยาว กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร รูปถ้วย ไม่จักเป็นซี่ฟัน (หรือจักเพียงตื้นๆ) สีม่วงแดง มีขนสีน้ำตาลแน่น กลีบดอกกลางกว้างประมาณ 1.2 มิลลิเมตร รูปค่อนข้างกลม ปลายแหลมสั้นหุ้มกลีบดอกอื่นเมื่อบานใหม่ๆ แต่ต่อไปโค้งไปด้านหลัง มีขนละเอียดสีน้ำตาลด้านนอก กลีบปีกข้างและกลีบคู่ด้านล่างยาวประมาณ 1 เซนติเมตร โคนกลีบชิดกัน เกสรเพศผู้มี 10 อัน เชื่อมเป็นแผ่นเดียวล้อมรอบรังไข่ อันบนปลายและโคนแยก แต่ติดกับอันอื่นตรงกลาง รังไข่มีขนเล็กน้อย มีก้านยาว 1-2 มิลลิเมตร ผล กว้าง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร รูปขอบขนาน ปลายมีจะงอยโค้งสั้น โคนแคบ ไปยังก้านเล็กเรียวยาว 0.6-1.2 เซนติเมตร ป่องขีด (หนา 1-1.5 เซนติเมตร ตลอดฝัก ไม้ใช้ป้องกันเฉพาะตรงเมล็ด เกือบๆ อาจมีช่องอากาศกระจาย เนื้อหนามันถึงแข็ง มีเส้นใยด้านใน แก่แตก เมล็ด 1(2) เมล็ด ยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร รูปไข่แบนหรือรูปไต สีน้ำตาลเข้ม พบมากตามชายฝั่งทะเล และริมแม่น้ำทั่วภาคใต้ใช้ชื่อ *Pongamia pinnata* หรือ *Derris indica* ในหนังสือพรรณไม้เล่มเก่าๆ



ข้อมูลอ้างอิง : ไขมอน การัดเนอร์ พิษดา สิทธิสุนทร ก่องานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบฟล. 2559. 792 หน้า.  
ภาพประกอบ : [http://www.cpsbg.org/Database/BOTANIC\\_Book%20full%20option/search\\_detail.asp?botanic\\_id=2374](http://www.cpsbg.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2374)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



# หทัยสามใบ

*Sarcotheca griffithii* Hallier f.

OXALIDACEAE



ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 เมตร มีพุ่ม ใบ ประกอบ มี 3 ใบ ใบย่อยข้างมักร่วง แต่ทั้งครึ่งล่างของก้านใบไว้ ใบแกว้าง 1-4 เซนติเมตร ยาว 2-11 มิลลิเมตร เกลี้ยง เส้นใบ 1-6 คู่ ก้านใบยาว 0.5-1.2 ก้าน ใบย่อยยาว 3-7 มิลลิเมตร ดอก สีขาวหรือแดงเข้มโคนสีขาว สมมาตร มีพORMของก้านเกสรเพศเมียสั้นและยาว อยู่คนละต้น ออกเป็นกลุ่ม เป็นช่อล่ำ แตกแขนงแน่น ยาว 2-10 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร มีขนสีน้ำตาลเล็กน้อยด้านนอก กลีบดอกยาว 5-9 มิลลิเมตร ผล มีกลีบเลี้ยงติดทน มี 5 ร่องหรือสัน มีเนื้อ ไม้แตก มีเมล็ดแข็งสีแดงได้ถึง 10 เมล็ด ไม้มีเยื่อหุ้ม ยาว 1.8-3.2 เซนติเมตร สีเหลืองออกเขียว รูปรี พบในป่าดิบ เต็มที่ต่ำ ในคาบสมุทรมมาเลเซีย (ทุกรัฐยกเว้นกลันตัน)



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โจนอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ธรินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพผล : <http://flyingfishfriends.blogspot.com/2016/05/sarcotheca-griffithii-native-star-in.html>

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 12(20) เมตร เรือนยอดแตกสาขาไม่เป็นระเบียบ กิ่งต้นไม่มีมดภายใน เปลือก สีเทาอ่อน กิ่งเลี้ยง มีรอยขีดตามยาวและแผลเป็นขนาดใหญ่ เกิดจากใบร่วง น้ำยางสีแดง ใบจัก 3 พู (บางที่มีพูเล็กที่โคนเพิ่ม) รูปไข่ถึงรูปไข่กว้าง กว้างได้ถึง 28 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 35 เซนติเมตร พูกลางรูปไข่ แคบถึงรูปสามเหลี่ยม ยาวและกว้างกว่าพูข้าง ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนกลมหรือเรียว ก้านบิด โดยมีก้านใบติดลึกลงจากขอบใบถึง 7 เซนติเมตร ขอบมีต่อมซี่ฟัน ใบอ่อนสีน้ำตาลอมส้มถึงสีม่วงแดง มีขนแข็ง ใบแก่บาง สีเขียว ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างสีเขียวอมเทาและมีขนละเอียดหรือเกือบเกลี้ยง เส้นใบย่อยขนาน ก้านใบยาวได้ถึง 25 เซนติเมตร มีขนหรือเกลี้ยง หูใบรูปไข่กว้าง กว้าง 5-10 เซนติเมตร ยาว 7-12 เซนติเมตร มีขนหรือเกลี้ยง สีเหลืองทองหรือสีแดงเข้ม แผ่นกว้างหรือโค้ง ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแตกหลายแขนง ตามซอกใบหรือใต้วงใบ กว้าง 8-16 เซนติเมตร ยาว 10-22 เซนติเมตร สีเขียวอ่อนหรือสีม่วงแดง กิ่งเลี้ยง หรือมีขนสีออกขาวและขนสีสนิม ใบประดับย่อยขนาด 2-5 มิลลิเมตร ปลายเรียวแหลม ขอบมักเรียบมีขนสีสนิม มีดอก 20-35 ดอก ต่อ 1 ใบประดับย่อย ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร มีขนสีสนิม กลีบเลี้ยงจักเป็น 3 พู เกสรเพศผู้มี 1 อัน ดอกเพศเมีย ขนาด 3-4 มิลลิเมตร ออกเป็นช่อกว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร ไม่แตกแขนง หรือแตกแขนงคู่หนึ่งใกล้โคนกลีบเลี้ยงรูปโถ ขนสีสนิม ยอดเกสรเพศเมียมี 4-5 แฉก ยาว 2-3 มิลลิเมตร เชื่อมกันที่โคน ผล ค่อนข้างกลม ขนาด 1-1.3 เซนติเมตร ไม่มีก้านผล มีบ่า 4-5 โหล ซึ่งต่อไปพัฒนาเป็นเขาสีเหลืองเหนียว ยาว 3-5 มิลลิเมตร โคนมีกลีบเลี้ยงและแฉกยอดเกสรเพศเมียติดอยู่ พบบ่อยทั่วไปในป่ารุ่นและที่ว่างในป่าดิบเดิม จังหวัดตรัง นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์ดเนอร์ พันดา สิทธิสุนทร ก่อภานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่ม2 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรมพญา :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า  
ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/24557638@N03/2339569789/in/photostream/>



ต๋าว

*Arenga westerhoutii* Griff.

ARECACEAE




**ปาล์ม** ลำต้นเดี่ยวขนาดใหญ่ มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สูง 20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 40-60 เซนติเมตร มี รอยกาบใบเป็นวง และคลุมด้วยเส้นใยของกาบใบแห้งจนถึงพื้น มีรากค้ำจำนวนมากที่โคนต้นสูงจากพื้น 80 เซนติเมตร เมื่อดันติดผลแล้วจะตาย ใบ ประกอบแบบขนนก ตั้งแต่ 12-15 ทาง กาบใบแยกออกจากกัน ขอบ กาบใบเป็นเส้นแห้งแข็งสานกันเป็นร่างแห สีดำ บางครั้งเปลี่ยนเป็นเส้นแข็งตั้งชันคล้ายหนาม ยาว 60-100 เซนติเมตร ก้านใบอ่อน ยาว 1 เมตร แผ่นยาว 6-7 เมตร มีใบย่อยได้ถึงด้านละ 150 ใบ ใบขนาด 7-10×100-130 เซนติเมตร เรียงตัวสม่ำเสมอในระนาบเดียวกันพบน้อยมากที่จะเรียงบิดต่างระนาบกัน ใต้ใบสีเทาอมน้ำตาล ปลายหยัก ไม่สม่ำเสมอ แต่ปลายใบคู่สุดท้ายมักติดกันและกว้างกว่าคู่อื่น ดอก ช่อดอกออกระหว่างกาบใบ 4-6 ช่อ ช่อดอกรวมยาว 2-2.5 เมตร โดยจะเริ่มออกทางด้านปลายยอดไล่ลงมาตามลำต้น ก้านช่อดอกอ่อน ยาว 60-90 เซนติเมตร ช่อดอกยาว 1.2-1.6 เมตร แตกกิ่งย่อยห้อยลง 40-50 กิ่ง ยาว 1.6 เมตร ผล ทรงกลม ขนาด 5-7 เซนติเมตร พบ ตามริมเขาหินปูนในป่าดิบชื้นทั่วทุกภาค ที่ความสูง 500 เมตร ภาคใต้พบบ่อยมากตาม เขาหิน ปูนหรือชอกเขาชัน โดยจะพบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่บริเวณเชิงหน้าผา กระจายพันธุ์ในเขตชายแดน ไทย-มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ภูฏาน และอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลอ้างอิง : พูนศักดิ์ วิจารณ์. ปาล์มและปรงในป่าไทย-กรุงเทพฯ: บ้านและสวน, 2548. 271 หน้า  
ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Arenga+westerhoutii>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



# หลาวค่าง

*Crudia lanceolata* Ridl.

FABACEAE

ไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ใบ แกนกลางใบยาว 3-9 เซนติเมตร ใบย่อย 3-4 ใบ กว้าง 2.5-4.5 เซนติเมตร ยาว 6-14 เซนติเมตร ใบ ล่างมักมีขนาดเล็กที่สุด รูปรีถึงใบหอก หรือรูปไข่กลับแคบ ปลายเรียวแหลม โคนกลม หรือรูปรีมน สมมาตรหรือเกือบสมมาตร ใบย่อยแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกือบหรือมีขนละเอียดกระจายเฉพาะบนเส้นกลางใบ เส้นใบ 6-10 คู่ ค่อนข้างจาง ก้านใบย่อยยาว 2-5 มิลลิเมตร เกือบ ใบยาว 3 มิลลิเมตร อยู่ติดกับก้านใบ ดอก เป็นช่อห้อย ยาว 10-22 เซนติเมตร ตามซอกใบ หรือที่ปลายกิ่ง มีขนละเอียด ใบประดับยาว 3 มิลลิเมตร แยกเป็น 3 พู ใบประดับย่อยเล็กมาก ก้านดอกยาว 2-6 มิลลิเมตร มีข้อต่อที่โคน ขนละเอียด กลีบเลี้ยงกว้าง 3 มิลลิเมตร ยาว 4 มิลลิเมตร ขนาดไม่เท่ากัน ปลายหุบ มีขนด้านนอก เกือบด้านใน เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาว 3-6 มิลลิเมตร รังไข่ยาว 2-3 มิลลิเมตร ก้านสั้น ยาว 1 มิลลิเมตร มีขน ไม่รวมกัน ก้านเกสรเพศเมีย ยาว 3 มิลลิเมตร เกือบ ยอดเกสรเพศเมียไม่ชัด ผล กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร รูปไข่เบี้ยวที่ปลายมีจะงอยเบี้ยวสั้น ยาว 7 มิลลิเมตร มีเส้นขีดหรือเป็นแอ่งบวม ไม่สม่ำเสมอ มีขนกำมะหยี่สีสนิม เมล็ดกลมใหญ่ 1-2 เมล็ด ยาว 2.5 เซนติเมตร พบน้อยในป่าดิบที่ต่ำ จังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง ปัตตานี นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การันเดอร์ พิณดา สิทธิสุนทร ก่องกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า.  
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

