

มะม่วงเลือด

MYRISTICACEAE



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โจนฮอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ฌวรินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี



ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 15 เซนติเมตร พบน้อยสูงได้ถึง 30 เซนติเมตร อาจมีพุ่มพองเดี่ยว เปลือกสีน้ำตาลอมเทาถึงน้ำตาลแดง เรียบหรือเป็นสะเก็ดละเอียด เปลือกในสีชมพูอมส้มถึงสีออกแดง มีน้ำเลี้ยงสีแดงอมส้มประปราย ใบ กว้าง 2.5-10 เซนติเมตร ยาว 9-30 เซนติเมตร รูปขอบขนานถึงรูปไข่กลับแคบ หรือใบหอกกลับ ปลายทู่หรือแหลมสั้น ค่อยๆ สอบแคบไปยังส่วนล่าง โคนกลมหรือพบน้อยถึงรูปหัวใจใบแก่ มักมีสีออกเทา (มีนวล) และมีตุ่มเล็กๆ ด้านล่าง มีขนแตกกิ่งสีน้ำตาลอมส้มติดทน ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร (ทุกเส้นเหมือนกันทั้งขนาดและรูปร่าง) เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบ 12-28 คู่ แบนหรือเป็นร่องด้านบน (อย่างน้อยเส้นล่างๆ) เส้นใบ ย่อยละเอียดแต่เห็นได้ชัด ก้านใบยาว 1-2 เซนติเมตร ลำ มีขนหยาบเมื่ออ่อน แล้วเกลี้ยง กิ่งอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ยาว 2-5 มิลลิเมตร มีขนหยาบแน่นสีน้ำตาลอมส้ม ยาว 0.5-2 มิลลิเมตร แก่แล้วเกลี้ยงแต่ไม่แตกหรือลอก ดอกเพศผู้สีชมพูถึงแดงเข้มด้านใน ออกเป็นช่อธรรมดาหรือแตกเป็นง่าม ยาวได้ถึง 7 มิลลิเมตร ไม่มีก้านช่อดอก (หรือยาวไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร) มี 5-20 ดอก ก้านดอกยาว 2-5 มิลลิเมตร ดาดอกกว้าง 2-4 มิลลิเมตร ยาว 4-6 มิลลิเมตร ทรงรูปไข่กลับ จักประมาณครึ่งหนึ่ง ออกเป็น 3 พูหนา ปลายโค้ง มีขนสีสนิมแน่นด้านบนนอก ขนยาว 0.5-2 มิลลิเมตร จานเกสรเพศผู้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 1-1.5 มิลลิเมตร บนเส้นเกสรเพศผู้เรียวยาวแหลม ยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร กลมหรือกึ่งสามเหลี่ยมตรงกลาง แบนหรือเว้าตื้น อับเรณู 6-9 อัน ดอกเพศเมียคล้ายดอกเพศผู้ยกเว้นช่อดอกมี 3-8 ดอก ก้านดอกยาวไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ดาดอกทรงขอบขนานแกมรูปไข่ ก้านเกสรเพศเมียเล็กเรียวยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียเป็น 8 พู ผล กว้าง 1-2.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-3 เซนติเมตร ก้านผลลำ ยาวได้ถึง 0.5 เซนติเมตร มี 1-5 ผลอยู่ด้วยกัน ทรงรูปไข่ถึงรีกว้าง มักมีสันนูน มีขนหยาบติดทนแน่นสีสนิม ยาว 1-3 มิลลิเมตร พบในป่าดิบเดิมหรือป่าลูก ทำลาย สูงได้ถึง 1,000 เมตร จังหวัดระนอง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮจน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ธรินทร์พรินต์แอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : <http://www.natureloveyou.sg/Knema%20laurina/Main.html>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้น ขนาดใหญ่สูงได้ถึง 30 เมตร เปลือกสีเทาถึงน้ำตาล ออกแขนงนุ่มสั้น มียอดสีเหลืองทอง มีใบเลี้ยงรูปกลม ร่วงง่าย สีแดง ก้านใบเลี้ยงยาว 15-20 มิลลิเมตร ใบ รูปหัวใจกว้าง ขนาด 13-35x10-17 มิลลิเมตร ผิวทั้งสองด้านเกือบเกลี้ยง โคนใบสั้นกลม ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลมหรืออาจป้านก็ได้ ดอก ช่อดอกเป็นช่อ แบบแยกแขนง ออกตามซอกใบ ออกน้อยมีสีแดง มีก้านดอกย่อย กลีบเลี้ยงรูปประฆัง ขนาด 17-20 เซนติเมตร กลีบดอกมีลักษณะเรียวยาวแหลม รวมกันหนาแน่น เกสรเพศผู้มีก้านเกสรทรงกระบอก เกสรรูปกรวย มีขนละเอียดยาวครึ่งหนึ่งของกลีบเลี้ยง อับเรณู มี 3-5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 อัน อยู่บนเกสรเพศผู้ ดอกเพศเมียมีลักษณะสั้นจำนวนมาก รังไข่ทรงกลม มีขนละเอียด ผลเป็นรูปทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 12 มิลลิเมตร มีขนละเอียด มีเนื้ออยู่ด้านนอก เมล็ดมีรูปรี แบนยาวประมาณ 7 เซนติเมตร พบในประเทศจีน บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200013831

ภาพลำต้น/ใบ/ผล : <https://indobiodiversity.org/species/show/17767>

ภาพผล : <http://medplants.blogspot.com/2015/08/pterygota-alata-sterculia-alata-buddha.html>



หัวเต้า

Mezzettia parviflora Becc.

ANNONACEAE

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 12-40 เมตร เรือนยอดแน่น ลำต้นเล็กกลมตรงมีพูพอนเล็ก เปลือกสีน้ำตาลเข้มถึงดำอมเทา เรียบหยาบหรือแตกไม่เป็นระเบียบ เปลือกในสีเหลืองอ่อนถึงสีส้มอมน้ำตาล หนาและมีเส้นใย มีกลิ่นเป็นกรด ใบ ออกแผ่แบน รูปขอบขนานถึงใบหอกแกมรี กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 6-13 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนกลมถึงแหลม ขอบเป็นคลื่นและโค้งกลับ เนื้อคล้ายหนัง สีเขียวเข้มมันด้านบน ด้านล่างสีอ่อน ไม่เป็นนวล เกือบทั้งสองด้าน เส้นกลางใบกว้างแบนด้านบน เส้นในเล็ก 8-10 คู่ ฐานสองด้าน โค้งและเชื่อมกันห่างจากขอบ 3-5 มิลลิเมตร เส้นใบย่อยชัดเท่ากับเส้นใบ ก้านใบยาว 0.6-1 เซนติเมตร เกือบทั้งกิ่งอ่อน เกือบทั้งต้นน้ำตาลเข้มมัน ดอก สีเขียวอ่อนถึงสีเหลืองอมเขียวอ่อน ก้านดอกยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร สมบูรณ์เพศ ออกเป็นกระจุก 2-9 ดอก ก้านช่อดอกสั้น ยาวน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ตามกิ่งหรือต่ำกว่า ใบแก่ ใบประดับเล็กที่โคน กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ กว้าง 2 มิลลิเมตร ยาว 3 มิลลิเมตร แยกกันปลายแหลม มักโค้งกลับ ไม่ซ้อนกัน มีขน รูปใบหอก ถึงขอบขนานแคบ กว้าง 3 มิลลิเมตร ยาว 15 มิลลิเมตร (ยาวมากกว่า 3 เท่า ของความกว้าง วงใน 3 กลีบ รูปไข่ถึงขอบขนาน กว้าง 3 มิลลิเมตร ยาว 6 มิลลิเมตร สั้นกว่า 3 กลีบนอกมาก เกสรเพศผู้ 9-16 อันแกนอับเรณูยอดแบนเรียว 2-3 วงบนฐานดอกเล็ก โค้งมีขนบางที่มีขนที่เป็นหมัน 2-3 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน รูปไข่หรือรูปแจกัน ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร เกือบมีนวลสีขาว ปลายเรียวแหลมไปยังยอดเกสร ผลรูปไข่ถึงรูปรี (หรือกลม) ยาว 5-8 เซนติเมตร ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ไม่มีก้านช่อผลรวม เมื่ออ่อนมีสีเขียวอมเทา มีนวล แก่มีสะเก็ดสีน้ำตาลอมเทา ก้านผลแข็ง ยาว 1-2 เซนติเมตร ผนังผลหนาแข็ง เมล็ดใหญ่ สีดำ 2 เมล็ด ยาว 3-4 เซนติเมตร พบกระจายในป่าดิบเดิมและป่าร่น สูงถึง 300 เมตร บนดินทราย จังหวัดระนอง นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา ผลพบที่อื่นจะกลม แต่ในภาคใต้รูปไข่หรือรี



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์, ฟินดา ลิตธิสุนทร กองสถานฯ ชยามฤตไผ่ภาคใต้ เล่ม 1 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์ปทป. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



หัวแมงวันหนู

Buchanania sessifolia Blume

ANACARDIACEAE

ไม้ต้นสูง 4-27 เมตร อาจผลัดใบบางส่วน มีพุ่มหนาใหญ่ตามอายุ เปลือก สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลอมชมพู เรียบหรือค่อนข้างขรุขระ เปลือกในสีชมพูถึงน้ำตาลอมแดง มีน้ำเลี้ยงเป็นยางใส ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับ ดอกที่ปลายกิ่ง รูปขอบขนานถึงรูปไข่กลับ กว้าง 2.5-7 เซนติเมตร ยาว 6-20 เซนติเมตร (ต้นอ่อนอาจกว้างได้ถึง 9 เซนติเมตร ยาวถึง 30 เซนติเมตร) ปลายใบเรียวแหลม เนื้อบางกว่า เกือบหรือมีขนนุ่มสั้น ก้านยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร ดอกมีสีเขียวอ่อนหรืออมเหลือง ก้านดอกยาว 0.5-1 มิลลิเมตร กลีบดอกปลายแหลม ก้านชูอับเรณูเรียวแหลมไปยังปลาย ผลรูปไข่ เบี้ยวหรือรูปหัวใจ



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าชาได้ แฉ่ม 1 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพข้อใบและดอก/ผล : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/13351309725/in/photostream/>

ภาพหลังใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





ไม้ต้นเล็กถึงกลาง สูงได้ถึง 30 เมตร โคนมักเป็นปึกหรือมีพูพอน เปลือก สีน้ำตาลอมเทาถึงสีน้ำตาลแดง แตกเป็นเกล็ดเล็กๆ หรือเป็นจ้ำสีอ่อนด้านใต้ เปลือกในเป็นจุดสีน้ำตาลอมเหลือง มีเส้นใยสีอมดำ และมีหยดน้ำยางขาวทั่วไป ใบ กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 7-13 เซนติเมตร ออกสลับหรือเวียนสลับ รูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมรี ปลายแหลมถึง โคนกลมหรือรูปลิ่มกว้างเบี้ยว กิ่งอ่อนเกลี้ยงหรือมีขนสีสนิมกระจาย ใบแก่คล้ายหนังบาง ด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวอมเหลือง เกลี้ยงทั้งสองด้าน มีจุดเล็กสีเข้มจมนอยู่ในเนื้อใบ เส้นกลางใบจมน้ำบน เส้นใบ 4-6 คู่ห่างกัน ทำมุมแหลมชัน จมน้ำบนเล็กน้อย ฐานด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดละเอียดและจาง ก้านใบยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร เรียว พองที่ปลาย ดอกขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร สีเขียวอ่อนถึงสีขาวอมเหลือง สมบูรณ์เพศ เป็นช่อเชิงลดเล็ก ไม่แตกกิ่งหรือพบบ้างที่แตกกิ่ง ยาวถึง 12 เซนติเมตร ก้านดอกสั้นมาก มีดอกออกตรงข้ามกัน (1)2-3 ดอก กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายจักซี่ฟัน 4-5 ซี่ ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ติดแน่นแต่ไม่ขยายใหญ่ เมื่อเป็นผล กลีบดอก 4 กลีบ (พบบ้าง 3 หรือ 5) รูปไข่ แยกกัน กว้าง 1.5 มิลลิเมตร ยาว 2.5 มิลลิเมตร ด้านในมีขนกระจาย เกสรเพศผู้ 5-15 อัน มักอยู่เป็นคู่ (พบน้อยที่เป็น 1-3) ตรงกับกลีบดอก ก้านชูอับเรณูเล็ก สีขาว อับเรณูสีน้ำตาล ฐานฐานดอกสีน้ำตาลอมม่วงดำ เห็นไม่ชัด นุ่มและตื้น รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียใหญ่สั้น ยอดเกสรเพศเมียเป็นพูเล็ก 3 พู ผล ขนาด 2 เซนติเมตร ก้านใหญ่ยาว 3 มิลลิเมตร ช่อหนึ่งมี 1-2 ผล กลมถึงรูปไข่ มีกลีบเลี้ยงเล็ก ติดที่โคน สีเขียวแก่ มักเป็นปม ผนังบาง เมื่อตัดมียางคล้ายน้ำมัน เนื้อนุ่มบาง เมล็ดกลมอยู่ในผนังผลชั้นใน แข็ง ขนาด 1 เซนติเมตร พบในป่าดิบ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์, สิบธิสุนทร, ก้องกานดา, ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 1 - พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คปท. 2558, 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพดอก : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3044>

ภาพถ่ายต้นใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



หางนกยูงฝรั่ง

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

FABACEAE

ชื่อพื้นเมือง : นกยูงฝรั่ง ส้มพอหลวง หงอนยูง

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แกนข้อใบ ยาว 50-60 เซนติเมตร แกนแขนงมี 9-24 คู่ ใบรูปขอบขนาน กว้าง 3-4 มิลลิเมตร ยาว 8-10 มิลลิเมตร โคนใบเบี้ยว ปลายใบมน ดอกสีแดงเข้มส้มเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตร มี 5-10 ดอก ดอกย่อยขนาด 5-8 เซนติเมตร กลีบรองดอก 5 กลีบ ด้านในสีแดง กลีบดอก 5 กลีบ รูปช้อนขนาดไม่เท่ากัน เกสรเพศผู้ 10 อัน ผลเป็นฝักโค้ง แข็ง กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 30-60 เซนติเมตร มี 20-40 เมล็ด เมื่อแห้งจะแตกตามสัน เป็นพันธุ์ไม้ของเกาะมาดากัสการ์ นิยมนำมาปลูกทั่วไปในเขตร้อนทั่วโลก ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.qsbx.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1076

ภาพประกอบ : ภาพพื้น : https://www.mozambiqueflora.com/cult/image-display.php?species_id=164780&image_id=3

ภาพฝัก : http://dbiodbs.univ.trieste.it/corso/chiavi_pub26?spez=9335

ภาพคนต้นฉบับ : <https://sites.google.com/site/swnphvysastrsanpabngwithyakim/4khi-xmul-phanth-mi/hang-nik-yung-frang>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้พุ่มขนาดเล็กหรือไม้ต้น สูงถึง 10 เมตร แตกกิ่งดกสะพรั่ง เปลือก สีส้มหรือสีเทาอ่อน มีช่องอากาศ
 สีน้ำตาลอ่อน ใบ กว้าง 2.5-7 เซนติเมตร ยาว 8-18 เซนติเมตร มักออกแบนระนาบเดียว รูปไข่กลับ พบบ้าง
 รูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลมหรือค้อยๆ เรียวแหลม โคนแคบหรือหู่ ขอบจักซี่ฟันละเอียดหรือค่อนข้างเรียบ
 กิ่งอ่อนเรียบหรือมีขนเล็กน้อย ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกือบทั้งสองด้านหรือมีขนกระจายเฉพาะบนเส้นกลาง
 ใบด้านล่าง ไม่มีต่อม เส้นใบบาง 5-9 คู่ ไปจดกันที่ใกล้ขอบใบ เส้นร่างแหไม่สม่ำเสมอ ก้านใบยาว 0.3-1.5
 เซนติเมตร หูใบรูปสามเหลี่ยมยาว 1-3 เซนติเมตร ติดทน กิ่งอ่อนเป็นร่องหรือค่อนข้างเรียบ ดอก สีขาว ออก
 เป็นกลุ่มแน่นที่ง่ามใบ เหนือง่ามใบ หรือตามกิ่งที่ไม่มีใบ ช่อดอกรวมยาว 0.5-1.8 (2.5) เซนติเมตร ไม่มีรอย
 แผล แน่น ก้านดอกยาว 3-5 มิลลิเมตร มีรอยต่อ กลีบเลี้ยงยาว 1.2 มิลลิเมตร รูปไข่ มีขนเล็กน้อยด้านนอก
 กลีบดอกกว้างประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร รูปขอบขนาน บาง ขนเล็กน้อยด้านนอก
 อับเรณูมีรยางค์อันใหญ่ 1 อัน เล็ก 1 อัน รังไข่เรียบหรือมีขนกระจาย ก้านเกสรเพศเมีย เรียบ ผล ยาว 1.5-2.5
 (4) เซนติเมตร บนก้านแข็ง สีเขียวสด รูปรี ที่โคนมีกลีบเลี้ยงกางออกติดอยู่ หนามัน เกือบ มีเส้นร่างแหแตก
 ออกเป็น 3 เสี่ยง รูปรี แต่ละเสี่ยงมีเมล็ดสีน้ำตาล 1 หรือ 2 เมล็ด ขนาดประมาณ 8 มิลลิเมตร พบขึ้นในที่ร่ม
 ในป่าดิบชื้น อาจพบบนเขาหินปูนบ้าง



ข้อมูลอ้างอิง วารสารเนเจอร์, โชมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า.
 ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



หาด(มะหาดขน)

Artocarpus lacucha Roxb. Ex Buch.-Ham.

MORACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กาเย ตาแป ตาแปง ทั้งคัน ม่วงกวาง มะหาด ขนุนป่า มะหาดใบใหญ่ หาดขน หาดรุม หาดลูกใหญ่

ไม้ต้น ขนาดกลางถึงใหญ่ สูงถึง 25 เมตร ทรงพุ่มแผ่กว้าง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปมนแกมรูปไข่ ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลออกแดง ใบแก่หลังใบเป็นมัน สีเขียวเข้มท้องใบสาก ดอกออกเป็นช่อเดี่ยว ดอก สีเขียวปนเหลืองอ่อน ออกที่ซอกใบ ค่อนข้างกลม ก้านสั้น แยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน ออกตามง่ามใบ ผล เป็นผลรวมกลม ผิวขรุขระ ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกมีสีเหลือง เนื้อในสีชมพู เมล็ดลูกกลม เปลือกหุ้มเมล็ด สีขาว เปลือกต้นสีน้ำตาล ต้นแก่ผิวจะหยาบและเป็นเกล็ด พบทั่วไปในป่าดิบแล้งขึ้นแทบทุกภาคของประเทศ สูงจากระดับน้ำทะเล 100-400 เมตร ต่างประเทศพบที่ศรีลังกา อินเดีย พม่า คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว และไทย เนื้อไม้ทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์ รากให้สีย้อมสีเหลือง เปลือกใช้รักษาแผลติดเชื้อ ยางใช้แทนหมาก ใบเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ดี เมล็ดเป็นยาถ่าย ปลุกเป็นไม้ให้ร่ม



ข้อมูลอ้างอิง : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&Itemid=59&id=405

ภาพประกอบ : ภาพเปลือกไม้ : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&Itemid=59&id=405

ภาพใบ/ผล : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 เมตร เปลือก สีน้ำตาลเทา แตกเป็นแผ่นหรือเกล็ด เปลือกในสีชมพูหรือครีม มีแถบสีส้ม เนื้ออ่อน มียางขาวสีครีม ใบ กว้าง 6-16 เซนติเมตร ยาว 10-25 เซนติเมตร ออกกระหนาบเดี่ยวบนกิ่ง รูปรีถึงขอบขนาน หรือกึ่งรูปไข่ ปลายแหลมหรือแหลมสั้น โคนหูลึงกลมหรือรูปหัวใจตื้น ค่อนข้างไม่เท่ากัน ขอบใบไม่จัก มักมีขนเข้า ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีอ่อนกว่าและเป็นนวล เกลี้ยง หรือมีขนสั้นละเอียดสีขาวกระจายบนเส้นกลางใบทั้งสองด้าน เส้นใบ 9-14 คู่ ค่อนข้างขนานกัน หนาชัดทั้ง สองด้าน มักแตก เป็นง่ามและไปเชื่อมกันใกล้ขอบใบ (อย่างน้อยในส่วนของใบ) เส้นใบย่อยคล้ายขนบันได หนาเล็กทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1.5-3 เซนติเมตร เกลี้ยงหรือมีขนละเอียด หูใบยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีขนละเอียด ร่วงเร็ว ทั้งรอยแผลเป็นสันด้านข้าง กิ่งสีน้ำตาลเข้ม เล็กเรียว ค่อนข้างมีขนละเอียดเมื่ออ่อน แล้วเกลี้ยง ไม่มีรอยแผลเป็นวง ข้อดอกกลม ออกเดี่ยวที่ซอกใบ ข้อดอกเพศผู้ขนาด 1.2-2.5 เซนติเมตร บนก้าน ดอกยาว 0.6-1.8 เซนติเมตร ค่อนข้างกลม ถึงรูปไข่กลับหรือรูปดอกเห็ด สีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมน้ำตาลอ่อน ข้อดอกเพศเมียรูปไข่กลับถึงค่อนข้างกลม ก้านช่อยาว 1.5-5 เซนติเมตร มีขนละเอียด ผลยาวได้ถึงประมาณ 1.5-5 เซนติเมตร ไม่มีหนามหรือตุ่ม มีขนกำมะหยี่ละเอียด สุกสีเหลืองหรือน้ำตาลทอง เปลือกบาง ด้านในสีชมพูอมแดง เมล็ดรี กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร พบทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำหรือป่ารุ่น

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ธรินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

