

เหมือดวอน

Aporosa wallichii Hook.f.

PHYLLANTHACEAE

ไม้ต้นสูงได้ถึง 15 เมตร ใบเดี่ยว ไข่แกมรูปรี กว้าง 3.5-6.5 เซนติเมตร ยาว 9-17.5 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม หรือเป็นติ่งแหลม โคนมนหรือแหลม ขอบเป็นคลื่นหรือหยักมน แผ่นใบเกลี้ยง มีต่อมรูปจานกระจายทั่ว ดอก ช่อดอกออกที่ซอกใบ ช่อดอกเพศผู้ยาว 18-43 มิลลิเมตร มีขนประปราย ดอกเพศผู้ขนาดเล็กมาก กลีบเลี้ยง 3-4 อัน เกสรเพศผู้ 2 อัน ช่อดอกเพศเมีย ยาว 3-9 มิลลิเมตร มีขนประปราย กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ รังไข่มี 2 ช่อง เกือบเกลี้ยง ผล ผลรูปไข่ มีจะงอยขึ้นในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่เปิดตามชายป่า ที่ระดับความสูง 100-1,300 เมตร พบที่ตอนเหนือของอินเดีย พม่า ในประเทศไทยพบในภาคเหนือและภาคตะวันตก



ข้อมูลอ้างอิง : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=2384

ภาพประกอบ : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=2384



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



เหรีียง

Parkia timoriana (DC.) Merr.

FABACEAE (Leguminosae)

ชื่อพื้นเมือง : กะเหรีียง เรีียง สะเหรีียง นะกิง นะริง สะตือ

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 30-50 เมตร ไม้ค้อยมีกิ่งก้านที่ลำต้น เปลือกเรียบและหนาสีเทาปนเขียวอ่อน มีกลิ่นฉุน ลักษณะทั่วไปคล้ายสะตอ แต่พุ่มใบแน่นและเขียวทึบกว่า ใบใหญ่และหนากว่าสะตอ ลักษณะใบเป็นแบบช่อใบประกอบมี 18-33 คู่ ใบแคบปลายแหลม ใบแก่จะเป็นสีเหลืองร่วงเกือบหมดต้น และผลใบใหม่แทน ลักษณะดอกเป็นดอกช่อแบบสะตอ ออกที่ปลายยอด เป็นก้านยาวสีเขียวสลับน้ำตาล ลักษณะผลเป็นฝัก กว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร เมล็ดรูปไข่ ประมาณ 15-20 เมล็ดต่อ ฝัก ฝักแก่เต็มที่มีสีดำ เมล็ดในสีดำ เนื้อในเมล็ดมีสีเขียวเข้ม และมีกลิ่นฉุน เปลือกต้นเป็นยาสมานแผล ลดน้ำเหลือง เมล็ดเมื่อแก้ดส่วนปลายนำไปเผาให้แตกรากสั้นๆ รับประทานสดหรือดอง ใช้เป็นผักเหนาะและนำไปประกอบอาหาร ทั้งผัดและแกง เช่น แกงหมูกับลูกเหรีียง



อ้างอิง : <https://medthai.com/พื้นเหรีียง/>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-25 เมตร ลำต้นเป็นร่องมีพุ่มพองสั้น กิ่งสีน้ำตาลอ่อน เล็กเรียว เกี้ยง เปลือกสีครีมถึงสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นแผ่นบาง เปลือกในสีครีมถึงเหลืองอ่อน ใบ กว้าง 2.5-6 เซนติเมตร ยาว 6-11 เซนติเมตร รูปร่างขอบขนาน พบน้อยรูปใบหอกกลับ ปลายเรียวแหลม โคนแคบ เบี้ยวเล็กน้อย ขอบจักซี่ฟันตื้น ยอดอ่อนสีแดง ใบแก่สีเขียวด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่า เกี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบด้านข้าง 8-10 คู่ ก่อนข้างจาง เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด หนูนทั้งสองด้าน ก้านใบยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ดอก สีเหลืองออกเขียวถึงสีครีม มีสีน้ำตาลเงินแต้ม กลิ่นเหม็น ออกเป็นช่อแคบ ยาว 7-15 เซนติเมตร ที่ปลายกิ่งและง่ามใบบนๆ มีขนดอก ออกเดี่ยว บนกิ่งข้างบน ก้านเล็กเรียว ยาวได้ถึง 1 เซนติเมตร ที่โคนมีใบประดับเล็ก ยาวได้ถึง 1 มิลลิเมตร ไม่มีใบประดับที่ปลาย หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร รูปกรวย ปลายเป็นแฉกรูปใบหอก 5-6 แฉก กว้างประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร มีขนสีเทาทั้งสองด้าน กลีบดอก 5-6 กลีบ รูปไข่ กลีบกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อยในผล เกสรเพศผู้อยู่เป็นกลุ่ม 4-6 อัน ที่โคนของกลีบดอกแต่ละกลีบ แต่ไม่เชื่อมติดกัน ก้านชูอับเรณูมีขนที่โคน รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียสั้น 3 ก้าน พบเป็นพุ่มๆ ในป่าดิบหรือป่าไผ่ สูงได้ถึง 400 เมตร มักขึ้นบนหินปูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ยะลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ธรินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)




ແຫລເຂີຍວ

Dehaasia incrassata (Jack) Kosterm.

LAURACEAE

ไม้ต้น สูง 7-15 เมตร หรืออาจสูงได้ถึง 24 เมตร เรือนยอดรูปกรวยลึก เปลือกสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลอมเทา เรียบ กิ่งอ่อนสีเทาถึงสีออกขาว เกือบ ใบ กว้าง 5-10 เซนติเมตร ยาว 12-28 เซนติเมตร (กว้างได้ถึง 18 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 50 เซนติเมตร) ออกสลับหรือสลับเวียน รูปรีถึงขอบขนานแกมไข่หรือถึงรูปไข่กลับ เส้นกลางใบหรือเส้นใบนูนหรือเป็นร่องตื้นด้านบน เส้นใบ 6-9(12) คู่ โค้ง เส้นใบย่อย เป็นร่างแหชัด ก้านใบยาว ประมาณ 2.5 เซนติเมตร เป็นร่องด้านบน ดอก สีขาวออกเขียว ออกเป็นช่อแยกแขนง ที่ซอกใบบนๆ หรือใกล้ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาวได้ถึงประมาณ 7 เซนติเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร เล็กเรียว กลีบเลี้ยง รูปประติง พากลับรูปไข่กว้าง กว้าง 1.4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.2 มิลลิเมตร มีขนตามขอบ เกสรเพศผู้มีขนแน่น วงนอก 2 วง เป็นหมัน ผล กว้าง 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมไข่ แก่สีดำมัน ก้านผลยาว 3-4.5 เซนติเมตร ใหญ่ล่ำ สีแดงสด และมีตุ่ม พบตามป่าดิบที่ต่ำ



ข้อมูลอ้างอิง: โยมน การันเดอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยมฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559 792 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



แหล่คางคก

Phoebe attenuata (Nees) Nees

LAURACEAE

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 33 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นยาวได้ถึง 55 เซนติเมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ เกือบไม่มีหูใบ เส้นใบเรียงตัวแบบขนนก ท้องใบสีค่อนข้างขาว ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ออกดอกเป็นช่อ แต่ละดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร สีขาวปนเหลืองผสมสีแดง ผล สีแดง ยาวประมาณ 19 มิลลิเมตร แต่ละผลมี 1 เมล็ด แข็งและอ้วน ก้านผลป่อง สีชมพูออกแดง พบในป่าที่ยังไม่ถูกรบกวน ป่าเต็งรัง สูงได้ถึง 700 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.asianplantnet.net/Lauraceae/Dehaasia_caesia.htm

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ແຫລ່ງທ້ອງຂາວ

Persea declinata (Blume) Kosterm.

LAURACEAE

ໄມ້ຕັນ ເລັກຫຼືຂະໜາດກາງ ເປຼືອກ ເຮັບສີເທົາ ໃບ ກວ້າງ 2-4 ເສນຕີເມຕຣ ຍາວ 5-13 ເສນຕີເມຕຣ ຮູບຮີ່ງໃບ ຫອກແກມຂອບຂານ ປາຍແຫລມ ໂຄນຮູບປື່ມ ເນື້ອຄ້າຍໜຶ່ງບາງ ເຄື່ອງທັງສອງດ້ານ ເສັ້ນກາງໃບເປັນຮ່ອງດ້ານບນ ເສັ້ນໃບ 6-10 ຄູ່ ເລັກເຮັບ ໄດ້ ເສັ້ນໃບຍ່ອຍເປັນຮ່າງແຫລະເຍັດເກືອບຂັດເທົ່າເສັ້ນໃບ ກ້ານໃບຍາວ 0.7-1.5 ເສນຕີເມຕຣ ເລັກເຮັບ ເຄື່ອງ ດອກ ສີເຂັ້ວແກມເຫຼືອງດຶງຄຶມ ອອກເປັນຂ່ອຍແບບ ຍາວ 4-10 ເສນຕີເມຕຣ ຕາມຂອກໃບຫຼືໂຄ້ງ ປາຍກິ່ງ ເຄື່ອງ ແຕ່ລະດອກມີກ້ານດອກຍາວປະມານ 5 ມິລິເມຕຣ ທຸກສິບຮວມກວ້າງ 1 ມິລິເມຕຣ ຍາວປະມານ 2.5 ມິລິເມຕຣ ປາຍທູ່ ເຄື່ອງດ້ານນອກ ມີຂະໜາດເຍັດດ້ານໃນ ຜຸຍາວ 0.5-1 ເສນຕີເມຕຣ ກຸ່ມ ເຄື່ອງ ສຸກສີອອກແດງ ພົບຕາມບຣີເວນຂາຍຝັ່ງທະເລ ແລະປ່າສູງ ສູງໄດ້ຮັບ 1,200 ເມຕຣ



ຂໍ້ມູນອ້າງອິງ : ກາຣ໌ດເນວ, ໂຊມອນ ພິນດາ ສີຫິສຸນຸກ ກ່ອມກນດາ ຂຍາຊຸດ ໄມ້ປ່າກາດໄດ້ ເລີ່ມ - ພິມທຸກຮຶ່ງທີ 1-ກຸງເທພາ ໂຮມກຈັດພິມທັບໄຟ. 2559. 792 ໜ້າ: ກາຟປະກອບ
ກາຟປະກອບ : ສູນວິຊີຍແລະພັດທະນາວັດຖຸກຸມອຸທຸຍານແຫ່ງຊາດ ຈັງຫວັດສຸຣາທຸນຸຣາທຸນີ



ສູນວິຊີຍແລະພັດທະນາວັດຖຸກຸມອຸທຸຍານແຫ່ງຊາດ ຈັງຫວັດສຸຣາທຸນຸຣາທຸນີ
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees

LAURACEAE

ไม้ต้น สูง 5-15 เมตร ใบเดี่ยว แบบเรียงเวียน รูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกที่ซอกใบ ยาว 10-18 เซนติเมตร ดอกสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมเหลือง ยาว 3-4 มิลลิเมตร ผลรูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 6-7 มิลลิเมตร ยาว 9-12 มิลลิเมตร ก้านผลอวบ กลีบเลี้ยงติดทน ออกดอกเดือนตุลาคม-ธันวาคม พบทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำใกล้น้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ข้อมูลอ้างอิง: http://www.qsbj.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2763

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



แหลใบเล็ก

Dehaasia caesia Blume

LAURACEAE

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 33 เมตร ลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 55 เซนติเมตร ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ เส้นใบแบบขนนก มีสีเขียวซีดใต้ท้องใบ ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร ออกเป็นช่อกระจุก มีสีขาว เหลืองถึงแดง ผล ยาว 19 มิลลิเมตร เป็นผลสดแบบมีเมล็ดแข็งสีชมพูอมแดง ก้านผลสีแดง พบในป่าผลัดใบที่สมบูรณ์จนถึงความสูง 700 เมตร พบได้ทั้งบริเวณที่ราบเชิงเขา บนสันเขาและริมน้ำ บางครั้งพบบริเวณเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : อ้างอิง www.asianplant.net

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





Diospyros tahanensis Bakh.

EBENACEAE

ไม้ต้น สูงถึง 20 เมตร เปลือก สีเทาถึงดำ เรียบหรือแตก เปราะ ใบ รูปขอบขนานถึงรูปไข่กลับพบน้อยรูปใบหอก กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 9-23 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนกลมถึงแหลม ใบแก่เนื้อบางเกลี้ยง เส้นใบโค้ง 8-15 คู่ แตกแขนงแล้วเชื่อมกันห่างจากขอบใบ ค่อนข้างเป็นร่องด้านบน ฐานด้านล่าง เส้นใบย่อย เป็นชั้นบันได งามด้านบน เห็นชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.4-1 เซนติเมตร ค่อนข้างเกลี้ยง ดอกเพศผู้ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3 ดอก ก้านช่อดอกยาวถึง 1.5 เซนติเมตร มักพบหลายกลุ่มอยู่เป็นกระจุกแน่นตามซอกใบ ก้านดอกยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร มีขน กลีบเลี้ยงยาว 2-3 เซนติเมตร โคนเป็นรูปประฆัง ปลายจักลึกถึงโคน เป็นแฉก 3 แฉก ไม่ซ้อนกัน ด้านนอกมีขนสั้นไหม ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกยาว 5-7 มิลลิเมตร โคนเป็นหลอด ปลายจักลึกครึ่งกลีบ เป็นแฉก 3 แฉก มีขนตามหลอดและตามกึ่งกลางแฉกด้านนอก ด้านในเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 12-14 อัน ขนาดไม่เท่ากัน เกลี้ยง รังไข่เป็นหมันมีขนแข็ง บางที่ไม่มี ดอกเพศเมียออกเป็นช่อกระจุกสั้นมี 3-5 ดอก ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 5-7 มิลลิเมตร มีขนยาวนุ่ม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้ แต่ใหญ่กว่า รังไข่มีขนสีเข้มแน่น ก้านเกสรเพศเมีย 1 ก้าน ผล กว้าง 0.5-2 เซนติเมตร ยาว 0.5-3 เซนติเมตร ไม่มีก้าน ผล รังไข่ขอบขนาน พบน้อยที่เป็นรูปไข่ ปลายกลมมีปุ่มสั้น คล้ายหัวนม โคนกลม เมื่ออ่อนมีขนสีดำ ออกเป็นแผ่น เมื่อแก่เกลี้ยงและแข็ง กลีบเลี้ยงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร ไม่ชัด ปลายจักถึงโคนเป็นแฉกทางออก 3 แฉก ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ไม่เป็นจีบหรือขอบเป็นคลื่น มีขนด้านนอก พบในป่าดิบที่ต่ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โจนอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 1 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปท., 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



อกปลาช่อน

Endiandra macrophylla (Blume) Boerl.

LAURACEAE

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น ใบ กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 12-23 เซนติเมตร รูปรี่หรือขอบขนาน ปลายแหลม โคนรูปกลม เนื้อคล้ายหนัง เส้นกลางใบนูนหรือแบนด้านบน เส้นใบข้าง 6-8(10) คู่ เป็นร่องด้านบนนูนด้านล่าง เส้นใบเล็ก เป็นร่างแห นูนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอก สีขาวออกเป็นช่อแขนงยาวได้ถึง 18 เซนติเมตร ตามซอกใบและ ปลายกิ่ง มีขน กลีบรวมมีขนด้านนอก ผล กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 3-6 เซนติเมตร (กว้างถึง 4 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 8.5 เซนติเมตร ในคาบสมุทรมาลเลเซีย) รูปรี่ถึงขอบขนาน เกือบกลม ก้านผลยาว 2-3 เซนติเมตร พบในป่าพรุภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร, ก้องกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 2 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559, 792 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

