



Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn.

LAURACEAE

ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ บางต้นอาจสูงได้ถึง 25 เมตร เนื้อไม้จะฟ้ามเบาเป็นสีน้ำตาลอ่อน ๆ และมีกลิ่นหอมฉุน ร้อน ๆ คล้ายกลิ่นการบูรหรือคล้ายกลิ่นของเทพทาโร ใบดกและหนาหิบบเป็นไม้ร่มได้ดี ใบ เป็นใบประกอบ ออกเรียงสลับ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-12 เซนติเมตร มีเส้นใบคล้ายขนนก เรียงเป็นคู่ประมาณ 6-8 คู่ มีกึ่งขนาดเล็ก ดอกมีขนาดเล็ก ออกเป็นช่อคล้ายร่ม กลีบดอก มี 6 กลีบ กลีบดอกนั้นมีลักษณะเป็นรูปไข่ สีขาวอมเขียว ภายในดอกมีขนเล็กน้อย ดอกมีเกสรเพศผู้ 9 อัน ผลมีลักษณะเป็นรูปกลมไข่กลับสีดำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ตรงหัวเมล็ดจะมีสีแดง รูปเป็นแบบลูกกลมสามเหลี่ยม



ข้อมูลอ้างอิง : <https://medtha.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้น หรือไม้ต้นเล็ก ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 17 เมตร มีก้านใหญ่ชูขึ้น ก้านเล็กห้อยลง เปลือก สีครีมถึงเทาอ่อน หรือน้ำตาล เรียบหรือมีรอยแตกละเอียด เปลือกในสีขาวถึงเหลืองอ่อน ใบ กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 10-18 เซนติเมตร พบน้อยกว้างได้ถึง 8 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 25 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่กลับ ปลายแหลมถึงเรียวแหลมสั้น โคนรูปกลม ขอบเรียบ บางที่เป็นคลื่น ใบอ่อนสีเขียวอ่อน เกือบ ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่า เกือบทั้งสองด้าน เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 8-12 คู่ แบนแต่เห็นได้ ด้านบนนูนเล็กน้อย ด้านล่างเส้นใบย่อยจาก ก้านใบยาว 1.5-3 เซนติเมตร ค่อนข้างเล็กเรียว อาจเป็นปีกแคบใกล้ปลาย เกือบ ทั้งสีออกดำ มีขนอ่อน กิ่งสีเทาอ่อนหรือออกขาว เกือบ มีช่องอากาศเล็ก ดอก สีขาวถึงเหลืองอ่อน มักมีกลิ่นหอม สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อเกือบ แตกแขนงจำนวนมาก ยาว 6-12 เซนติเมตร ที่ง่ามใบหรือตามกิ่งไต่รอยแผลใบ แขนงล่างๆ ยาวอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของแกนกลางช่อ ใบประดับ ยาว 0.3-1.5 เซนติเมตร คล้ายใบ ก้านดอกยาว 1-2 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงยาว 1-1.5 มิลลิเมตร จักจี้เป็นพู 4 พู เกือบ กลีบดอกยาว 3-4 มิลลิเมตร จักจี้เป็น 4 พู รูปขอบขนาน ไม้ซ้อนทับกัน นุ่ม มักมีขนตามขอบ เกสรเพศผู้ติดที่หลอดกลีบดอกระหว่างพูกลีบ ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูรูปทรงไข่ ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร รังไข่ขนาดประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ทรงขวดแก้วก้นกลมคอยาว ก้านเกสรเพศเมียสั้นมาก ยอดเกสรเพศเมีย เป็น 2 พูไม่ชัด ผล กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 1.4-2 เซนติเมตร ก้านผลล่ำ ยาวได้ถึง 0.5 มิลลิเมตร ผลรี หรือรูปไข่กลับ ปลายทุติงจะงอยแหลมสั้น โคนกลม มีกลีบเลี้ยงเล็ก ติดทน สุกสีแดงถึงสีดำ มีเนื้อบาง เมล็ด ใหญ่แข็ง 1 เมล็ด พบเป็นแนวกว้างในป่าดิบที่ต่ำและที่สูงในภาคใต้ ส่วนมากพบในที่ค่อนข้าง โลง เช่น ตามชาย ป่า ยอดเขาหินปูนหรือตามชายฝั่งทะเล



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โจนอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตีพิมพ์จัดพิมพ์ จำกัด (มหาชน), 2561, 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



อ่วม

Maclurodendron porteri (Hook. f.) T.G. Hartley

RUTACEAE

ไม้ต้นเล็กถึงกลาง ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 เมตร ไม่มีหนาม เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงเทาออกขาว เปลือกในสีแดง มีเส้นใย กลิ่นหอม ใบ กว้าง 2-10 เซนติเมตร ยาว 5-24 เซนติเมตร ใบ เดี่ยว (มีใบเดี่ยว) ออกตรงข้าม รูปรีถึงไข่กลับ ปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลมกว้าง โคนแคบขอบเรียบ เนื้อคล้ายหนังบางเกลี้ยงทั้งสองด้าน มีจุดโปร่งแสง เล็กๆ เส้นใบเล็กเรียว 7-10 คู่ จางทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยจางมาก ก้านใบยาว 1-3(5) มิลลิเมตร เล็กเรียวไม่เป็นปีก บวมและมีข้อต่อใกล้ปลาย มีขนละเอียดถึงเกลี้ยง กิ่งอ่อนมีขนละเอียดสีออกน้ำตาลแล้วเกลี้ยง ดอกสีเขียวอ่อนหรือออกเหลือง แยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่คนละต้น ออกเป็นช่อแคบ ไม่แตกแขนงหรือแตกสั้นๆ ยาว 2-15 เซนติเมตร มีก้านช่อดอกเล็กเรียวที่ง่ามใบ ก้านดอกเล็กเรียว ยาว 1-6 มิลลิเมตร ค่อนข้างเกลี้ยง าดดอกขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร กลม กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาว 0.5-1 มิลลิเมตร ไม่ซ้อนกัน เกือบหรือมีขน กลีบดอก 4 กลีบ ยาว 2-2.5 มิลลิเมตร รูปขอบขนานแกมไข่ ปลายแหลมซ้อนกันเล็กน้อยที่โคน เกือบหรือมีขน เกสรเพศผู้มี 8 อัน (เหมือนกันในดอกทั้งสองเพศ แต่เป็นหมันในดอกเพศเมีย) กิ่งไม่เท่ากัน โค้งเข้าไป อับเรณูรูปไข่ เล็ก ก้านชูอับเรณูเล็กเรียวเกลี้ยง โคนไม่กว้าง จานฐานดอกเป็นพู 8 พู ชัดในดอกเพศผู้ คล้ายวงแหวนในดอกเพศเมีย รังไข่มี 4 ช่อง กลม (เป็นหมันในดอกเพศผู้) จักเป็นพูต้น 4 พู เกือบ ก้านเกสรเพศเมียยาวเกือบเท่ากลีบดอก (ไม่มีในดอกเพศผู้) เล็กเรียว ยอดเกสรเพศเมีย มี 4 พู ผล ขนาด 0.8-1.2 เซนติเมตร ทรงกลมถึงรูปไข่ ยอดสั้น เนื้อคล้ายหนัง เกือบ มีต่อมด้านในคล้ายฟองน้ำ ผงผลชั้นในเปราะ เมล็ดขนาด 4-8 มิลลิเมตร สีน้ำตาลเข้มหรือดำเป็นมันผิวคล้ายร่างแหเล็กๆ พบบ่อยบนสันเขาหรือในป่าดิบที่ต่ำหรือป่ากึ่งผลัดใบ (สูงได้ถึง 650 เมตร ในคาบสมุทรมมาเลเซีย)



ข้อมูลอ้างอิง : ภารัตเนอร์, โชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อนุรักษ์พันธุ์ต้นดั้งเดิมกับลิขสิทธิ์ จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



อ้ายบ่าว

Stemonurus malaccensis (Mast.) Sleumer
STEMONURACEAE

ไม้ต้น เล็กเรียว สูงได้ถึง 15 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอมเทา เรียบหรือแตกเป็นร่องตื้น เปลือกในมีจุดสีครีมและส้ม เป็นเม็ด ใบ กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 7-14 เซนติเมตร ออกสลับ รูปขอบขนานถึงขอบขนานแกมไข่กลับ ปลายเรียวแหลมเล็กน้อย โคนรูปลิ้น เนื้อหนา คล้ายหนัง เกือบทั้งสองด้าน เส้นใบหลัก 1 เส้น เป็นแอ่งด้านบน เส้นใบประมาณ 15 คู่ จาง เส้นใบ ย่อยจางมาก ก้านใบยาว 0.6-1.8 เซนติเมตร ดอก ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร สีขาวออกเหลืองถึง ชมพูชู่นสมบูรณ์เพศ เป็นช่อแตกเป็นง่าม (คล้ายซี่ร่มซ้อน) มีกิ่งข้าง 3-5 กิ่ง แต่ละ กิ่งมี 3-6 ดอก ไม่มีก้านดอก ออกแน่นที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร รูปถ้วย ปลายเป็นพู 5 พู กลีบดอก 5(4) กลีบ ขนาด 3-4 มิลลิเมตร เชื่อมแค้โคนเท่านั้น แนบกันที่ครึ่งล่าง ครึ่งบนกางออก ปลายโค้งเข้า เกสรเพศผู้มี 5(4) อัน กางออกพันกลีบดอก ก้านชูอับเรณูนุ่ม คล้ายแถบหนัง ปลายมีขนแน่น รังไข่ สอบแคบไปยัง ก้านเกสรเพศเมีย เรียว ล้อมด้วยจานฐานดอกรูปถ้วย ตื้นที่โคน ผล กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว ประมาณ 5 เซนติเมตร ทรงไข่กลับแคบหรือรูปกระสวย ปลายเรียวโค้ง ชมพูถึงม่วงเข้มด้านล่าง สีครีมด้านบน พบในป่าดิบค่อนข้างสมบูรณ์ สูงได้ถึง 500 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โทมัส ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ธรินทร์พรริ้นดิงแอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : <http://crassa.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/stemonurus-mala.html>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



อายเบา

Ryparosa javanica (Blume) Kurz ex Koord. & Valetton

FLACOURTIACEAE

ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูง 5-20 เมตร ลำต้นมีพูพอนหรือขรุขระเมื่อแก่ เปลือกเรียบ สีนํ้าตาลออกเทา หรือนํ้าตาลซีด มีช่องอากาศ มีขนประปรายสีนํ้าตาล เอนชิดกับลำต้น ลำต้นและกิ่งเป็นริ้วเมื่อยังอ่อน ใบ เดี่ยว ออกสลับตรงข้าม รูปใบหอกแกมรูปไข่ถึงรูปไข่กลับแกมขอบขนาน ยาว 12-30 เซนติเมตร กว้าง 7.5-20 เซนติเมตร ฐานรูปลิ้นถึงป้านมน ขอบใบเรียบหรือมีนํ้าลง ปลายแหลมหรือเรียวแหลมต้น ใบคล้ายกระดาษ สีเขียวเข้ม เปล่งปลั่งและเกลี้ยงด้านบน ด้านล่างซีด มีขนละเอียดเฉพาะบนเส้นกลางใบทั้งด้านบนและด้านล่าง เส้นกลางใบบวมด้านบนและนูนด้านล่าง เส้นแขนงใบ 6-7 คู่ ค่อยๆ โค้งไปเชื่อมกันที่ขอบใบ ก้านใบเรียวยาว ยาว 1.5-6 เซนติเมตร ดอกเพศผู้สีเหลืองซีด ขนาด 4-5 มิลลิเมตร ออกเดี่ยวหรือมี 2-3 ดอก ในแต่ละซ่อ ช่อดอก ยาว 8-30 เซนติเมตร ก้านดอกมีขนสั้นหนานุ่มสีสนิมปกคลุม กลีบดอกรูปใบหอกแกม รูปไข่ มี 4-9 กลีบซ้อนเหลื่อมกัน เชื่อมต่อกันเล็กน้อยที่ฐานกลีบ ดอกเพศเมีย ออกเดี่ยวหรือมี 2-4 ดอก ออกตามข้อ หรือกิ่งที่แก่ และตามลำต้น ลักษณะเหมือนดอกเพศผู้ แต่ใหญ่กว่า ผล มีเนื้อกินได้ รูปทรงกลม แกมขอบขนาน ขนาด 1.5-2.5 เซนติเมตร เปลือกมีช่องอากาศ เนื้อแข็งและหนา สีออกเทา ปลายผลเป็นตุ่มหรือตุ้ม มี 1-2 เมล็ด ทรงกลม รีเหมือนไข่ ขนาด 1.5-2 เซนติเมตร สีเหลืองซีด เยื่อหุ้มเมล็ดมีเนื้อมาก พบในป่าฝนและตามริมลำธารในป่าพื้นที่ต่ำ



ข้อมูลอ้างอิง : <https://indobiodiversity.org/species/show/251090>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกทางชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 เมตร ลำต้นตรง กิ่งใหญ่ชูขึ้น แตกกิ่งมาก เปลือกสีน้ำตาลอมส้มอ่อนถึงสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องละเอียด เปลือกในสีน้ำตาลแดง ไม่มียางขาวหรือน้ำเลี้ยง ใบ เดี่ยว ออกสลับ กว้าง 3-6.5 เซนติเมตร ยาว 6-19 เซนติเมตร รูปร่างขอบขนานหรือรูปไข่กลับแคบปลายหู่หรือแหลม (อาจเป็นแฉ่งเล็กน้อย) โคนแหลม ขอบเป็นคลื่น จักซี่ฟันเป็นต่อม ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ตาดอกมีน้ำยางเหนียว ใบแก่เป็นมันด้านบน กลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบหลักเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 7-11(20) คู่ ขนานกัน ค่อนข้างจากเส้นใบย่อยเห็นไม่ชัด ก้านใบสั้นมาก ยาว 0.2-0.3 มิลลิเมตร โคนบวม หูใบเล็ก ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ดอก สีขาวอมเขียวอ่อน ออกเป็นช่อหลวม ก้านช่อดอกยาวตามซอกใบ ก้านดอกยาว 6-14 เซนติเมตร แขนงแรกออกเป็นวงรอบข้อมี 4 กิ่ง ก้านดอกยาว 0.3-1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร โคนเชื่อมกัน มีน้ำยางเหนียวปกคลุมอยู่ กลีบดอกแยก 5 กลีบ ยาว 2.5-4 มิลลิเมตร กิ่งโปรงแสง เกสรเพศผู้มี 14-20 อัน เล็กเรียวยาว 15-18 มิลลิเมตร ยาวกว่ากลีบดอกมากและแผ่ออกไม่สม่ำเสมอ ติดที่ขอบจานฐานดอก เหนียว ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน ยาวได้ถึง 10 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียเป็นพูเล็กน้อย ผล ยาว 1-2.5 เซนติเมตร รูปกรวยแกมรูปไข่ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงติดแน่น กลีบดอกอยู่ที่โคน มีน้ำยางเหนียวปกคลุม เปลือกบางแข็งแตกจากปลายลงมาเป็น 5 ซีก เมล็ดเล็กจำนวนมาก สีน้ำตาลอมส้ม ไม่มีปีก มีเยื่อหุ้มสีเหลืองเป็นง่ามที่โคน พบบ่อยในป่าดิบที่ต่ำ ส่วนมากในภาคใต้ตอนล่าง



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองงานดา ขยามเขต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า.
ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=2973>



ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 22 เมตร เรือนยอดทรงกรวยแคบ ไม่มีหนาม เปลือก สีน้ำตาลเข้มหรือออกเทา หนาม มีช่องอากาศจำนวนมาก เปลือกในสีเหลืองอ่อน ใบ กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ออกสลับรูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่แคบ ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนทู่หรือแคบเท่ากันหรือเบี้ยวเล็กน้อย ขอบจักซี่ฟันละเอียด ปลายซี่มีต่อม โคนเล็กน้อยตามขอบ ส่วนยอดเมื่อยังอ่อนมีขนละเอียด ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง สีเขียวเข้มด้านบน ด้านล่างสีเขียว เกือบทั้งสองด้าน เส้นใบหลักออกจากโคนใบ 3(5) เส้น ยาวขึ้นไปเกือบถึงปลาย ไม่มีเส้นใบข้าง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดละเอียด ทำมุม 90 องศา กับเส้นกลางใบ ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร มีขนละเอียด หูใบเล็กมาก ร่วงเร็ว ดอก ขนาดประมาณ 0.6 เซนติเมตร สีเขียวอ่อนหรือออกเหลือง ออกเป็นช่อกระจุกแตกแขนง ยาวได้ถึง 3 เซนติเมตร ที่ง่ามใบ ส่วนมากก้านช่อดอกอ้วนล่ำ ก้านดอกยาว 1.5-4 มิลลิเมตร มีขนละเอียด ดาดอกขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร เป็น 5 มุม ขนละเอียด กลีบเลี้ยงรูปจานรองถ้วย โคนเป็นหลอดสั้น ปลายเป็นแฉกสามเหลี่ยมกางออก 5 แฉกประมาณ 2 มิลลิเมตร มีเนื้อ มีขน ด้านในเกลี้ยงและตรงกลางเป็นสัน ปลายหนา กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดประมาณ 1.5 มิลลิเมตร รูปแถบถึงข้อแคบ โคนเล็กเรียว หุ้มเกสรเพศเมียทั้ง 5 อัน (ไม่ชัด) จากฐานดอกใหญ่นุ่มสีเหลืองเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร มี 5 มุม หรือเป็นสันจาง ฐานดอกครึ่งหนึ่งมี (2)3 ช่อง ก้านเกสรเพศผู้มี (2)3 อัน โคนเชื่อมกันครึ่งหนึ่งผล ขนาด 1.4 – 2.2 เซนติเมตร ทรงกลมถึงรูปไข่กลับ สุกสีแดงเหนียวคล้ายหนัง ภายในเนื้อบาง เมล็ดผนังแข็งมาก 1 เมล็ด พบน้อยในชั้นเรือนยอดรองของป่าผลัดใบผสมที่ต่ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/7157331546>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



อินทนิลน้ำ

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมือง : คางชู่ จ้าขาม ช้าขม อินทรี ร้าง อะล้าง

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 เมตร ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 5-20 เซนติเมตร แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.4-1 เซนติเมตร ช่อดอกตั้งตรง ยาว 15-40 เซนติเมตร มีขนสั้น นุ่มหนาแน่น ก้านดอกเทียมยาว 3-8 มิลลิเมตร ขยายในผล ยาว 0.5-1.2 เซนติเมตร อดอกกลมหรือรูปรีระฆัง ยาว 0.7-1.2 เซนติเมตร ปลายมีจักสั้นๆ หลอดกลีบเลี้ยงยาว 3-8 มิลลิเมตร มีสันตามยาว 12-14 สัน ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม กลีบหนา รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร บานออก หรือพังอยู่ในผล ดอกสีม่วงอมชมพู กลีบรูปไข่กลับ ยาว 1.5-3 เซนติเมตร ขอบย่น ก้านกลีบยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ยาวเท่าๆ กัน รังไข่เกลี้ยง ผลรูปรี กว้างหรือเกือบกลม ยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร เกลี้ยง ปลายมีติ่งแหลม แตกเป็น 6 ซีก พบที่อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 750 เมตร เป็นไม้ประดับทั่วไป เปลือกแก่ใช้ แก้วทองเสียใบหรือแก่นต้มหรือชงน้ำร้อน ต้ม แก้วโรคเบาหวาน ขับปัสสาวะและ ลดความดัน



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordspname= Lagerstroemia speciosa\(L.\)Pers.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordspname= Lagerstroemia speciosa(L.)Pers.)

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาพฤกษศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



อินทรีชิต

Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.

LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมือง : เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลา เสลาใบใหญ่

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 เมตร เปลือกคล้ายเสลา เปลือกในสีม่วง ใบรูปรี หรือรูปขอบขนาน ยาว 4-21 เซนติเมตร แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มทั้ง 2 ด้าน ก้านใบยาว 2-5 มิลลิเมตร ช่อดอกยาว 10-30 เซนติเมตร อดอกรูปไข่ ยาว 5-9 มิลลิเมตร ก้านดอกเทียมยาว 2-7 มิลลิเมตร หลอดกลีบเลี้ยงยาว 3-4 มิลลิเมตร มีสันประมาณ 12 สันตามยาว ไม่ชัดเจน มี 6-8 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 3-6 มิลลิเมตร ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ด้านในมีขนช่วงปลายกลีบ ปลายกลีบพับงอกลับในผล ดอกสีชมพูเข้มหรือม่วง เปลี่ยนเป็นสีอ่อน มี 6-8 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ก้านกลีบยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร ขอบกลีบเป็นคลื่น จักชายครุย แผ่นกลีบย่น เกสรเพศผู้วงนอก 6-7 อัน ยาวกว่าวงใน รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ผลรูปรี ยาว 1-2 เซนติเมตร แตกเป็น 5-6 ซีก พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน ในไทย พบทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าชายหาด ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร เป็นไม้ประดับทั่วไป



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamescl=Lagerstroemia0loudonii0Teijsm.010Binn.>

ภาพประกอบ : ภาพดอก : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamescl=Lagerstroemia0loudonii0Teijsm.010Binn.>

ภาพต้น : <https://www.gotoknow.org/posts/252007>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้น สูง 10 เมตร ใบ รูปไข่หรือขอบขนานแกมรี กว้าง 1.5-5 เซนติเมตร ยาว 4-15 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนแหลม เนื้อคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยง เมื่อแห้งสีน้ำตาลอ่อนทั้งสองด้าน เส้นใบเล็ก 5-10 คู่ แตกแขนงและเชื่อมติดกันใกล้ขอบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแห เล็ก หนูน ก้านใบยาว 0.4-1 เซนติเมตร เกลี้ยง กิ่งสีขาว ต่างจากก้านใบที่เป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่อแห้ง ดอกเพศผู้ ออก 3 ดอก ใต้ใบอ่อนที่เพิ่งแตกใหม่ ก้านดอกเกือบไม่มี กลีบเลี้ยงยาว 4-6 เซนติเมตร รูปหลอด ปลายจักตื้นเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 4 แฉก ไม่ซ้อนกัน มีขนด้านนอก กลีบดอกยาว 1-1.5 มิลลิเมตร โคนเป็นหลอดปลายจักลึก 1/4 ของความยาว กลีบรูปสามเหลี่ยม 4 แฉก เกลี้ยงด้านนอก เกสรเพศผู้ 14-20 อัน รังไข่เป็นหมันมีขน ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงรูปประฆัง ปลายจักลึกครึ่งของความยาวกลีบ เป็นแฉกพับ 4 แฉก ไม่ซ้อนกัน มีขน กลีบดอกคล้ายในดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่า เกสรเพศผู้เป็นหมัน 4 อัน รังไข่และก้านเกสรเพศเมียขนแน่น ผล กลมหรือแบน ขนาด 2.5-3 เซนติเมตร ไม่มีก้านผลหรือก้านผลใหญ่ ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ปลายบวมทั้งสองด้าน เมื่ออ่อนมีขนสีน้ำตาลทอง ร่วงง่าย กลีบเลี้ยงหนาแข็งเป็นแฉกสามเหลี่ยม 4 แฉก แผ่นหรือโค้งกลับพับจีบ ขนสีสนิม มักพบบนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน พินดา สิทธิสุนทร กิ่งกานดา ชยามฤต ไม่ป่ากได้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

