

ขนุนปาน

Artocarpus chama Buch.-Ham.

MORACEAE

ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 40 เมตร เรือนยอดเป็นรูปขอบขนานแน่น เปลือกสีครีมถึงเทาออกน้ำตาล เรียบ หรือมีรอยแตกแคบตามแนวตั้ง เปลือกในสีส้มออกชมพูอ่อน มีขีดแนวตั้งสีขาว ใบ กว้าง 5-14 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร ออกเรียงเวียน รูปรีถึงขอบขนาน หรือกึ่งรูปไข่ปลายแหลมถึงเรียวแหลมสั้น โคนกลมถึงกึ่งรูปหัวใจ ไม่จักเป็นพู ขอบใบไม่จักหรือจักละเอียดไปยังปลาย ส่วนยอดและก้านใบมีขนหยากสีน้ำตาลอมส้ม แน่น ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีเขียวอมเหลือง มีขนแข็งโดยเฉพาะบนเส้นใบทั้งสองด้าน เส้นใบ 8-12 คู่ แตกแขนงหรือแตกเป็นง่ามห่างออกมาจากขอบใบ เส้นใบย่อยคล้ายชั้นบันไดห่าง ก้านใบยาว 1-4 เซนติเมตร มีขนค่อนข้างเป็นสะเก็ด หูใบยาว 1-3 เซนติเมตร มีขนหนามสีน้ำตาล ร่วงเร็ว ทั้งรอยแผลไว้ข้อ ดอกกลม ออกเดี่ยว ที่ซอกใบ ช่อดอกเพศผู้กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร ทรงกลมหรือรูปไข่ ช่อดอกเพศเมียค่อนข้างกลม ผล ยาว 5-10 เซนติเมตร มีหนามแข็งยาว 5-10 มิลลิเมตร (มองเห็นๆ คล้าย ผลทุเรียนแต่หนามทุกว่าและมียางมาก) เมื่อสุก สีเขียวสด เมล็ด ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร พบบ่อยในท้องถิ่น ตามป่าที่ต่ำที่ถูกรบกวน จังหวัดตรัง สตูล



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : <https://posting.cc>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ขนุนป่าใบเล็ก

Artocarpus kemando Miq.

MORACEAE

ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 เมตร ใบ กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 7-18 เซนติเมตร ออกเวียนสลับ รูปรี ขอบขนานหรือไข่กลับ ปลายเรียวแหลมถึงทู่ หรือ กลม โคนรูปลิ้นถึงกลม แผ่นใบเป็นพู่หรือจักซี่ฟัน เนื้อใบคล้ายหนัง เกี้ยงหรือมีขนกระจายถึงค่อนข้าง แน่น โดยเฉพาะบนเส้นกลางใบทั้งสองด้าน เส้นใบ 8-15 คู่ โค้ง ไม่แตกแขนง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได กิ่งงอด้านล่าง ก้านใบยาว 1-3 เซนติเมตร เล็ก ขน ละเอียด ไม่เป็นเกล็ด หูใบยาว 0.7-2 เซนติเมตร ร่วงเร็ว ทั้งรอยแผลเป็นวงรอบกิ่ง ข้อดอกกลม ออกเดี่ยวหรือพบบ้างเป็นคู่ตามซอกใบ ข้อดอกเพศผู้กลม หรือรูปดอกเห็ด กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาว 2-4 เซนติเมตร ก้านช่อยาว 0.7-1.5(2) เซนติเมตร ทรงกระบอก มีร่องขนกำมะหยี่สีน้ำตาล ข้อดอกเพศเมีย ก้านช่อยาว 1-4 เซนติเมตร รีถึงรูปไข่ ขนกำมะหยี่สีน้ำตาล ผล กว้างได้ถึง 2.5 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 4 เซนติเมตร ก้านผลยาว 1.2-4 เซนติเมตร ทรงรีถึงกลม มีตุ่มหู ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร เปลือกหนา เมล็ดยาว ประมาณ 8 มิลลิเมตร พบในป่าดิบที่ต่ำและป่าพรุ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/reulim/4357835662/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ขนุนป่ายอดดำ

Artocarpus lanceifolius Roxb.

MORACEAE



ไม้ต้นสูงได้ถึง 35 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร เปลือก สีเทาเข้ม เรียบถึงเป็นเกล็ดบางๆ ด้านในของ เปลือกมีสีเหลืองอ่อน กิ่งมีความหนา 6-8 มิลลิเมตร ผิวของกิ่งมีรอยย่น มีขนที่ค่อนข้างละเอียดและโปร่งแสง ใบเลี้ยงเป็นรูปไข่หรือรูปใบหอก ปลายใบแหลม ยาว 1.5-4.5 เซนติเมตร มีขนนุ่มติดอยู่ที่แผ่นใบ ใบเดี่ยว หนาคลายแผ่นหนึ่ง บิดเวียน ขอบใบเรียบเมื่อโตเต็มที่ ต้นที่ยังไม่ใหญ่ใบเรียงตัวคล้ายขนนก ขอบใบเว้าเป็นจักลึก ผิวเรียบทั้งสองด้าน เมื่อแห้งจะมีสีเขียวเทา ใบแก่รูปรีถึงรูปไข่หรือรูปไข่กลับถึงรูปขอบขนาน บางครั้งพบเป็นรูปใบหอกถึงรูปรีแต่ไม่บ่อย ขนาดกว้าง 5-17 เซนติเมตร ยาว 10-33 เซนติเมตร ฐานใบรูปกลม ไม่สมมาตร ขอบใบมีลักษณะเป็นคลื่นขึ้นลง ปลายใบแหลมหรือมน เส้นกลางใบนูนขึ้นด้านบน มีเส้นแขนงใบย่อย 7-14 คู่ นูนชัดด้านบน เส้นใบเรียงตัวคล้ายขั้นบันได เห็นจากท้องใบล่างๆ แต่มองจากหลังใบไม่เห็น ก้านใบยาว 1-3 เซนติเมตร ช่อดอกออกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มกระจุก แตกตามซอกใบ ใบประดับด้านบนรูปกรวย ก้านดอกยาว 2.5-7 เซนติเมตร ขนสั้น เกสรเพศผู้ทรงรีถึงทรงกระบอก ขนาด 3-6x1.2-1.8 เซนติเมตร เกสรเพศเมียมีฐานรองรูปไข่ ดอกเพศเมียมีก้านเกสรยื่นออกมา 2 แฉก ดอกออกเป็นวง กลีบรวมใหญ่ มีสีส้มอมขาว ผลเป็นผลรวมขนาดกว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร ก้านผลยาว 5-10 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.asianplant.net/Moraceae/Artocarpus_lanceifolius.htm

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Artocarpus+lanceifolius>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



หว่าหิน (ขवाद)

Syzygium lineatum (DC.) Merr. & L.M.Perry

MYRTACEAE

ไม้ต้นเล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ถึง 22 เมตร เรือนยอดกลมแน่น มีพุ่มสนั่น มีรากค้ำยันในป่าพรุ มักขึ้นเป็นต้นเล็ก แน่น เปลือกสีเทาออกชมพูถึงน้ำตาลแดง เรียบถึงแตกเป็นรอยตื้นและเป็นเกล็ด เปลือกในสีน้ำตาลอมชมพู นุ่ม ใบกว้าง 2-4.5 เซนติเมตร ยาว 5-11 เซนติเมตร รูปไข่แคบถึงใบหอกแกมรี ปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลมยาว โคนรูปลิ้น ขอบมักเป็นคลื่น เนื้อคล้ายหนังบาง เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 16-20 (25) คู่ ชิดกัน เป็นร่องตื้นด้านบน ฐานเล็กน้อยด้านล่าง เส้นขอบใบ (1)2 เส้น เส้นใบเป็นวงตื้น ห่างจากขอบใบประมาณ 2 มิลลิเมตร วงนอกมักจางหรือไม่มีเส้นใบย่อยจางมาก ก้านใบ ยาว 0.5-1 เซนติเมตร เล็กเรียว เป็นร่องด้านบน กิ่งเล็กเรียวสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแดง เรียบ ไม่เป็นมุมหรือสัน ดอก ขนาด 1.2-1.8 เซนติเมตร สีขาวถึงเหลือง อ่อนหรือออกเขียว กลิ่นหอมหวาน ออกเป็นช่อแตกแขนงแน่น ยาว 4-10 เซนติเมตร ที่ปลายกิ่ง และง่ามใบบนๆ แขนงกลางช่อดอกและแขนงช่อเล็กเรียว สีน้ำตาลเข้ม เกสรตัวผู้ เป็น 4 มุมเล็กหรือแบน ก้านดอก ยาวได้ถึง 1 มิลลิเมตร (ดอกกลางไม่มีก้าน) ด้วยฐานดอกสูง 6-9 มิลลิเมตร สีเหลืองอ่อนรูปกรวยแคบ เรียวไปเป็นก้านยาว 2 มิลลิเมตร เป็นสัน ชัด กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร เห็นชัด กลีบดอก 4 กลีบ แยกกัน ขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร มีจุดต่อมน้ำ เกสรเพศผู้ยาว 10-15 มิลลิเมตร ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 12 มิลลิเมตร ผล กว้างได้ถึง 1 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 1.3 เซนติเมตร ทรงขอบขนานหรือกึ่งรูปไข่ ปลายมีกลีบเลี้ยงโค้งเข้าในคอดก ขาวทึบเมื่อสุก ภายในเป็นรูปรีหรือมีเนื้อ รสหวาน หอมอ่อน พบทั่วไปในป่าดิบ ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด สูงได้ถึง 1,000 เมตร โดยเฉพาะใกล้น้ำหรือแนวชายฝั่งที่เป็นหิน บางทีใน ป่าเบญจพรรณ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : สมรพันธ์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3162>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ช่อยน้ำ

Streblus taxoides (Heynes) Kurz

MORACEAE

ชื่ออื่น : กะแตไม้ ช่อยน้ำ ช่อยหนามช่อยหยอง ชี้แรต หนามชี้แรต สามพันตา

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 เมตร แยกเพศต่างต้น มีหนามยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ใบยาว 2-5 มิลลิเมตร ติดทน มีขนครุย ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 2-18 เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อยช่วงปลาย เส้นแขนงใบข้างละ 6-12 เส้น ก้านใบยาว 1-6 มิลลิเมตร ช่อดอกเพศผู้แบบช่อเชิงลดสั้น ๆ หรือเป็นกระจุกแน่นตามกิ่งสั้น 1-4 ช่อ ยาว 4-8 มิลลิเมตร ดอกเกือบไร้ก้าน กลีบรวมยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ช่อดอกเพศเมียออกเดี่ยวๆ หรือเป็นกระจุก มีดอกเดี่ยว กลีบรวมรูปใบหอก ยาว 2-5 มิลลิเมตร ขยายในผล ยาวได้ถึง 2 เซนติเมตร ยอดเกสรยาว 0.5-3 มิลลิเมตร ผลรูปรี ยาว 0.5-1 เซนติเมตร พบที่อินเดีย ภูฏาน ศรีลังกา จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Streblus0taxoides0\(Heyne0ex0Roth\)0Kurz](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Streblus0taxoides0(Heyne0ex0Roth)0Kurz)

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Streblus0taxoides0\(Heyne0ex0Roth\)0Kurz](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Streblus0taxoides0(Heyne0ex0Roth)0Kurz)



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)




ช้อยหนาม

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner MORACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กระชิด,กะฉิม,กาซั่ม,ช้อยหนาม,ชี้แรด,ชี้แรดควน,ชี้แรดเมีย,ไขนกดุข,มะโอมิ,ไม,สยอง,หนามแจง



ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น สูงได้ถึง 20 เมตร หนามยาว 1-4.5 เซนติเมตร กิ่งมีขน หูใบยาว 3-8 มิลลิเมตร ใบรูปรี รูปไข่กลับ ยาว 4-25 เซนติเมตร ปลายมีติ่งคล้ายหนาม ขอบจัก ฟันเลื้อยเป็น หนามห่างๆ เส้นแขนงใบข้างละ 8-12 เส้น ก้านใบยาว 0.2-1 เซนติเมตร ช่อดอกเพศผู้แบบช่อเชิงลด 1-2 ช่อ ยาว 1-5 เซนติเมตร ก้านช่อ และก้านดอกสั้นมาก กลีบรวมยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ยาว 2-2.5 มิลลิเมตร ช่อดอกเพศเมียแบบช่อกระจุก ออกเดี่ยวๆ ก้านช่อ ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มี 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 2-8 มิลลิเมตร กลีบรวมยาว 1-2 มิลลิเมตร กลีบคู่ใน ขยายในผลยาวได้ถึง 1 เซนติเมตร มีขนครุย ยอดเกสร ยาว 2-3.5 มิลลิเมตร ผลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบรวมหุ้มประมาณ กึ่งหนึ่ง พบที่อินเดีย บังกลาเทศ จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยพบกระจายทั่วไปทุกภาค โดยเฉพาะตามเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words>

ภาพประกอบ : ภาพใบ/ภาพดอก : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words>

ภาพผล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





Amesiodendron chinense (Merr.) Hu

SAPINDACEAE

ชื่ออื่น : กะฮาร์ กุปีงยะซี

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 5-25 เมตร ขึ้นตามชายน้ำ ใบ ประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปรีแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ใบอ่อนสีแดง สีส้มพุดออกส้ม ถึงสีเขียว ดอก เพศผู้และเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกสีขาว มีขนบริเวณขอบและผิวด้านล่าง มีขนบริเวณก้านช่อดอก ดอกออกเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ออกผล สิงหาคมถึงพฤศจิกายน ผลสีน้ำตาลถึงดำ เมล็ดกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร กระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทย ตรังและพัทลุง ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 600 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=2409

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/7784948144/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ชันทองพญาบาท

Suregada multiflora (A.Juss.) Baill.

EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น : กระดุก ขนุนดง ขอบนางนัง ชันทสกร ชันทอง ชันทองพญาบาท ข้าวตาก ขุนทอง คุณทอง โจ่ง
ช้องรำพัน ขายปลวก ดูกไทร ดูกไม้ ดูกหิน ดูกไหล ทุเรียนป่า ป่าช้าหมอง ไฟ มะดุก มะดุกดง มะดุกเลื่อม
ยางปลอก ขายปลวก สล่อน้ำ หมากดุก เหมือดโลด เหล่ปอ ฮ่อสะพายควาย

ไม้ต้น สูงไม่เกิน 15 เมตร แยกเพศต่างต้น ทุใบเชื่อมติดกันขนาดเล็ก ร่วงเร็ว ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูป
ขอบขนานยาว 12-15 เซนติเมตร แผ่นใบมีจุดโปร่งแสง ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ออกตรงข้ามใบ ก้านช่อ
ยาว ได้ถึง 1 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 4-6 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม รูปรี ยาว 3-4
มิลลิเมตร ไม่มีกลีบดอก จานฐานดอกเป็นวง มีต่อมกระจาย เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง อับ
เรณูติดด้านหลัง เป็นหมันใน ดอกเพศเมีย รังไข่ 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสร
แยก 2 แฉก ผลสด ผนัง ชันในแข็ง จักเป็นพู่สั้น ๆ ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร แตกเป็น 3 ส่วน มีคอลิวเมลลา
เมลลิมเยื่อหุ้มสีขาว พบที่อินเดีย บังกลาเทศ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทุกภาค
ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าละเมาะ และชายป่าที่แห้งแล้ง ความสูงไม่เกิน 500 เมตร น้ำคั้นจากใบ
ใช้แก้ไข้



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Suregada0multiflora0\(A.0Juss.\)0Baill.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Suregada0multiflora0(A.0Juss.)0Baill.)

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Suregada0multiflora0\(A.0Juss.\)0Baill.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Suregada0multiflora0(A.0Juss.)0Baill.)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ชันหนาม

Paranephelium macrophyllum King

SAPINDACEAE

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นสูงได้ถึง 12-20 เมตร เปลือก สีนํ้าตาลอมส้ม เรียบ เปลือกในสีชมพู ใบประกอบแบบขนนกปลายเดี่ยวหรือคู่ มีใบย่อย 3-5 คู่ ออกตรงข้าม กว้าง 3-12 เซนติเมตร ยาว 6-30 เซนติเมตร ใบคู่บนใหญ่สุด รูปรีแกมขอบขนาน ปลายเรียวแหลมถึงกลมหรือปากเล็กน้อย โคนกลมหรือรูปสามเหลี่ยม ค่อนข้างเบี้ยว ขอบจักซี่ฟันห่างแต่แหลมคม ใบอ่อนสีแดงสด ใบแก่หนาแข็ง สีเขียวเข้มขุ่นด้านบน เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นกลางใบเป็นแอ่งลึกด้านบน หนูนมากด้านล่าง ก้านใบยาว 12-20 เซนติเมตร ก้านใบย่อยยาว 0.5-2 เซนติเมตร ดอก ขนาดประมาณ 6 มิลลิเมตร สีชมพู พบน้อยสีขาว สมมาตร ออกเป็นช่อตั้งแตกแขนง ยาว 25-60 เซนติเมตร ที่ง่ามใบ พบน้อยที่ปลายกิ่ง ดอกสมบูรณ์เพศในช่อเดียวกัน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีแดงเข้ม ยาว 1-2 มิลลิเมตร เท่ากัน รูปสามเหลี่ยมเชื่อมกันเล็กน้อยที่โคน กลีบดอกแยก 5 กลีบ ยาวกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย ค่อนข้างกลม เกลี้ยงด้านบน นอก มีขนคล้ายขนแกะสีเหลืองเป็นก้อนแน่นด้านบน ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้สีชมพู 7-8 อัน ยาวได้ถึง 4 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูเล็กเรียว จานฐานดอกสีเหลือง ดอกสมบูรณ์เพศ รังไข่และก้านเกสรเพศเมียสีแดงเข้ม ผล ยาว 2.5-4 เซนติเมตร สีนํ้าตาลอมเทาขุ่น กลม มีหนามลําแข้งแน่น แก่แตก 3 ส่วน ไม่สม่ำเสมอ เมล็ดใหญ่ 1-2 เมล็ด สีนํ้าตาล ผลเป็นขีด ไม่มีเยื่อหุ้ม พบในป่าที่ต่ำถูกทำลาย จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โทมัส. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).- กรุงเทพฯ : อมรินทร์คิงดอมพับลิชชิง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า.

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





Kibatalia maingayi (Hook.f.) Woodson

APOCYNACEAE



ไม้ต้น สูง 25 เมตร กิ่งก้านเล็กสีน้ำตาลเข้ม เปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นรอยประสานกัน เรียบหรือแตกเป็นร่องละเอียด เปลือกในสีส้ม มียางสีขาวมาก ใบกว้าง 1-4.5 เซนติเมตร ยาว 6-16 เซนติเมตร รูปรีปลายเรียวแหลม โคนสอบ แผ่นใบค่อนข้างบาง ขนเกลี้ยง เส้นใบ 4-7 คู่ โค้งขึ้นใกล้ขอบใบ ก้านใบยาว 0.4-0.7 เซนติเมตร ดอกสีขาว ที่โคนมีแต้มเขียว ออกเป็นกระจุกๆ ละ 4-25 ดอก ขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงกว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร สีเขียวอ่อน รูปไข่ ปลายแหลม เกสรตัวผู้ ยาวกว่ากลีบ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน เป็นหลอดยาว 5-9 มิลลิเมตร ด้านในมีขน ด้านนอกเกลี้ยง ปลายแยกออกเป็นพูกลีบยาว 11-13 มิลลิเมตร มีขน ทั้งสองด้านเกสรเพศผู้ติดที่ส่วนบนของหลอดและแผ่แผ่แผ่หลอด อับเรณูกว้างประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร รังไข่ขนาดประมาณ 1.5 มิลลิเมตร มีขน ก้านเกสรเพศเมียยาว 4-8 มิลลิเมตร เกสรตัวเมีย กว้าง 8-50 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร แบนเล็กน้อย ไม่มีช่องอากาศ เมล็ดกว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตร ยาว ประมาณ 7-10 เซนติเมตร (รวมจะงอย) ขนยาว 1-8 เซนติเมตร พบในป่าดิบที่ต่ำ ความสูง 300 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์, พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤดี ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปท. 2558. 768 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ภาพบน-ภาพล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพถ่าย https://www.flickr.com/photos/ys_yech/8108707294/in/photostream/



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

